



E-XV. 6 10698/B

18

6.

~~66-68~~











Digitized by the Internet Archive  
in 2016 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b28764882\\_0001](https://archive.org/details/b28764882_0001)

# SYNOPSIS

UNIVERSÆ

MEDICINÆ PRACTICÆ &c.

*Sive Doctissimorum Virorum*

## DE MORBIS,

Eorumque causis, & Remediis Judicia.

AUCTORE

JO: ALLEN M. D.

EDITIO SECUNDA CORRECTISSIMA VENETA.

*Cæteris audior, & plerisque in locis diligenter  
emendata; cui accesserunt celebriorum Veterum,  
Recentiorumque sententiæ, præter ea, quæ in aliis  
latinis editionibus prostant.*

Τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶ γινῶναι τὰ ὁρθῶς εἰρημένα.  
Ἰπποκράτ. περὶ διαίτης.

PARS PRIMA.



VENETIIS, MDCCXCIII.

APUD PETRUM QU: JO: GATTI,

SUPERIORUM FACULTATE.



## P R Æ F A T I O

EUSEBII SGUARIi M. D.

*Ad Synopsin Medicinæ*

J O H. A L L E N.

*In qua Historiæ Medicinæ compendium; & pro Ti-  
ronibus in eadem nunc temporis instituendis præci-  
pui Scriptores exhibentur.*

Edicinâ; humanarum disciplinarum No-  
bilissima atque utilissima, non solum  
morborum genera, species, causas, dif-  
ferentias; numerumque perquirit; &  
discriminat, verum etiam discretos ex  
suis causis deducit; iisdemque experien-  
tia duce rationabiliter medetur. Eadem

in Theoricam ac Praticam merito dividi solet, quarum  
illa ex Naturæ legibus; & diversis Physices partibus,  
morborum causas; quibus iudicium dirigitur; venatur;  
& explicat; hæc appositis pharmiacis ægros in salutis  
gratiam restituere contendit; & naturalium vitalium-  
que munerum vitia aptis auxiliis emendat. Utraque  
pars quantas novissimis hisce temporibus acquisierit no-  
tiones, quantaque; solertissimorum Virorum industria  
additamenta; susceperit; testantur nuperrimi illustr.  
Academiarum, tam quæ Parisiis, & Berolini sunt,  
quam quæ in Anglia, & Scotia, atque alibi conatus,  
nec non quorundam hujusce Seculi Scriptorum doctis-  
simorum, sagacissimorumque labores; qui sublimiori-  
bus Scientiis ad usum partium animalis corporis, &  
naturalium; vitalium, ac animalium actionum œcono-  
miani intelligendam in auxilium vocatis, Theoricam  
medicinam ad Scientiæ culmen, dignitatemque evexe-  
re: quemadmodum post Borellum, Belinum, Pitcer-  
nium, Freindium, & Jurinum celeberrimus Boerhaa-  
vius,



vius, ejusque alumni, præsertim Cl. Van Schvvieten, & Doctissim. Aller dudum præstitere, quibus merito accensendus est Experientiss. Hales, ipsamque Practicam supra Veterum industriam perducere norunt; quemadmodum ab acutissimo Sydenhamo plerique: maxime vero meritissimi Meadius, Astrucius, Monreali, Haen, Stock, & Hasenohlt felici ausu intentarunt. Sed quibus initiis, quibusque progressibus Ars hæc, sive disciplina, per antiquiora tempora ad nostram usque ætatem pervenerit, ut aliquo modo adumbremus, historicam ejus narrationem veluti per synopsis, ceu in compendium, exornare juvabit ab Api, sive Serapi Ægyptiorum Osiride ab aliis dicto, vel juxta Diodorum Siculum ab Iside, ejusque filio Oro, quem Græci Apollinem Jovis filium dixere, ni cum aliis putare velimus, ab Hermete Trismegisto apud Ægyptios antiquitus Medicinam ortum habuisse. Id unum tamen certum est ab Ægypto in Græciam una cum cæteris Artibus Disciplinam hanc multo ante Trojæ excidium translata esse, ibique maxime excultam a Centauro Tessalo, & Chirone, a quo etiam Chirurgia dicta, unde liquet, nisi ejus partem, quæ in primis manuali operatione circa vulnerum sanationem exercetur, antiquissimis illis temporibus usuvenisse. Chiron discipulos habuit Æsculapium Apollinis filium, & Achillem Tessaliæ Regem, qui una cum Machaone, & Podalirio, Æsculapii filiis, ante Trojanum bellum Telephum Regem Herculis filium curavit. Machaon occisus ad Trojam Artis hæredem reliquit filium suum Nicomachum, a quo usque ad Melampum, qui 1243. annis ante Christum natum vixit, nisi quorundam Medicorum mentio sit: veluti Promethei, quem Medicinæ inventorem fecit Æschylus, & Pæonis, unde Pæoniæ herbæ nomen. Melampus, cum filias Regis Argivorum furiosas Helleboro exhibito sanasset, huic vegetabili melampodii nomen dedit, & ab eo usque ad Menecratem Syracusanum 934. ann ante Ch. nullus quispiam alius Medicus recensetur. Hunc sequitur Herophylus Chalcedonius, qui tempore Phalaridis Tyranni homines vivos e carcere obtinuisse, & secasse testantur Celsus, & Tertullianus; tum Empedocles Agrigentinus, & Acron itidem Agrigentinus, qui an. 460.

ante Ch. Empiricæ sectæ primordia fundavit. Paulo post Democritus Abderites, & Hippocrates Cous florere, ejusque filii Thessalus, & Draco, atque gener Polybius, qui libros scripsit de natura humana, & de tuenda valetudine. Hos exceperunt Diocles Caristius, & Cratevas; tum Plato, ejusque discipulus Aristoteles, & Theophrastus Efesius, & Erasistratus ob curam filii Seleuci Regis Antiochi celebris; demum Nicander inventor Theriacæ, Mitridates Rex Ponti, Themison Laodicæus Methodicæ sectæ inventor, & Asclepiades. Sed a Christo nato vertente.

I. Seculo florere Antonius ceu potius Actorius Musa Cæsaris Augusti Medicus, ejusque frater Euphorbus Jubæ Regis Mauritanæ Archiater, tum Apollonius Musa, Philonides Acutus, qui a Plinio passim citatur, & Aretæus Cappadox, Tiberii vero ætate celebres fuere Antiochus Bachius, Cassius Fœlix, Scribonius Largus, Heraclides Erythræus, Vectius Valens Antiochenus, qui, eodem Plinio teste, in Aula Claudii inter Adulteros Massalinæ fuit, atque demum Cornelius Celsus elegantissimus præ cæteris, qui deinceps scripserunt, Medicis, ornatissimique. Porro imperante Nerone fuere Andromacus senior Cretensis, ex cujus præscripto hodie Theriaca conficitur, Thessalus Trallianus Methodicæ sectæ cultor eximius, & Evax Rex Arabum, qui de Medicina Librum ad Neronem scripsit. Sub Vespasiano demum fuere Plinius secundus, Andromacus junior, Græcinus, Menedorus, & Democrates: tum Dioscorides Anazarbensis, ex Anazarba Siciliæ urbe, atque sub Trajano versus seculi finem: Crito, Ruffus Ephesius, Marcinus. Sed ex tantis Medicis plerorumque Opera deperdita sunt; nec nisi extant ex Latinis ea C. Celsi, & Gaii Plinii, ex Græcis vero longe plura, viz. ea Scribonii Largi, Dioscoridis, & nonnulla Ruffi Ephesi, tum Vectii Valentis nisi fragmenta quædam Astrologiæ; Evacii Liver eidem adscriptus, sed fidei suspectæ, & Cassii Fœlicis libri duo, qui de curatione morborum agunt.

II. Seculo Scripta Hippocratis magno pretio haberi orsa sunt, & a nonnullis Commentario illustrari, simulque plurimi Methodici, ceu Thessali Sectatores inclaruerunt; præ cæteris vero celebres fuerunt: Soranus

Ephesius, qui sub Trajano, & Hadriano Romæ Medicinam exercuit, Olympius, ejusque discipulus Apollonides, Julianus Alexandrinus Hippocratis Commentator, Cælius Aurelianus, qui etiam Sorani libros latine dedit, Sabinus, qui cum Ruffo Ephesio præcedentis Seculi Hippocratis opera illustravit. Hos sequuntur illi, qui sub Hadriano Cæsare tantum vixere: ut Dioscorides Alexandrinus, Artemidorus Capito, Pelopes Humefiani, & Satyra Quinti auditores, a Galeno jam memorati; tum Lycus Macedo, & Claudius Galenus, qui postremus omnes hucusque Medicos, & eruditioe, & librorum multitudine, cum ultra 200. teste Gesnero, scripsisset, superavit, tandem Emilius Macer, qui carmen de herbarum virtutibus confecit.

III. Seculo vix cujuspiam Medici Opera, nec nisi quorundam tantum nomina occurrunt: veluti Antylli, qui, teste Oribasio, multa scripsit de Arte Gymnastica, Archigænis, & Herodoti viris de secta Pneumatica clarissimis, & Possidonii de quo Aetius, & Gesnerus in Bibliotheca aliquid effantur. Ast Probo imperante Panthaleon de Vercellis Sabaudia Ducis Protomachus, & Martyr inclaruit, & sub Caracalla Quintus Serenus Samonicus Poeta Lyricus, Gordiani junioris præceptor, qui in balneo occisus est, & cujus latina fragmenta adhuc extant.

IV. Seculo Medicina florere cœpit Alexandriae Zenone Cyprio præceptore, usque in Juliani imperium celeberrimo, a quo instituti sunt: Magnus Antiochenus, Jonicus, sed præsertim Oribasius Pergamenus Juliani Apostatæ Archiater, & Consiliarius, a quo Constantinopolitanam Quæsturam adeptus est. Hujus vero ætate vixit etiam Eunapius historicus simul, atque Medicus, ut ei verisimiliter inscribi possint: tum quatuor, quæ extant de Euporistis libri; tum alii nonnulli, & paulo post Vindicianus, quem Theodorum Priscianum quidam dicunt, qui librum de expertis remediis ad Valentinianum Imperatorem concinnavit.

V. Seculo nullus occurrit celebris Medicus; sed omnium, quorum memoria intercudit, jacturam compensat circa ejusdem sæculi finem unus Aetius Amidenus, ex Amida Mesopotamiæ urbe, qui ad imitationem Oribasii plurima veterum fragmenta congestit, quæ-



quæque alibi non reperiuntur deducta ex Archigene, & Herodoto, ex Possidonio, & Antyllo, ex Sorano Methodico, & Leonide sectæ Episynthetico. Huic adjungendus est Petrus Archiater Theodorici Gothi Medicus.

VI. Seculo illustres fuere Alexander Trallianus, ex Trallibus Lydiæ urbe celeberrima, a Stephano Parente suo Medicina institutus, Uranius natione Syrus, Procopius insignis Historicus, & Belisarii Ducis Amanuens, quem cum Freindio Medicum una conjicimus, Perzoes, qui librum de Indorum Sapientia Chosrois Persarum Regis nutu confecit, & Palladius Sophista, vel Jatrofophista, primus inter recentiores Medicos græcos habendus, quippe qui Alexandriæ institutus est, & cujus commentarium in librum de morbis acutis Hippocratis servavit Gesnerus in sua Bibliotheca.

VII. Seculo bella Saracenica Asiæ, Africæ & Siciliae Artes agitantia nisi in minori Asia, & Græcia paucos eruditos reliquerunt. Schola tamen Alexandrina ab initio usque hujus seculi ob Medicinæ studia adhuc inclarescebat, cui operam dedit ibidem Paulus Ægineta, ab Ægina insula dictus, qui primus de Arte obstetricia egit, & Abulpharagio teste accuratissimo, sub Herachi regno floruit. Huic accedunt Stephanus Atheniensis, quem alii Alexandrinum dicunt, quique commentarium in Galeni primum librum ad Clauconem exaravit, & si habeatur pro eo cognomento Chymicus, sub Heraclio, cui Chrysopœjam suam dicavit, vixisse constat; tum Theophilus cognomine Jatrofophista, Protospatharius, & Monachus, qui præter libros de urinis, de humani corporis structura, & in Aphor. Hipp. commentaria, alterum etiam de pulsibus composuit, sub titulo Philareti e Græco conversum. Aaron Alexandriæ Presbyter, qui triginta libros, Medicinæ Pandectas vocatos, scripsit, & Maserjavihius Syrus religione autem Judæus.

VIII. Seculo crassa ubique barbaries si Almanzor's aula Bagdad posita excipiat, quia, Abulpharagio teste, postquam Abbatis stirps, ea Omniadum decessa, ad Imperium evecta est, quod anno 746. contigit, Arabes desidia excussa Scientias sub Almanzore primum, dein per subsequentes Chaliphas mirifice ex-

coluere. Hoc vero seculo edificata ab Almanzore Bagdad, cum forti morbo is implicaretur, Georgium Bachtishauam Medicum Indicum Misaburi, quæ Metropolis Chorasana erat, degentem, ad se vocavit, qui multos deinde de Medicina Libros suo nutu traduxit.

IX. Seculo multum floruit Medicina in Asia apud Saracenos, ceu Arabes, quia in nova hac Civitate Bagdad, ubi popularis lingua erat Syriaca, insignis fuit quidam professor nomine Mesue, natione Syrus, Nisaburi oriundus, Pharmacopæi filius, & a Gabriele Bachtishuæ filio Medicina optime imbutus, qui magnum illico discipulorum numerum habuit, & Honain Hitæ oriundus, post longum iter per Græcas regiones in urbem Bagdad reversus, circa seculi medietatem Græcorum Medicorum opera in linguam Syriacā convertere orsus est, quā in re Filio Isaac, nepoteque Hodaish deinde imitatus est. Hinc celebres hac ætate comperimus Johannem Serapionem, qui veteris Medicinæ narrationem tradidit, & Rhafes Reinatus, quæ Urbs est in Iraco Persico, ceu potius in Provincia Chorasana, qui Bagdad migratus, inter centum præclaros Medicos ibidem commorantes electus est, ut celebrē quoddam in ea urbe Nosocomium curaret. Hic Auctor est libri *Continens* dicti, in quo ut Actuarius inter Græcos, sic is inter Arabas primus chymicorum remediorum mentionem iniecit.

X. Seculo valde multi inter Saracenos, Asiaticos Medicinæ Scriptores extitere, quorum tamen opera, sicut ab Arabica in latinam linguam nunquam versa sunt, ita penitus interiire; aliorum vero, quorum libri servantur, & supersunt, præcipuus Haly Abbas est, qui suum Amaleci, seu Opus Regium, quo perfectum Medicinæ Systema tradere præsumpsit, Chali-phæ Adad odausæ sermone magnifico orientalium more dicavit, tum Avicenna, aliter Abahali, Ebenhali ex Patre Hali, vel Ahafon, ebensina dictus, Bocharæ in Chorofana natus, qui eximio Opere, cuius titulus *Canon*, universam Medicinam amplexus est, & tanta fuit in celebritate, ut a quibusdam ad Viziris dignitatem ascendisse memoretur, quare etiam Princeps Alahali, vel Hassem fuit nuncupatus,

XI. Seculo illustres fuere Nonus, qui librum de

curatione morborum Constantino Porphyrogenito inscriptis, qui juxta Jeremiam Martium ejus vesificatorem, editoremque, Constantini Ducæ filius fuit, tum Michael Psellus, & Simeon Anthiochenis, & Abumeron Abenzoar, ceu Abimeron Avenyoar: qui librum *Thaïsser* dictum, confecit, & plerique alii Arabes, quorum Opera nihil memorabile continent; ut Abenguesit, Jesu Haly Bulcasem, Camanufali, Rabbi Moses &c. His accedunt Isaccus Deimiram Judæus, Simeon Sethi, qui ex Saracenis Artem in Italiam transtulit, Gabriel Surianus Rhazis traductor, Constantinus Afer Monachus Cassinensis, a quo florere cœpit Medicina Salerni, quod Campaniæ felicitis oppidum Cassinensi monastero adjacet.

XII. Seculo; sub ejus initium, Liber Scholæ Salernitanæ titulo prodiit, qui a Johanne Mediolanensi in ordinem redactus, totius Societatis nomine Roberto Normandiæ Duci, illius Gulielmi, qui Angliam subjugavit, filio, dicavit. Hic Leoninis versibus scriptus est, & de sanitate tuenda, sexque rebus nonnaturalibus dictis, agit. Floruere hoc seculo Rogerius Parmensis, juxta alios Salernitanus, Jamerius, qui tractatum Chirurgiæ edidit, & Rolandus pariter Chirurgus, sed hos omnes prævivere Alsaaravius, ceu Albuccasis scriptor Arabs, qui opus composuit *Al Tasrif* dictum, sive Methodum medendi, in triginta ac duo volumina divisum, & Stephanus Antiochenis, qui Haly Abbatem eo sermone, quo nunc legimus, latine convertit, Tandem circa finem seculi plerique Judæi passim Medicinam exercebunt; ut Benjaminus e Tudela suis peregrinationibus circa id tempus factis cognovit, quamquam ex Lege Canonica nulli Judæo Medicinam agitare liceret, Johannes Damascenus, Mesuen dictus, sub Friderico Barbarossâ Constantinopoli inclaruit, & Egidius Atheniensis Monachus ex ordine S. Benedicti versibus Hexametris, haud magna tamen syllabarum quantitatis ratione habita, de virtutibus medicamentorum, de urinis, & pulsibus scripsit, & Philippi Augusti Galliæ Regis Archiatri munus exercuit; Moschion, Demetrius Pepagnomenus, Actuarius & Nicolaus Mirepsus e Græcis Scriptoribus potestremus, qui sub Antidotarii nomine composita medi-



camenta pleraque in Græcis, & Arabicis dispersa, congeffit.

XIII. Seculo ineunte celebriorum Scripta Arabum, nonnullaque etiam Hippocratis, & Galeni ab ipsis Arabibus in patriam linguam conversa studio Salernitanæ Scholæ, jussuque Friderici II. Imperatoris, Litterarum, & Judicis, & Fautoris insignis, latine converti cœpta sunt, atque passim edi. Hinc illustres florere Medici, Gerardus Carmonensis, ex Carmona Andalusix urbe, qui interpretatus est librum Kyrami Kyramides in Hyrac Kin Koronides inscriptum, & quidam Persarum Regi tributum, Simeon Januensis, qui cum Abrahamo Judæo Serapionis opera ex Arabico in latinum transtulit, & Saladinus de Esculo, & Benvenutus Graphæus de Jerusalem, & Johannes Platearius. Tum circa medium seculi floruit, Gulielmus de Saliceto, Placentinus dictus, tum in Medicina, quam in Chirurgia peritus, Thaddæus Florentinus ejus coætaneus, qui Medicinam Bononiæ cum ingenti lucro professus est, Gibertus Anglus, Brunus Calaber Chirurgus & Theodoricus Episcopus Cervienfis, qui Bruni collectionem una cum quibusdam fabulis a Magistro suo Hugone de Luca surreptis suo nomine edidit. His accedunt Lanfrancus Mediolanensis Chirurgus, qui tempore Rodulphi Imperatoris in Aula Philippi Pulchri vixit, Petrus Hispanus ex Lusitania Episcopus Tusculanus, qui postea fuit Johannes XXI. Rogerus Bacco, Guillelmus Britannus, Turrifanus de Turrifanis, & Arnoldus de Villanova chemicus simul, & Medicus celebrerrimus, qui circa initium etiam sequentis seculi floruit.

XIV. Seculo Petrus de Apono statim in Italia occurrit Mægia suspectus, sed pendente lite mortuus, cujus tamen effigies flammis damnata est, Valescus de Taranta, Matthæus Sylvaticus, atque Franciscus Pedemontanus, uterque Medicus Roberti Siciliæ Regis, tum Mundinus Mediolanensis, qui Anatomix voluminem composuit; In Gallia non solum præfatus Arnoldus Villanovanus, qui sub Alberto I. Imperatore floruit; sed etiam Gordonius Monspeliensis, qui ingens conscripsit volumen *Lilium Medicinæ* vocatum.

in Anglia demum Johannes de Gaddesden auctor celebris Operis, Rosa Anglica dicti, & Joh. Ardernus, præterea in hoc seculo celebrantur, Guido de Cauliacus Bertrutii discipulus magni nominis, & experientiæ, ejus ætate Medici a curationibus Chirurgicis, ceu quæ manibus sunt, abstinere penitus cœperunt, Chirurgus Montpelix Professor, & postea Papæ Clementis Medicus, Bartholomæus Glanvillus, Johannes de Dondis, Agolinus de Monte, Gentilis de Fulgineo, qui Commentarium scripsit in Ægidii Poema, Dinus de Garbo, vel de Carbo, VVilhelmus de Varignana Judæus, Raymundus Lulius, Joh. de Rupe Scissa Monachus Ordinis minorum, & chymici artificii professor; tum Dini de Garbo præfati filius, Thomas, & Johannis de Dondis pater Jacobus, Auctor præclari Operis, quod *Aggregator* inscribitur, sub finem seculi demum Christophorus de Honestis Medicus Bononiensis, qui scripsit expositiones super Antidotarium Mesue, & Antonius Cernisenus, ejusque discipulus Michael Savonarola Patavinus, qui etiam circa initium sequentis seculi inclaruit.

XV. Seculo cum cæteris liberalibus Artibus etiam Medicina ornamenta suscepit, unde circa initia eminuere, Jacobus de Partibus, Jacobus, Foroliven-  
sis, Marsilius de S. Sophia, & Hugo Senensis, cum Johannes Marlianus, Bartholomæus Montagnana, Jo. de Conco regio Leonhardus Bertapalia, Jo. de Romanis Cremonensis, Nicola. Vernia, Antonius Goainerius, Joh. Arculanus in Chirurgia illustis, & Petrus de Argillata, qui primus ex Recentioribus Spinæ ventosæ per Chirurgia cœpit curationem. His accedunt Georgius Vella, Antonius Benivenius, VVendelinus Hoch, Panthaleon de Confluentia, Bavarius de Bavariis, Conradus Gilinus, Ludovicus Cornelius, qui de vitæ sobrietate elegantissime egit, & Joh. Matthæus de Gadibus ceu Gandavensis. Anno 1483. morbus, Sudoro Anglicus dictus in exercitu Regis Henrici VII. primo incœpit, & anno 1492. luis Venereæ quædam vestigia apparuere, quæ tamen duobus post annis in obsidione Neapolis Gallicum exercitum infecit, & paulo post a Gabriele Torella satis accurate descripta fuit. Hunc sequenti

sequuti sunt: Antonius Scanarolus, Sebastianus Aquitanus, Natael Montesaurus, & Nicolaus Leonicenus Ferrariæ professor, & Magnus Græcæ Medicinæ instructor, qua in re viam expeditam sibi reddi percepit a doctissimi Viri Hermolai Barbari Patritii Veneti studiis, qui illa ætate Galenum, & Dioscoriden ab innumeris erroribus expurgavit, adhibitis ad hoc Manuscriptis Codicibus, quos a Constantinopolis expurgatione, multi de Græcis in Italian fugientes, secum attulerat. Exeunte vero hoc seculo, & sub initium sequentis duo Medici apprime illustres etiam enituerunt quorum alter Casparus Torella fuit Cæsaris Borgiæ & Papæ Alexandri VI. Medicus, a quo etiam Episcopus Sanctæ Justæ creatus fuit, alter longe doctior Thomas Linacrus Anglus, qui sub Laurentio de Medicis Florentiæ Demetrio Chalcondyla in Græcis, & Angelo Politiano in latinis litteris usus est, & in Patriam redux Collegium Medicorum Londini fundavit, ejusque primus Præses fuit.

XVI. Seculo Hippocratis, Galeni, aliorumque Medicorum scripta, hucusque fere postliminio habita; in manus studiosorum una cum Græcis litteris; & disciplinis incidere crebro visa sunt, unde Medicina majori diligentia, & elegantia colli cœpit; Sed cum scriptorum numerus ab hinc mirifice in posterum excreverat, ut omnem confusionem evitemus, alphabetico ordine eosdem deinceps recensere statuimus. Quare revocato ad hujus seculi initium exortu morbi, qui Scorbutus dicitur, major pars scriptorum qui de Medicina, Anatome, Pharmacia, & Chirurgia egere sequenti Elencho explicamus.

Akakia Martinus.  
 Acquapendente Fabricius  
 ab  
 Alexandrinus Iulius  
 Almenar ceu Almeranus  
 Johan.  
 Alpinus Prosper  
 Altomarus Donatus Antoninus  
 Andreghetius Andreghetus

Andernacus Joh. Guntherus  
 Argenterius Johannes  
 Baccius Andreas  
 Ballonius ceu de Bailion  
 Gnliel.  
 Bartisch Georgius  
 Beyrus Petrus  
 Beli Lucianus  
 Bethancourt Jacobus de  
 Bodeffen Adamus



onacciolus Ludovicus  
 onacossi Hercules  
 otallus Leonhardus  
 ottoni Albertinus  
 rasavolus Andreas  
 rati Johannes  
 risiotus Petrus  
 rtes Laurentius  
 ajus cu Kaye Bernhardus  
 alment ceu Ciaumete ceu  
 Calmetæus Antonius  
 ampegius Symphorianus  
 ampolongus Æmilius  
 apivaccius Hieronymus  
 apra Marcellus  
 arcannus Joh. Baptista  
 arpius Jacobus vel Ca-  
 pensis Berengarius.  
 satus Joseph  
 sferius Julius  
 spius Georgius  
 taneus Jacobus  
 arleotus Gualterus  
 arretanus Johannes  
 efne Joseph du  
 audinus Jul. Cæsar  
 lumbus Realdus  
 rnachinus Thomas  
 rnarius Janus  
 stæus Johannes  
 arcellius Franciscus  
 assus Julius Paulus  
 rtius Matthæus  
 lecampius Jacobus  
 ntzius Johannes  
 natus Marcellus  
 andrus Johannes  
 ni Thaddæus  
 retus Ludovicus  
 stus Thomas  
 tachijs Joh. Martinus  
 lopius Gabriel

Faventinus Leonellus  
 Fernellus Johannes  
 Ferrara M. Camillus  
 Ferreri Augenius  
 Ferrius Alphonsus  
 Flexelius  
 Fœsius Anutius  
 Fonseca Rodericus a  
 Fontanon Dionisius  
 Foresti Petrus  
 Fracastorius Hieronymus  
 Franciotti Georgius  
 Franco Petros  
 Fricius Melchior  
 Fridevallis Hugo  
 Fuchsius Leonhardus  
 Fumanellus Antonius  
 Gallus Paschalis  
 Gavassietius Michael  
 Gazius Antonius  
 Gemma Joh. Baptista  
 Gerstorff Johannes von  
 Gesnerus Conradus  
 Gordonus Benhardus  
 Goræus Johannes  
 Grevinus Jacobus  
 Guinterus Johannes  
 Hasfurtus Johannes  
 Heri Tierri de  
 Herovius Bartholomæus  
 Hells Lobanus.  
 Heurnius Johannes  
 Hellerius Jacobus  
 Hucherus Johannes  
 Jacchinus Leonardus  
 Jacotius Desiderius  
 Ingrassias Joh. Philippus  
 Jordanus Thomas  
 Jossius Nicander  
 Kapfferus Matthæus  
 Lacuna Andreas  
 Lanfrancus

Laurentius Andreas  
 Libavius Andreas  
 Lusitanus Amatus  
 Magatus Cæsar  
 Maggius Bartholomæus  
 Manardus Johannes  
 Manni Joh. Jacobus  
 Maranta Bartholomæus  
 Marinellus ( Currius  
 ( Johannes  
 Martianus Prosper  
 Martyr Petrus  
 Massa Nicolaus  
 Massaria Alexander  
 Matthæi Johannes  
 Matthiolus Petrus Andreas  
 Maynardus Petrus  
 Mena Ferdinandus  
 Mercurialis Hieronymus  
 Minadaus Jo. Thomas  
 Minadoi Aurelius  
 Mizaldi Antonius  
 Montagnana Marcus An-  
 tonius  
 Monaltus Hieronymus  
 Montanus Joh. Baptista  
 Montius Sebastianus  
 Montuus Hieronymus  
 Morus Horatius  
 Nennerus Franciscus  
 Nicoli Nicolas  
 Niccolinis Annibal de  
 Nukus Antonius  
 Oddis Oddi de  
 Palmenius Julius  
 Panizza Ludovicus  
 Paparelle Sebastianus  
 Paracelsus Philippus Au-  
 relius Theophrastus Bom-  
 bast a Hobsthenheim.  
 Paræus Ambrosius  
 Parisiis Johannes de

Peramatus Petrus  
 Pinæus Severinus  
 Pini Petrus Matthæus  
 Pison Nicolaus  
 Pons Jacobus  
 Porta Joh. Baptista  
 Quercetanus Joseph  
 Rædus Johannes  
 Rhodion Eucherius  
 Riolanis Johannes  
 Roberti Octavianus  
 Rondelerius Gulielmus  
 Robus Matthæus.  
 Rossetus Franciscus  
 Rota Joh. Franciscus  
 Rudius Eustachius  
 Rueff Jacobus  
 Ruellius Johannes  
 Ruffen Jacobus  
 Ryff. Gualt. Hermanni  
 Salius Diversus Petrus  
 Sanctus Marianus Bar-  
 tanus seu ex Barulo  
 Saporta Antonius  
 Scacchus Durans  
 Schamais Leonhardus  
 Schylandrus Cornelius  
 Septalius Ludovicus  
 Silvaticus Joh. Baptista  
 Solenander Reinerus  
 Spachius Isdrael  
 Sporischius Johannes  
 Susembetus Lazarus  
 Susius Joh. Baptista  
 Sylvius Jacobus  
 Tagaultius Johannes  
 Taliacotius Caspar  
 Taurellus Nicolaus  
 Thriverus Hieremias  
 Toletus Petrus Jacobus  
 Trangus Hieronymus  
 Trincavellus Victor



Tronus Petrus Martyr  
Turinus Andreas  
Valleriola Franciscus  
Valesius Franciscus  
Vauguion  
Vega Christophorus à  
Vesalius Andreas:

Vierius Johannes  
Vigo Johannes de  
Virgilius Marcellus  
VVittichius Johannes.  
VVerkerus Joh. Jacobus  
VVolfius Caspar.  
VVutzius Felix

XVII. Seculo Litterarum studium adeo incaluit; ut in omni facultate longe plures Scriptores, quam singulis præteritis Seculis, in lucem prodierint, præsertim vero in Arte Medica; quorum nomina juxta nobis propositam Synopses Methodum sunt, ut sequitur.

Abeille  
Acosta Joseph de  
Aggravi Joh. Franciscus  
Agricola Johannes  
Aicholtyius Johannes  
Alaymus Marc. Antonius  
Albinus Benhardus  
Albrechtus Joh. Guntherus  
Aldrovandus Ulisses  
Allegri Hieronymus  
Alliot Joh. Baptista  
Almacherus Joh. Fridericus  
Alpinus Prosper  
Alfarius Vincentius  
Amideus Matthæus  
Ammanus Paulus  
Andreæ Johannes  
Andriollus Mich. Angelus  
Angelini Facondius  
Antonides Antonius  
Aquapendente Hieronymus,  
Fabricius  
Arancius Julius Cæsar  
Arcus Franciscus  
Arniseus Henningius  
Asellius Caspar  
Augenius Horatius  
Bachmeister (Matthæus  
(Johannes

Baeconus de Verulamio  
Franciscus  
Baldilius Valerius  
Baldinus Bernhardus  
Baldonius Sigismundus  
Baldutius  
Banzer Martinus  
Barbati Hireonymus  
Barbette Paulus  
Barlæus Caspar  
Bartholdi Gregor. Theodorus  
Bartholinus (Caspar  
(Thomas  
Bartoletus Fabricius  
Bartschius Jacobus  
Basapopi Gnesius  
Battus Conradus  
Bauderon  
Bauhinus (Johannes  
(Caspar  
Bauschius Joh. Laurentius  
Bayle Franciscus  
Bazzicaluvæ Ascanius Maria  
Becke David von  
Beckerus Daniel  
Be-

Becherus Jachimus  
 Bejerus Gottofridus  
 Bennet, ceu Benedictus  
 Christophorus  
 Bergerus Joh. Gotthfridus

( Hieronymus  
 Beslerus ( Misihael Ru.  
 ( pertus

Betera Felicianus  
 Beurerus Joh. Jacob  
 Beverovicus Johannes  
 Beyer Joh. Hartmannus  
 Beynon Elias  
 Bianchi Joh. Baptista  
 Bierlingius Caspar Theo-  
 philus.

Bilichus Anton. Gunterus

Blancardus Stephanus  
 Blasius Gherardus  
 Blegnyus Nicolaus  
 Blondius Michael Angelus

Bocconi Paulus  
 Boe Sylvius Franciscus de  
 le

Bohnius Johannes  
 Bokelmannus Andreas  
 Bologna Joh. Stephanus  
 Benetus Theophilus  
 Bonham Thomas  
 Bonocore Thomas  
 Bontekoe Cornelius von  
 Bonvinus Elias

( Petrus  
 Borelli ( Joh. Alphon-  
 ( sus

Borrichius Olaus  
 Boselli Franciscus

Bovius ( Thomas  
 ( Hyacinthus

Bra Hernicus a  
 Brachi Jacobus  
 Bravo Caspar  
 Brandelius Zaccharias  
 Brenzelius Ioh. Hieronymus

Brovune Joh. Thomas  
 Brumaldi Joh. Antonius  
 Brunn Joh. Jacobus a  
 Brunnerus Balthasar  
 Brunonus Jacobus Pancratius

Buonacorsi Bartholomæus  
 Burgeois Aloisia

Burgers Petrus  
 Burri Franciscus Ioseph  
 Busæus Johannes

Bussolus Aurelius  
 Buttler Carolus

Cabibi Samuel  
 Cæsalpinus Andrea

Cæsius Bernhardus  
 Caimus Pompejus

( Joachinus  
 Camerarius ( Elias Ru-  
 ( dolphus

Campanella Thomas  
 Canonarius Petrus Andreas

Cappella Joh. Antonius  
 Capelluti Rolandus

Capua Leonhardus a  
 Capponus Joh. Baptista

Caranza Alphonsus  
 Cardanus Hieronymus

Cartes Renatus des  
 Casaleni Joh. Antonius

Casse Johannes a

Castellanus ( J. M.  
 ( Petrus

( Bartholo-	Cortummius Iustus
( meus	Courtial Ioh. Ioseph
Castelli ( Iohannes	Couttin Germanus
( Petrus Va-	Covvard Gulielmus
( fcus	Craanen Theodorus
( Steh. Rode-	Cramer Caspar
Castro ( ricus de	Craſtius Jo. Iacobus
( Petrus a	Crato Iohannes
Cauſapè Anicetus	Craufius Rudol. Guliel-
Chatas Moïſes	mus
Camberlains	Cregatus Ioh. Daniel
Chambre de la	Crelius Ludovic. Chriſtia-
Carriere Ioseph	nus .
Chreſnephorus Ioh.	Cremoninius Cæſar
Chiariana Marianus	Crolius Ofvvaldus
Chiffletius Ioh. Iacobus	Cruce Andreas a
Chriſtiani Andreas	Crufius David
Chriſtiani Bernardinus	Culmanus Iohannes
Chunius Ioh. Philippus	Cuno Ioh. Clemens
Clerc le	Cyprianus Abrahamus
Cloos du	Dale Antonius von
Clovves Guilelmus	Daggelerus Tobias
Cluſius Carolus	Daviſonus Gulielmus
Cneulinus Tobias	Dekkers Fridericus
Cnutius Iuſtus	Dellera Matthias
Cobertius Tobias	Deodatus Claudius
Codronchius Baptiſta	Denſingius Antonius
Cognatus Manilius	Deventer Henricus
Coiter Volcherus	Diemberbroeck Isbrandus
Cole Guglielmus	von
Colbach Iohannes	Dieterinchius Ioh. Conra-
Colle Iohannes a	duſ
Coleus Martinus	Dietericus, vel Didricus
Colnerus Iohannes	Helvvig
Cologninus Angelus	Digbæus
Conrigius Hermannus	Dionis Petrus
Contulus Ioh. Baptiſta	Dodonæus Rembertus
Cooke Iacobus	Dæbelius Ioh. Iacobus
Corbye A. de	Dæringius Michael
Cornacchinus Marcus	Dolæus Iohannes
Cortefius Ioh. Baptiſta	Doldius Leonhardus
Cortilionis Sebaſtianus	Donkers Laurentius



Donnoli Francisc. Alphon-	Finckius Thomas
fus	Fioravanti Leonhardus
Dornavius Caspar	Flemming Paulus
Dorncreilius Tobias	Flud de Fluëtibus Rober-
Drelincurtius Carolus	tus
Droke Jacobus	Foglia Joh. Antonius
Dryander Johannes	Fonseca ( Gabriel de
Duretus Ludovicus	( Rodericus a
Dygby Kenelm	Font Carolus
Eggerdesius Alardus Mau-	( Jacobus
ritius	Fontanus ( Nicolaus
Eichstadius Laurentius	( Gabriel
Ellan Nicolaus	Formyus Samuel
Elsholz Joh. Sigismundus	Fortis Raymundus Joh.
Entius Georgius	Frachus Johannes
Esthius Lnbertus	Fragoso Johannes
Ettmullerus Michael	Frambesarius Nicol. Ab
Eustachius Bartholomæus	rahamus
Eyselius Joh. Philippus	Framboisiere
Eysenbarthus Joh. Mi-	Franchimont Nicolaus
chael	Franckeusfeldi.
Faber Hieronymus	Franciscus de Francisci
Fabra Aloysius	Johannes
Fabris Petrus Johannes	Franckenius Johannes
Fabricius Jacobus	( Johannes
Fabricius Hildanus Guliel-	Francus ( Georgius
mus	Fraundorffier Philippus
Falcinellus Bernardinus	Freberus Paulus
Falcon Johannes	Freitagius Johannes Hen-
Fanoisius Guido	ricus
Faschius August. Henri-	Frey Janus Cæcilius
cus	Friderici Arnoldus
Fehrius Joh. Michael	Frigius Petrus Franciscu
Felde Johannes	Frommanus Joh. Christia
Feltman Gerhardus	nus
Ferrandus Johannes	Fuiren ( Georgius
Ferrara Gabriel	( Henricus
Feyneus Franciscus	Funckius Johannes
Fidelis Fortunatus	Frundeck Joh. Ludovicu
Fienus Thomas	Gabelcovero VVolfangu
Filgi Gulielm. Ludovi-	Gabelchoferus Osvaldus
cus	Garnerius Georgius

Gaihalduſ Johannes  
 Gakenholziuſ Alex. Chriſt-  
 ſtianuſ  
 Garneriuſ Georgiuſ  
 Galaratuſ Joſeph  
 Galedo Iohaneſ  
 Galvanuſ Dominiçuſ  
 Gaſſaruſ Achileſ Pirm.  
 Gaſto Flaminiuſ  
 Gaukeſ Yvô  
 Gehena Januſ Abrahâ-  
 muſ a  
 Geigeruſ Malachiaſ  
 Geilfuſiuſ Bernard. Gui-  
 lelmuſ  
 Geiſleruſ Laurentiuſ  
 Galmannuſ Georgiuſ  
 Gendre Antoniuſ le  
 Gendron Deſhaieſ  
 Genga Bernarduſ  
 Georgiuſ Matthæuſ  
 Gerbeziniſ Marcus  
 Geyeruſ Joh. Daniel  
 Gladbachiſ Joh. Bernhar-  
 duſ  
 Glandorpiuſ Matthias  
 Glaſeruſ Joh. Henricuſ  
 Gliffoniſ Franciſcuſ  
 Gnoſſeliſ Andreaſ  
 Gocleniuſ Rudolphuſ  
 ( Eberarduſ  
 GoeKeliuſ ( Jo. Chriſto-  
 ( phoruſ  
 GælicKe Andr. Ottomar.  
 Gourmelin Stephanuſ  
 Graaf Regneruſ de  
 Grammiuſ Cæſo  
 Greiffenſ Sebaſtianuſ  
 Gremb. Franciſcuſ Ofvval-  
 duſ  
 Greſſer Joſeph  
 Griffoniſ Angeluſ

Grimberg Nicolauſ  
 Grimm Hermannuſ Ni-  
 colauſ  
 Groenevelt Johannes  
 Groſſeuſ ceu Chortoloſ-  
 ſæuſ Joanneſ  
 Grube Hermannuſ  
 Grubimann. Joh. Gott-  
 friduſ  
 Grulingiuſ Philippuſ  
 Guarinoniſ Chriſtopho-  
 ruſ  
 Guibertuſ Philippuſ  
 Guillemeau Caroluſ  
 Guldênkleee Balthaſſar Ti-  
 mæuſ a  
 Gutierez Joh. Lazaruſ  
 Guyard  
 Haſenſeſſeruſ Samuel  
 Hamman Ludovicuſ von  
 Hannemannuſ Joh. Ludo-  
 vicuſ  
 Harderuſ Joh. Jacobuſ  
 Harris Gualteruſ  
 Harmannuſ Johannes  
 Harvæuſ Gulielmuſ  
 Havenreuter Joh. Ludo-  
 vicuſ  
 Haverſ Cloptonuſ  
 Hauptmannuſ Auguſtuſ  
 Hechſtetter Philippuſ  
 Heinziuſ Iohanneſ  
 Helmont Io: Bapt. von  
 Helveriuſ  
 Helvvig Iohanneſ  
 Henninger. Ioh. Sigifmun-  
 duſ  
 Heredia Petruſ Michael  
 de  
 Herliciuſ David  
 Herlſ Corneliuſ

Hessus	( Matthæus	Ioel Franciscus
	( Iohannes	Ioepserius Iacob-Iosep.
Hildebrandus	Andreas	Iond Philibertus
Hildanus	Fabricius	Ionge Iames
Hiskia	Iohannes	Ionthonus Iohannes
Hobokenus	Nicolaus	Ioubertus Laurentius
Hechesterus	Philipus	Iungken Ioh. Helfricius
Hoeferus	VVolfangus	Iungermann Ludovicus
	( Mauri-	Kanoldus Iohannes
	( tius	Keldermann Cornelius
	( Lauren-	Kellnerus David
	( tius	Kentia Comitissa ceu vo
Hoffmannus	( Caspar	Kent
	( Ioss. Ia-	Keplerus Ludovicus
	( cobus	Kern Iohannes Frider.
	( Frideri-	cus
	( cus	Kerkringius Theodorus
Holder Iulius		Kergerius Martinus
Hollzapffel	Martinus	Khunrath Henricus
Homburgius	Andreas	Kirchmaier Iohannes
Homburgem	Anna Elisabe-	( Petrus
tha		Kirstenius ( Ioh. Geor
Horlacherus	Conradus	( gius
Horne Iohannes	von	Knaut Christophorus
Hernschuchius	Hierony-	Kneufelius Crist. Frider
mus		cus
Hornungus	Iohannes	Knoblochius Iohannes
Horstius	( Gregorius	Koenerding Adrianus
	( Ioh. Daniel	Krugius Theodor. Cristo
Hortensius	Martinus	stophorus
Huberus	Rudolphus	( Ioh. Sophro
Hueta Hieronymus	de	( nius
Hutter	Andreas	( Christoph
Huxholtzius	VVolrad.	( rus
Iebtingius	Iohannes	Languedelius Bernardus
Iens	Petrus	Lange ( Iohannes
Iessenius	a Iessen Iohan-	( Christianus
nes		Lanzonus Ioseph
	( Franciscus	Lanzverde Ioh. Baptista
Imperialis	( Ioh. Bapti-	( Henricus
	( sta	Lavaterus ( Ioh. R
Ingolsterius	Iohannes	( dolphus



Lauhier Ioh. Franciscus	Marchetti Petrus de
Launay Carolus Dionisius	Marggravius Georgius
	Marioti Carolus
	Marius five Meiërus Georgius
Laurembergius ( Petrus	
	( Gu-
	( lielmus
Lauterbächius Ioseph	Maroja Cyprianus de
Leaufon	Maroldi Ortolphus
Lecheliuſ Iohannes	Marquandus Iohannes
Leeuvvenhoekius Antonius	Marque Iacobus de
von	Marten Iohannes
Lemnius Levinus	Martinus Henricus
Licetus Fortunius	Martinius Valerius
Liddelius Duncanus	Martius Iohannes
Lilius Franciscus	Masiero Philippus
Lequin	Masini Iohannes Ant-
Linden Ioh. Antonides von	nius
der	Mettenburgius Iohann.
Linschöten Ioh. Hugo a	Maubeus
lister Martinus	Mauretus Christophurus
lobellius Matthias	Mauticeau Franciscus
lofeliuſ Iohannes	Mayerne Theodorus
lofen Laurentius	Mayovv Iohannes
loth Georgius	Meber Ioh. Cornelius
lothichius Ioh. Petrus	Leckten Iob
lovverus Richardus	( Henricus
lovvthorpiuſ Iohannes	( Daniel
lucius Cyriacus	Meibomius ( Henricus
lufitanus Zacutus	( Ioh. Henri-
lyſer Michael	( cus
Macafius Ioh. Georgius	Meichſnerus Eſajas
Magati Ioh. Baptiſta	Meiſſonieriſ Lazarus
Magiſter Rudolphus	Menjociuſ Antoniuſ
Megenenſ Ioh. Chriſtophoruſ	Menzeliuſ Philippuſ
Magni Petruſ Pauluſ	Mercatuſ Ludovicuſ
Majoriſ Ioh. Daniel	Mercier Petruſ le
Malphi Tiberiuſ	Merklinuſ Georg. Abra-
Malpighiuſ Marcelluſ	ham
Mandeliſ Ioh. Alber-	Mercuriuſ Scipio
tus a	Mercurialiſ Hierony-
Mappuſ Marcuſ	muſ
	Mermannuſ Thomuſ
	Mery Iohanneſ

Meius Adrianus	Mundus ceu Mundy Hen-
Mezgerus Ge. Balthasar	ricus
Michael Johannes	Munnincks Johannes
Michaelspacherus Stepha-	Munsterus Johannes
nus	Muraltus Johannes
Milius Joh. Daniel	Musgrave
Milius Julius	Musitanus Carolus
Mindererus Raymundus	Muys Johannes
Mitri Paulus	Mye Fridericus von det
Moceius Jacobus	Mylus Joh. Daniel
Mearta ( Dermutius de	Narvaticus Matthias
Edmundus	Neretius Neretus
Moebius Gottofridus	Neucranzius Paulus
Moellenbrocius Valerius	Nicoti Nicolas
Andreas	Nicotius Jacobus
Mollerus Jacobus	Nierembergii Joh. Euse-
Moenichen Henricus a	biius
Molinetti Antonius	Noslerus Georgius
Molerus Johannes	Novarinus Antonius
Monovius Fridericus	Nymannus Gregorius
Monnier L.	Occhi Hieronymus
Montalbanus Ovidius	Occo Adolphus
Montaltus Philothæus	Oethæus Iacobus
Montanus Johannes	Olearius Adam
Montecalvus Vicentius	Ortlobius Ioh. Fridericus
Moor Bartholomæus	Overkampius Heideare-
Mareau Renatus	ich
Morellus ( Johannes	Pacius Fabius
( Petrus	Palma Georgius
Morinus Joh. Baptista	Pancovius Thomas
Morison Robertus	Pandolphimus Iosep.
Morley Carol. Ludovi-	Pansa Martinus
cus	Papinius Nicolaus
Mortius Jacobus	Parma Hippolitus
Moxius Joh. Raphael	Patin ( Guidus
Moyle Joh.	( Carolus
( Philippus	Pauli Simeon
( Nicolaus	Pavv Petrus
Mullerus ( Theophilus	Peccetius Franciscus
( Gulielmus	Pechlinus Io. Nicolaus
( Henricus	Pecquetus Iohannes
Mundinius Mundinus	Pellicia Paulus



Pelshoferus Joh. Geor-	Queccius Gregorius
gius	Quentin Iust. Ott.
Perdulcis Bartholomæus	Quentzius Petrus
Peredæ Petrus Paulus	Ragazzina Franc. Ferdi-
Perizonius Christianus	nandus
Perla Franciscus	Rajus Iohannes
Petermanus Andreas	Ramelovius Matthæus
Petit Petrus	Ranchinus Franciscus
Petrejus Simon	Raynaud
Petræus Henricus	Read Vilhelmus
Peu	Rebeque Ioh. Constan-
Peucus Caspar	tius
Pfisterus Alexander	Regius Henricus
Pfizer Jo. Nicolaus	Rehefeldius Iohannes
Pictorinus Georgius	Rejes Caspar a
Piens Franciscus	Reinesius Thomas
Pietragrossa Bartholomæus	Renodæus Iohannes
Pietreus Nicolas	Restaurant Raymundus
Pigræus Petrus	Rex Sigismundus
Pincier Iohannes	Reysinghius Ioh. Henne-
Pintus Callinus	mannus
Pipemus Petrus	Rheinanus Iohannes
Pira Hieronymus de	Rhinus VVielhelmus
( Fœlix	Rhodium Iohannes
Platerus ( Thomas	Rhumelius Ioh. Conradus
( Andreas	Rhunenburg B. I.
Plempius Vopiscus Fortu-	Riedillinus Vitus
natus	Riverius Lazarus
Plazzonus Franciscus	Rivinus olim Bachmann
Ponce Antonius	Andreas
Portal Paulus	Rolandus Iohannes
( Ioab. David	Rolfincius Guernerus
Portius ( Lucas Anto-	Romani sive de Roma
( nius	Franciscus
Posthius Iohannes	Romanus Guglielmus
Potterius Petrus	Ronsseus Balduinus
Prævotius Iohannes	Roonhuysen Henricus
Prat Ellis	Rosa Andreas
Purmannus Matth. Gotto-	Rota Michael Angelus
fridus	Roth Melchior
Puteanus Gulielmus	Rubeus Hieronymus
	Rudius Eustachius

Rudolphus Ioh. Gabriel	Schnitzeras Sigismundus
Ruff Petrus	Schneidermannus Ioh.
Rulandus ( Pater	Scholtzius Laurentius
Martinus ( Filius	Schoockius Martinus
Rumbaumius Christophorus	Schorerus Christophorus
Sacci Pompejus	Schoute VValtherus
Sachsius a Levvenheim Philippus Iacobus	Schrariæ Fridericus
Salmuthus Philippus	Schretæ Henricus
Salvi Tanuccius	Schræderus Iohannes
Salvius Iohannes	Schutzus Tobia
Salzmannus Ioh. Rudolph.	Schvvartzens Ioh. Caspar
Sanctorius Sanctorius	Schvvchenkfeld Caspar
Sandris Iacob. de	Scultetus Iohannes
Santinellus Bartholomæus	Sebitius Melchior
Santorellus Antonius	Sendivogius Michael
Sartori Petrus	Segerus Georgius
Sascerides Gellius	Scidelius Iacobus
Saviard	Sennertus Daniel
Saxonia Hercules de	Serrier Teophilus
Sbaralæa Ioh. Hieronymus	( Marc. Aure-
Scala Domenicus de la	Severinus ( lius
Schefferus ( Carolus	( Petrus
( Sebastianus	Sigemundia Iustina
Schelhammerus Guntherus	Siglizius Iohannes
Sckenkhus ( Pater	Silvaticus Benedictus
Iohannes ( Filius	Sinibaldus Ioh. Benedictus
Scherhius Philippus	Slevogtius Ioh. Hadrianus
Scheurl Christoph. Theophilus	Smetius Henricus
Schiffman Iosep	Solingen Cornelius
Schilling ( Sigismundus	Sommers Ioh. Georgius
( Andreas	Sorbait Paulus de
Schirlæus Thomas	Sparr Ioh. Caspar
Schizius Melchior	Spead Iohannes
Schmidt ( Iohannes	Spehrerius Petrus
( Ioseph	( Paulus Cot-
Schneiderus Conrad. Victor	Sperlingius ( tofridus
	( Iohannes
	Spigellius Adrianus
	Sponius Iacobus
	Stanerus Iohannes
	Stalpartius Cornelius

teeghus Gottofridus	Titelmann Iohannes
teinius Gottofridus	Toler Franciscus
terre D. L.	Tonerus vel Tovvnerus
thnonius Nicolaus	Augustinus
tiglerus Samuel	Tozzi Lucas
tisser Ioh. Andreas	Torius Raphael
tokmannus Iohannes	Traffelman Ioh. Frid.
Strausius Laurentius	Tulpius Nicolaus
tupanus ( Ioh. Nicolaus	Turquetus Theodorus
( Emanuel	Turnerus
tylle Petrus von der	Valsalva Antonius Ma-
uevus Bernardus	ria
ulzberger Sigism. Ru-	Varus Antonius
pertus	Velthusius Lambertus
uterus Iacobus	Verandæus Iohannes
vvalva Bernardus	Verbesius David
vamerdamius Iohannes	Verduinus Petrus Adria-
achenius Otto	nus
anckius Ioachim	Vernerus Abraham
andlerus Tobias	Verpoortenus Ioh. Guliel-
anstetterus Georg. Col-	mus
limitius	Verzascha Bernardus
appius Iacobus	Veslingius Iohannes
aranta Valescus de	Vestus Iustus
assins Leonhardus	Vettori Benedictus
Tencke H.	Uffenbachius Petrus
erentius Iohannes	Ulmus Franciscus
erenzonus Ioh. Antonius	Viardel Cosimus
Testi Ludovicus	Vieussens Raymundus
hevenin Franciscus	Vidi Vidi
hevenot Michael Mel-	Vigierius Iohannes
chusadeck	Viscerus Iohannes
Thile Iohannes	Vimpineus Ioh. Albertus
Thrustonus Malachias	Viviani Vivianus
Tibaut Petrus	Untzer Matthias
Tidicæus Franciscus	Vœlters Christophorus
Tilesius Bernardus	Voglerus Valentinus Hen-
Tilingius ( Iohannes	ricus
( Matthias	Volckammerus Iohan.
Timæus Balthassar	Georgius
Tinctorius Christophorus	Volgnadus Henricus
Tirellis Mauritius	Voorde Cornelius vonder
	Ælias



xxvi	P	R	Æ	F	A	T	I	O.
	(Ælias	Ever-	V	Whitakerus	Tobias			
Vofsius	(hardus		V	Viel	Stalparitus	von der		
	(Adolphus		V	Vilifius	Thomas			
Vroling	Abraham. Len.		V	Virdig	Sebastianus			
	(Rudol.		V	Vifemanus	Richardus			
VVagnerus	(Christianus		V	Vormius	Olaus			
	(Joh. Ger-		Z	acchias	Paulus			
	(rhadus		Z	acutus	Lufitanus			
VVahrmund			Z	apàta	Joh. Baptifta			
Vartonus	Thomas		Z	arotti	Cæfar			
VValdschmiedt	Joh. Jacob.		Z	avona	Maximil.			
VVekerus	Joh. Jacob.		Z	ecchius	Johannes			
VVedelius	Ge. VVolffgan-		Z	eidlerus	Johannes			
gus			Z	eißus	Matthæus			
VVeicardus	Arnoldus		Z	ellerus	Johannes			
VVeinderus	Johannes.		Z	ittmanus	Joh. Fridericus			
	(Gottofridus		Z	obelius				
VVelfehius	(Georg. Hie-		Z	vingerus	Jacobus			
	(ronymus		Z	volfferus	Jacobus			
VVestphals	El.		Z	volfferus	Johanne			
VVeypert	Joh. Francifcus		Z	ypæus	Francifcus			

XVIII. Seculo cujus hoc anno 1762. jam prætergressi fummus medietatem, quæ ad Medicinam spectant Scientifica methodo pertractari orsa sunt, quia novæ Scientiæ, a Cartesio magni ingenii Viro vehementer promotæ, quæ Algebra dicitur, præsidio, cum Mechanica nova additamenta, majoremque perspicuitatem, & nitorem suscepisset, hominibus datum est, ut per singulas Physices partes speditius altiusque penetrare possent. Hac vero prælucente face, quæque jam eximius Alphonsus Borellus mox præterito seculo feliciter ausus erat suppetitas ferente haud difficile fuit ut quid scitu, & quæsitu dignius esset in humani corporis compage, ejusque partium muneribus ad valetudinem servandam, vel hac nutante ad morbos gignendos perspiceretur. Quare ab initio usque in Angliâ Pitcarnius, Freindius, & Keillius, in Italia Eellinus, & Baglivus, apud Helvetios Bernoullii fratres, quorum meditationibus plurimum usus est Michelottus; & in Belgio celebratissimus Boerhaavius, OEconomix animalis causæ & rationes, morborum Theorias, remediorumque actiones,

nes, ut ad simpliciora capita redigerent, & ad solidum iudicium, geometrarum more demonstrationibus exornatis, exigent, totis viribus annixi sunt, feliciterque etiam rem ad maiorem in dies suspiciendam perfectionem idoneam reddidere. Huic sane Theoriæ Medicæ in Scientiam adstructioni non parum opitulata est Anatomes. quæ hoc ipso seculo mirum in modum ex-culta jam omne, cujus capax est, perfectionis culmen tetigisse videtur, & in qua nisi parvi momenti aliqua adhuc desiderari possunt. Morborum causis per Anatomicas, mechanicasq. rationes explicatis, remediorumque actione per chimica physicaque experimenta perspectis, etiam Praxis modum exinde recepit, quæ rationalis methodi beneficiis decorata cognovit, quæ diligenter observari; quæve perfunctorie tantum. & quæ demum tuto negligi mærerentur. Eidem innotuit etiam nil omnino proficere, quod præteritis temporibus ex Artis quasi præcepto usuveniebat, observationes indiscriminatim congerere, monitus. cautionesque confurcinare, quæ natura sua conjuncta sunt, & nisi unum idemque significant, importuna diligentia distinguere, vel contra unum reputare, quod reapse multiplex est, & utiliter semper distinctum percipitur, & docetur. Hujusmodi orrores, qui per exercitium Medicinæ nisi crebro nimis committendi se se offerunt, a sana Theoria per pelle expunguntur, quod præ omnibus incomparabilis Boerhaavius, ejusque solertissimus, doctissimusbq. discipulus, & Commentator D. Vanschviftten S. R. J. M. Archiater; & Consiliarius apertissime evincunt. His delibatis quoad Medicinæ progressus in hoc seculo, tempus est, ut Elenchum plerorumque Scriptorum huc spectantium juxta nobis constituam methodum subjiciamus.

Aldolphus Christ. Michael	Amiand Claudius
Aird. Iacobus	Andry Nicolaus
Alberizzi Petrus Ioseph	Anel Dominicus
Alberti Michael	Armstrong Ioh.
Alghisius Thomas	Astruc Iohannes
Allen Iohannes	Arvvel Ioseph.
Alrutz Ioh. VV.	Bacchettoni Hieronim. Leopoldus
Amand Petrus	

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Baget Iohannes             | Bernoullius ( Nicolaus    |
| Baglivus Georgius          | ( Iohannes                |
| Bajerus Ioh. Iacobus       | Bertini                   |
| Balderston G.              | Beverlinus Rudolph. Phi-  |
| Balgný Carolus             | lippus                    |
| Banier Henricus            | Bianchi Ioh. Baptift.     |
| Barbette Gregorius         | Bianchini Ioh. Fortunatus |
| Barbeyrac                  | Bidlóo Gottofridus        |
| Barchufen Ioh. Conradus    | Biumus Paulus Hierony-    |
| Barnerus Iacobus           | mus                       |
| Baroy Hyacinthus Theo-     | Blakftonium Iohannes      |
| dorus                      | ( Petrus                  |
| Barrerre                   | Blanchus ( Ioh. ceu Ianus |
| Barry Odoardus             | ( Plancus                 |
| Baffius Henricus           | Blondelus                 |
| Baumlers Gottofrid. Samuel | Blondet                   |
| Bautzmannus Io. Crifto-    | Boccacini Antonius        |
| phorus                     | Bodley                    |
| Bayle Francifcus           | Boe Franc. Sylvius de le  |
| Bazzicalue Afcanius Maria  | Boerhaave Hermannus.      |
| Bek Andreas                | Bœttichœrus Ioh. Gottlieb |
| ( Ioh. Con-                | Bohnus Iohannes           |
| ( radus                    | Bona Iohannes de la       |
| Bekerus ( Io. Ioachi-      | Boners Nicolaus           |
| ( mus                      | Boschetti Bartholomæus    |
| ( Ioh. Frideric.           | Bofius Cafpar             |
| Belchier Ioannes           | Boulduc                   |
| Benetti Io: Dominicus      | Bovart                    |
| ( Rugerus Au-              | Boulton Richardus         |
| ( guftus                   | Braken Henricus           |
| ( Georgius                 | Brandius Michael          |
| Behrens ( Henricus         | Graunerus Ioh. Iacobus    |
| ( Conradus                 | Bremônd                   |
| ( Bertoldus                | Breynius Ioh. Philippus   |
| Bellini Laurentius         | Brindley I.               |
| Bellofte Anguftinus        | Brinius Ioh. Thomas       |
| Benevoli Antonius          | Briffeau D.               |
| Berdotus                   | Broen Iohannes            |
| Benini Vincentius          | Brogiani Ioh. Domini-     |
| Bergerius Ioh. Georgius    | cus                       |
| Bergier Antonius           | Brovv ( Thomas            |
| Bernerus Gottlieb Ephraim  | ( Andreas                 |



Bruhier	Clericus Daniel
Brunn. Ioh. Conradus	Cocchi Antonius
Bubben Iohannes	Cockhburnus Gulielmus
Buchnerus And. Elias	Cohausen Ioseph. Henricus
Budæus Gottlieb	Colot Franciscus
Buchardus Christ. Martinus	Comincioli Iacobus
Bugmannus Petrus Christophorus	Commelinus Caspar
Burlet	Contulus Ioh. Baptista
Burnettus Thomas	Cornacchinus Petrus
Burton Gulielmus	Corte Bartholomæus
Bussiere	Coschhvvitz Georg. Daniel
Butini Ioh. Antonius	Couper
Butter Alexander	Crannen Theodorus
Calde Iacobus	Cranz Heuricus Nepomucænus
Calmette Franciscus	Crelius Fridericus
Camerarius Rudolph. Iacobus	Crescentius Nicolaus
Contarini Angelus	Cron Ludovicus a
Carl P. S.	Dale Thomas
Carli Ioh. Hieronymus	Davies Evan
Carlius Ioh. Samuel	Deguerus Jo: Hartmanus
Cartheuser Ioh. Fridericus	Deidier Antonius
Castro Iacobus a	Delius
Cat Nicolas le	Democritus Christianus
Cattanius Nicol. Antonius	Denys Iacobus
Cestoni Hiacynthus	Depre Joh. Fridericus
Chabert	Derham { Gulielmus
Chapmans Edmundus	{ Thomas
Charras Moyfes	Default
Chavalier Io. Damianus	Dethardingius Georgius
Cherardi Robertus	Deventer Henricus
Chefeldenus Gulielmus	Dibon
Chefneaus Nicolaus	Dillenius Iacobus
Chiarana Marianus	Dionis Petrus
Chicoyneau Franciscus	Dodart
Chirac Petrus	Dodd Petrus
Chomel Ioh. Bapt. Ludovicus	Dolæus Iohannes
	Douglass { Iacobus
	{ Iohannes
Cirillus Nicolas	Dran Henric. Franciscus le
Clacius Georgius	Drelincurtius Carolus
Clauderus Christ. Ernestus	Drummond Iohannes

Dube	Frichsens Iohannes
Dubon Claudius	Furstenau Ioh. Hermannus a
Dumoulin	Gandini Carolus
Dundas Iohannes	Garengot Iacob. Croissant
Eames Iohannes	Genga Bernardinus
Eckbardus	Genorini Michael
Eems Iacobus van	Geofroys Stephanus
Eggerdesius Alard. Mauri-	Geraudi
tius	Gherli Fulvius
Ellerus Joh. Theodorus	Ghisi Martinus
Erndelius C. H.	Gianella Carolus
Erfeldt Joh. Franciscus	Gibbs
Eschenbach. Christ. Fride-	Gibson Ioseph
ricus	Giffardus Gulielmus
Ettmullerus Michael	Gilcrist Ebenezer
Eucherius Camillus	Gismondit di Gubbio Io-
Fabricius Ioh. Albertus	Baptista
Falconeti Camillus	( Cornelius
Fantoni Ioh. Baptista	( Carol. Fri-
Fauchard Petrus	Gladbachius ( dericus
Faudacq C. F.	( Joh. Adol-
Favelet Ioh. Franciscus	( phus
Faye	Gœlike Andreas Ottomanus
Febrius Ioh. Henricus	Gohlius Joh. Daniel
Felici Antonius	Goolden Samuel
Fenent	Gotter ( Iohannes
Ferren	( David
Fickius Ioh. Iacobus	Gottlieb Iohannes
Fischer Iohannes	Govey Aloysius Leger de
Fizes Antonius	Gouland
Foster VV.	Goutraigne Hugo
Fracassati	Grambs Joh. Iacobus
Fracassini Antonius	Graniti Nicolaus
Franckenav Geor. Francus	Grashuis Iohannes
de	Gratiani Iohannes
Freind Iohannes	Guifard Petrus
Friedius Ioh. Iacob.	Gulielmini Dominicus
Fringus P.	Guntz Justus Gottofridus
Fritschius Ioh. Christopho-	Gurischius Martinus
rus	Gurvaigne Ugo
Frobenius Sigism. Augustus	Haenelius Crist. Fridericus
Fromond Andreas	Haen Antonius von



Haguenot Henricus	Junckerus Johannes
Hahn Johann. Gottofridus.	Junius Hadrianus
Hales Stephanus	Jurinus Jacobus
Haller Albertus	Justieu
Halin Joh: Gottofridus	Kaltschmid Carolus Frideric.
Hamberger Georg. Ethard.	Keckius Egidius Craton
Hamel du	Keils Christ. Henricus
Hampe Joh. Henricus	Keil Iacobus
Hanke Dan. Abraham	Kennedy (Iohannes
Hancketvviz Ambrosius	( Petrus
Gottefridus	Kesslerus Carolus Gottlieb
Harris Gualterus	Kestner Christ. V Vilhemos
Hartle David	Klaungius Gottofridus
Hartranffus Joh. Valentinus	( Iacobus
Harfenhorl Joh. Georgius	Kleinius ( Ludov. Gotto-
Hebenstreitius Joh. Ernestus	( fridus
Hecquet Johann. Dom.	Knirs Lud. V Vilhelmus de
Heisterus Laurentius	Koch. Daniel
Helvetius Joh. Thomas	Konig Emanuel
Hermannus Paulus	Kramers Geor. Henricus
Herningerus Joh. Sigismund	Krauterman Valentinus
Hesseliu Johannes	Kruger ( Bertholdus
Heucherus Joh. Henricus	( Ioh. Gottlieb
Hilscherus Simon Paulus	Kuchlerus Ioh. Caspar
Hoffmannus ( Daniel	Kuhnus Ioh. Adam
( Frideric.	Kupferschmidt Iohannes
Homaerg	Lacerme Iacobus
Hoppius Flias	Laing David
Horn Joannes von	Lambrech Amos
Hovius Jacobus	Lamoriet
Houston Robertus	Lancisius Ioh. Maria
Hubner Joh. Christ.	Langhans Bernensir Daniel
Humelius Johannes	Langguth Georg. Augustus
Hunauld	Lanzani Nicolaus
Hackson Joseph	Lanzoni Ioseph
James	( Petrus Paulus
Hamjeson Johannes	Lapus ( Ioh. Hierony-
Hantkius Joh. Jacobus	( mus
Hambert	Lavagnoli Bartholomæus
Hannes Jodannes	Lazerm Jacobus
Hinterlenghi Flaminius	Leale Leal
Hunckens Joh. Helfritius	Leibnitzius Guliel. Gottofr.

Leinckerus Joh. Sigismundus

Lemeryus ( Nicolaus  
( & ejus fil-

Lentilius Rosinus

Lopold Emanuel

Leporinus Crift. Polycarpus

Levret

Leevis VV.

Lichtman Joh. Michael

Lindestolpe Johannes

Linnæus Carolus

Linsingh Petrus

Lister Martinus

Littre

Lizzari Antonius

Lobb Theophilus

Locherus Emanuel Christianus

Læfcherus Martin. Gottlieb

Lœvv Joh. Franciscus

Lomnius Jodocus

Lovver Richardus

Lovvis Robertus

Ludolfs Hieronymus

Ludovici Daniel

Lupius Jac. Antonius

Lystennius Gotlieb VVipert.

Macgill N.

Machin Johannes

Macopper Alexander Knips

Madden Thomas

Maffei Richard Middleton

Malœt

Mai

Maitlands

Maitre Joan. Antonius

Malmedic Joh. Baptista de

Malovin

Manetti Xaverius

Mangetti Joh. Jacobus

Manning Matthæus

Marcot

Marche Madame de la

Marchant

Marescotti Franciscus

Matini Hieronymus

Martinus ( Lucas  
( Georgius

Martyn Johannes

Maserius Theodorus

Maternus Georg. Christinus

Matthæus Georgius

Mauchart Joh. David

Maurer Johann. Georg

Mazini Joh. Baptista

Mazzuoli Franc. Maria

Mead Richardus

Melli Sebastianus

Mery Joannes

Mesnard Jacobus

Metrie

Meyer Hermann. Petrus

Meyfeldus Joh. Gottofrid

Michellottus Antonius

Michles

Midleton Johannes

Migliavacca Joseph

Milligen G.

Mittermayer Johannes

Moebius Joh. Fridericus

Molieres

Molinelli Petrus Paulus

Momber Antonius

Monro Alexander

Monticelli Joseph.

Morand

Morandi Morandus

Morasch Joh. Adam

Moreali Joh. Baptista

Margagnus Joh. Baptista

Mo

Corin	Paton Petrus
Mortimer Cromvvellus	Patrick Hurray
Morton Ricardus	Patuna Nicolaus
Motte Gulielm. Mauquest	Pauli Petrus
de la	Palissier Gulielmus
Movvat Iacobus	Pemberton Henricus
Mulichius Ioh. Fridericus	Petermannus Andreas
( Ioh. Mat-	Petit
( thæus	Petrioli Gajetanus
Mullerus ( Gotrofrid.	Pezoldus Caspar
( Gulielmus	Pisani Angelus
Municks Iohannes	Pisoni ( Homobonus
Muratori Ludovic. Anto-	( Carolus
nus	Pisteri Christ. Fridericus
Musitanns Carolus	Pitcarnius Archibaldus
Mustigerus Ioh. Caspar	Placentinus Jacobus
Muys VVverus Gulielmus	Platner Joh. Zaccharia
Manoni Angelus	Plummer Andreas
Mebelius Daniel	Pohlius Joh. Christianus
Menter Georg. Philippus	Porta Alundius Aloysius
Meruccijs Octavius	Porter Robertus
Nicolaus Franciscus	Portefield Gulielmus
Nicolai Henricus Albertus	Portius Lucas Antonius
Nidell Iacobus	Pott Joh. Henricus
Nievventit Bernhardus	Poupart
Nigrisolijs Franciscus Ma-	Pozzi Joseph
ria	Preusius Maximilianus
Nouguez Ioseph	Pringhe ( Johannes
Nolet Ioseph	( Franciscus
Norren Erh.	Proebisch
Neder Christianus	Pujati Joseph. Antonius
Nehme Ioh. Augustus	Pye Georgius
Norteschi Petrus	Quadrius Joseph Maria
Nacchioni Antonius	Quesnay Franciscus
Nafin Iohannes	Ramazzini Bernardinus
Naisley Iohannes	Ramby Joannes
Naitonus Ioh. Baptista	Rand Jacobus
Nalfin Iohannes	Redi Franciscus
Narrot VVolfang. Georgius	Reinell
Narson Iohannes	Reiffens Joh. Caspar
Nascoli Alexander	Richa Carolus
Nasta Andreas	Rideux Petrus



Riedlinus Vitus	Schuckmaun Joh. Henri-
Righellini Ianus	cus
Ridley Henricus	Schvenke
Robergius Laurentius	Schulzius Joh. Henricus
Robinson Nicolas	Scurigius Martinus
Roncali Franciscus	Scroeckius Lucas
Rocca Ioseph Maria	Senac
Roseen Nicolaus	Senes
Rost Ioh. Carolus	Sermes Johannes
Rothens Ioh. Philippus	Severinus Mar. Aurelius
Rotundis Petrus de	Sguarius Eusebius
Rossetti Blasius	Sharo Petrus
Rotarius Sebastianus	Short Thomas
Rouhault Petrus Simon	Sidobre Antonius
Ruyfchius Fridericus	Siegfried Bernhardus
Ruitty Iohannes	Sigismundus Johannes
Ruleau Iohannes	Signorotti Franciscus
Sancassani Dio. Andreas	Siguart Georgius Frideri-
Sanden Henricus von	cus
Santangeli Antonius Hia-	Silva Joh. Baptista
cynthus	Simson Thomas
Santorini Ioh. Dominicis	Sinclair Andreas
Sauvages Franciscus de	Sipton Johannes
Scardona Ioh. Franciscus	Sloane Hans ceu Johannes
Schaarschmidt Augustus	Solanus Franciscus
Schacherus Polyc. Gottlieb	Sprengellius Conradus
Schach Iohannes	Sproegelius Deterich
Schabinger David Christo-	Stahlius Georg. Ernestus
phorus	Stedman Johannes
Scheuchzerus Ioh. Iacobus	Stenzelius Christ. Gotte-
( Andreas	fridus
( Christo-	Stephens Mademoiselle
Schmidius ( phorus	Stoer Gerch.
( Henricus	Storchiu Johannes alia
( Victor	Pelagus
Schobingerus Joh. Caspar	Storck Antonius
Schomberg Rodulphus	Stochius Henric. Sigismun-
Schrarie Christophorus	dus
( Joh. Fride-	Stuart ( Petrus
( ricus	( Alexander
Schreiber ( Samuel	Svvieten Gerardus van
( Gottlieb	Sudenham Thomas
	Tabar-



Tabarranus Petrus	Vespa Iosep
Taboris Gerardus	Viardel Cosimus
Tavury	Vilars Elia-Col-de
Taylor Johannes	Vignon
Teichemeyerus Hetmans	Vincenti Dominicus
Fridericus	Voetius Ioh. Eusebius
Tollier le	Vogel Zaccharias
Thievillier Joh. Ludovicus	Voglius Ioh. Hyacinthus
Timme Johannes	Vulpini Ioh. Baptista
Tissot S. A. D.	Uxam
Thomson Al.	VVabst Christian. Xave-
Torti Franciscus	rius
Tortora Ludovicus	VVagnerus Georgius
Tournefort Joseph Pitton	VVagret
Tosi Simeon	VVahrendoffers Ioh. Petrus
Tralles Balthassar Ludovi-	VVadschmidt Ioh. Iacobus
cus	( Conrad.
Trevv Christ. Jacobus	( Ludovi-
Trillerius Daniel VVillel-	VValtherus ( cus
mus	( Henricus
Tronchinus	( Augustus
Turner Daniel	( Fridericus
Valcarengi Paulus	VVanugh Gilbertus
( Michael	VVehers Ioh. Iacobus
( Bernhard	( Georgius
Valentini ( Christopho-	( VVolfang.
( rus Ber.	VVede- ( Ioh. VVolfan-
( nardus	lius ( gus
Wallisnerius Antonius	( Ioh. Adolphus
Wandelli Dominicus	VVeisbachius
Watersus Adrianus	VVepserus Ioh. Iacobus
Weinhart Ferdinand. Caro-	VVerensfeldius Conradus
lus	VVerlhof Paulus Gottlieb
Worbrugs Johannes	VVesthoven Herm.
Werscellotus Jacobus	VVernerus Engelbertus de
Werdier	VVWhite
Werdries Joh. Melchior	VViddemania Barbara O-
Werduec Joh. Baptista	stetrix
Werheyenus Philippus	VVideman Franciscus
Werna Joh. Baptista	VVilison Andreas
Werney Ioseph Guicciardus	VVilan R.
du	VVillis Thomas

VVifeman Richardus  
 VVinslov Iacobus Benignus  
 VVitte Iacobus  
 VVoodvard Iohannes  
 VVolhaufe  
 VVoolhouse Thomas  
 VVolphangus Cristianus  
 Völpinus Ioseph

VVoycs Joh. Iacobus  
 VVreden ( Orto Iustin.  
 ( I. E.  
 Yres Carolus de Saint  
 Zanotti Iacobus Maria  
 Zendrini Bernardinus  
 Zuingerus Ioh. Rudolphus  
 Zulatti Angelus  
 Zvvingerus Theodorus

Post hanc recensitionem si ex librorum copia iudicandum esset, cum nulla fere Scientia tot Scriptores per omnia Secula Medicina retulerit, censere deberemus hanc Artem perfectionis culmen jam attigisse, ast peritiores merito arbitrantur ab infantia vix egressam esse, plurimaque ad ejus perfectionem, & ad omnem curarum securitatem desiderari. Etenim, quæ ab antiquis usque temporibus utilia magis ac tuta addita sunt, tanta quidem non videntur, ut ad prænotiones, prædictionesque dirigendas satisfaciunt, sed simul eadem neque tam exilia, aut inania nascimur, ut eorum, qui erroneam, futilemque Artem prædicant, possimus assentiri iudicio. Quamvis nonnulla per Scriptores occurrant, quæ magni habenda sunt, & Praxeos fundamenta reputari possunt; quod speciem exhibent eorum, quæ ad curationes sunt magis necessaria: reliqua tamen, quibus magna librorum moles exsurgit, nihil nisi inania verba, aut quæ semel iterum iterumque dicta, & ad ravim usque rescripta sunt, consarcinant, & rescribunt. Cui sane incommodo alterum magnitudinem, & copiam librorum augens accedit, quo sane præterita secula maxime gloriabantur, videlicet, perpetua commentariorum in Antiquos Scriptores, præsertim qui medicinæ Parentes reputantur, confectio, cujus utique eruditionis generis tanta est Librorum farrago, ut omnem propemodum fidem superet. Neque reticenda est immensa quasi librorum quantitas, quæ ab una in alteram linguam veluti a Græca in Arabam, & Latinam, vel ab Araba, & Syriaca in Latinam, a Latina in Anglicam, Gallicam, Germanicam, & Italicam atque vicissim ex una in alteram conversione successive producta fuit. Quæ cura ita sint, expulsis commentariis,

& ver-

& versionibus desideramus, ut Arte Critica, quemadmodum in cæteras disciplinas; ita in Medicinam, tandem inuenta Scriptores a vitiosis repetitionibus, a plagiiis, a falsis observationibus, a futilibus Theoriis, a temerariis hypothesibus, a paralogysmis, ab erroribus, omnibusque aliis irritis, gloriosis, vanis, ampulosisque descriptionibus expurgantur, & emendentur. Quo criterio non tantum Scriptorum peritiam, vel fortunam in Praxi, ut dudum feliciter D. Bodley Anglus perfecit, sed eorum Scripta, & Opera a capite ad calcem successive, per omnes sententias, indeque deducta corollaria, in quibus præsertim medicinæ labes sita est, expendere juvabit. Nam quamvis morborum casus exarentur, observationesque instituantur; dicaturque quid in ægris repertum, quidque notatu dignum offensum est, quia ex falsis præconceptis opinionibus pleraque interpretantur, descriptiones veritati minime consentiunt, & corollaria inde deducta, utpote præconceptarum opinionum infirmitate notata, fallacia sunt, & in errorem inducunt.

Quantum ad Theoricam: hoc quidem certum est, Praxim ejus subsidio nunquam defuisse, & antiquissimos usque Scriptores aliquam admisisse, quæ ad ægrorum lectulos specie quadam rationabilitatis, quasi prælucente face, manuduceret. Principio nisi in quibusdam veluti prudentia regulis consistebat, inde quædam ornamenta suscipiens admodum angustis limitibus contrahatur, quos ubi prætergressa est, tam late se se explicavit, ut majorem partem occupaverit Librorum, quos Medici a Galeno ad nostra usque tempora confectere; siquidem per observationes, & experimenta in curandis morbis capta, Theoretica quædam naturali rationis lumine primo commenta sunt, unde generale illud fundamentum statutum est, cujus in libro de flatibus meminit Hippocrates, & quo Medicinam definivit, quod sit ablatio eorum, quæ excedunt, & appositio eorum, quæ deficiunt, addendo: quid autem istud optime facere potest, illum optimum Medicum censendum, quantumque quis ab hoc præstando deficit, tantum deficere quoque ab ipsa Arte. En quam facilis hujusmodi Theoria, simulque quam utilis, & vera! Subsequenti vero ætate valetudinis phænomenis di-



ligentius perpenſis viſum fuit, æque generale principium aliud Theoreticum poſſe admitti ex ſtriſto, & laxo deſumptum, maxime quod ex corporibus, quæ pharmacorum titulo uſurpari poterant, perſpiciebatur eadem vivi animalis partibus applicata: modo corroborare, & contrahere; modo contra laceſcere, & infirmare. Atque hinc ortam intelligimus Methodicorum Sectam. quorum potiora doctrinæ capita funditus a Cœlio Aureliano, & bona parte quadam a Celſo referuntur. Sed cum ſubſidia hæc nimis arta ratiocinio viſa ſint Galeno, totis ingenii nervis annixus eſt, ut latiora ab Ariſtotelis Philoſophia depromeret, atque adeo quatuor elementorum qualitates, ſimiliaque temperamenta primus in Medicæ Theoriæ fundamentum accerſivit, quæ deinde ab Aetio, Oribasio, Paulo, & a præcipuis Italiæ Medicis inter Antiquiores recepta, uſque ad Paracelli, & Helmontii ætatem preſſo pede, & uno ore ab omnibus amplexa ſunt, atque etiam diutius eadem intacta. viguiſſent, ni Paraceliſtæ, & Helmontiani, tum quoque Tachenius, Sylvius de la Bois, & Cartefiani aliis principiis a Chymia deſumptis, aut commentitio jure ſuppoſitis antiquam Theoriæ formam in novam mutaſſent. Nova autem methodus plerique magis aridebat, tum quod præter Ariſtotelica principia, neſcio quas vires occultas, quoſque univerſales, & aereos ſpiritus peculiaribus nominibus inſignitos admittebat, quod grande ſonantium verborum coalitu indoctis ſuſpicionem incutiebat, ſub reboante quodam vocabulo arcani aliquid, & myſterioſi latitare. Nec quidem peritiores eam indigabantur, quibus perſuaſum erat, illo peregrinarii vocum conflictu abdita naturæ, & rerum diſſicillimarum cauſas ſatis revelari. Turpi vero profundiffimoque hujusmodi inſomnia, ſub quo hominum ingenia torpebant a Mathematices, Mechanices, Phyſicæ experimentalis, & Anatomes ſtudio, circa finem ſeculi XVII. & initium hujus feliciter ejeſto, Theoria Medica ex Anatome, & Mechanica ſolidorum ſibi vindicare cœpit formam & Naturæ potius leges, cauſarumque utut latentium phænomena, potius quam diſſiculter admodum, aut vix unquam detegendas ipſas cauſas inquirere.

Si nuperis annis feliciffimos progreſſus, admirandaque incrementa Theoria accepit, agnoſcendum tamen eſt,  
& ve-



& vehementer dolendum Praxim, quæ pars est Medicinæ longe utilissima, haud pari passu processam esse. Nam quamvis singulorum morborum historia, cum diagnosi causarum. Theorica explicatione effectuum, prognosi, & Therapeia, vel Chirurgica curatione habeatur, quod ad innumeris Scriptoribus factum est, adhuc tamen remanet interior eorum notitia cum differentiis, quas cum in diagnosi, & prognosi, tum in curatione, & remediorum delectu inferunt temperamenta ægrotantium, sexus, ætas, anni tempestas, cœli regio, solum, aeris conditio, aquæ, alimenta, mores, similiaque communium, vel peculiarium causarum virtutem habentia, quibus singulis, & universis satisfieri posse nonnulli arbitrantur per casus medicos a Scriptoribus fide dignissimis relatos: quemadmodum inter antiquissimos apud Hippocratem, Aretæum, Trallianum, Cœlium Aurelianum, Celsum &c. & inter recentiores apud Martianum Hollerium, Duretum, Ballonium, Jacotium, Montanum, Tulpium, Cratonem, Carolum Pisonem, Alpinum, Hidanum, Forestum, Sennerum, Riverium, Bonetum, Ramazzinum, Malplghium, Baglivum. VVepferum, Sydenhamum, Van Svvietentium, Haenium, Morgagnum &c. videre est, qui cæteris palmam præripiunt, quibus adde Medicos, qui peculiare ægrorum historias Academiis per Europam institutis misere, quæq. videri possunt in Miscellaneis Naturæ Curiosorum, sive Academiæ Leopoldinæ, & in Actis Uratislaviensibus, Berolinensibus, Helveticis, Hassnicis, Edimburg. &c. Sed falsa conjectura decipimur, & multitudo casuum parum, vel nihil huic scopo inservit; quousque indigesta, ut nunc videtur, remanet; & nisi prodeat, qui ex eorum collatione, & opportuna distributione utilitatem eruere noscat, nam confusionem paris, & tanquam iners supellex habenda. Quod si etiam in ordinem reddi contingat, nondum certum est, Praxeos necessitatibus omnibus hinc fieri satis. Alia via igitur adeundum, ut ad idem incrementum, quo Theorica gaudent, etiam Practica perducantur, qua nulla tutior planiorque sanè videtur, quam quæ illustris Boerhaavius felici ausu suscepit. Hujus enim methodum in eo maxime positam percipio, ut ex morborum, & remediorum phænomenis experientia, & observatione com-

pertis Theorica, & ab his regressu facto; quid inde experiundum in Praxi, & in ipsis morbis quid futurum deducat. Ne autem Theoretica aliqua parte nutent, & in hypothesen, in quas prona est, relabatur, proponit semper ut Phænomenorum causæ per mechanicæ leges, & per vitæ principium ex solidis, per physicam experimentalem, per chymicam, & per microscopica documenta ex fluidis eruantur. Sed susceptum ab eo opus, & multo etiam provectum quisnam erit, qui perficiet, & Medicinæ Praxim ad complementum, & perfectionem evehat? Interea quousque tam felix tempus adven- ter, nobis plurimis Operibus clarissimorum Virorum frui licet, quæ desideratæ perfectionis defectum quoquo modo compensant, & ingeniosioribus aditum expediunt, ut omne, quod arte possibile, & humanæ solertiæ ac prævisioni concessum est, inter curandas ægritudines præstare possint. Quæ in suo genere hucusque melio- ra, & præstantiora sunt pro Anatomia: VVinslovii discursus Anotomici, & Heisteri compendium; sed quia necessariæ figuræ in his desiderantur, adire juvabit eas Bartholini, vel VVerheyeni, vel Kulmi, vel Eusta- chii, vel Couperi, vel Albini; pro Medica Theoria præstant eximii Boerhaave institutiones ex se, vel cum doctiss. Alberti Haller commentariis, tum ejus nomi- ne prælectiones ab eodem editæ, & notis illustratæ, vel ejusdem Haller opusculum prima linea Physiologiæ inscriptum; pro Botanica Raii methodus plantarum, Tournefortii institutiones rei Herbariæ, maxime vero, quæ dudum celeberrimus Carolus Linnæus evulgavit, pro Chimica Rothii chemia germanice scripta, vel ea VVedelii, aut Teichmeyeri; sed maxime Boerhaavii, aut Stahlî, & Friderici Hoffmanni latine editæ, qui vero gallicam callent linguam, uti possunt chemia le Febure, Lemery, Senaci, Melovini, sed præsertim Macqueri. Hisce duabus conjunctis facultatibus, ut ve- getabilium animalium, & fossilium vires medicæ rite assequantur, adeunda sunt: Macassii promptuarium Ma- teriæ Medicæ, Grube de medicamentis simplicibus co- gnoscendis, aut Schræderi Pharmacopeia, vel Valen- tini Museum, vel melius omnium Geoffroy materia me- dica, tum Emanuelis Konig Lexicon, Franci Flora. Hermanni materia medica, Dale Pharmacologia, Le- metii

merii Lexicon simplicium, & VVedelli opus de Medicamentorum facultatibus. Simplicium vero facultatibus medicis, & physicis experimentis, chimicaque analysi perlustratis ad composita dignoscenda egregie faciunt: Pharmcopeia Augustana, Viennensis, Borussica, Londinensis, & Parisiensis tum ea Lemery, & Lexicon Pharmaceutium Jungkeri, atque nostras illud Jo. Baptistæ Capello. Quantum ad doses omnium simplicium, & compositorum unus satis est Paulus Andreas Parentus: & pro formulis conscribendis ad Thyronum usum potissimum commendari merentur, quæ in hunc finem scripsere Morellus, VVedelius, Ettmullerus, Eyselius, Fickius, & Junkerus; pro Pathologia, sive morborum motitia secundum mechanica principia ediscenda excellunt: Fridericus Hoffmannus in medicina rationali ex fundamento sensibilitatis partium, Herneſtus Stahlus secundum principium a se admissum, quod anima vivificans corpus animale informet, idemque conservet, & a morbis ac a nece tueatur; atque Hermannus Boerhaave in Aphorismi de cognosc. & curand. morbis juxta simplicius fundamentum chimico mechanicum, quod vita, & sanitas a physicis mechanicisque Naturæ legibus, omni quacunque hypothesi exulata tantum dependeat, qui aphorismi, ex se omnino aurei sunt; sed nitorem splendoremque adepti sunt mirifice a doctissimis Sereniss. Austriacæ Domus Archiatri, & Consiliariis D. Vansvieten commentariis; pro Semiologia, quam plerique cum Pathologia conjungere, seorsim tradita, eminent: VVedelius, Lommius, & Vaterus, pro Therapia, & morborum curatione per pharmaca, præter Hoffmannum, & Boerhaavium faciunt etiam Hippocratis, Sydenhamii, Baglivi, Lancisii, Torti, VVerloſii, & Scardonæ scripta practica, & secundum Stahlii sistema, vel ejus Opera, vel ea quæ Nenterus, Junkerus, & Storchiſius latine, postremo vero VVeisbachius, & Gohlius Germanice edidere, præ ceteris tandem apprime inserviunt tum nuper evulgati a celeberrimo Gaen libri practici tum hæcce Jo. Allen Synopsiſ; pro Chirurgia demum, & morborum curatione manuali operatione instituenda excellunt ex Neotericis: Garengéoti operationes Chirurgicæ, Chaberti & Drani observationes, tum Heisterus, la Fayus, sed maxime



Platnerus, novissime vero Angelus Nannonus, qui inter Italos nuper eximias chirurgicas operationes, cum casibus oppido rarissimis evulgavit. Ab omnibus hisce Medicinæ partibus ac facultatibus, quæ ad eam spectant, utilioribus ad Praxin notionibus haustis, jam artis peritiæ comparatum est ad morbos feliciter secundum rationem tractandos, & quoscumque eorum bonos, vel malos exitus prænoscentes; sed adhuc magis in Artis usu confirmabitur Medicus; si præter hæc sollicitus erit de iis, quæ raro contingunt, quæque videntur in Observationum Medicarum collectaneis Tulpis, Caroli Pisoni, Timæia Guldenkee, Foresti, & Schenchii, tum in Actis Academiæ Curiosorum, Anglicanæ, Gallicanæ, Petropolitane, Bononiensis, præsertim in Commercio Litterario universali Norimbergico, & morborum origines ex sectione cadaverum in Sepulchreto Anatomico Boneti, & in Observationibus Medicis celeberrimi Morgagni nuper evulgatis, nec minus diligenter peculiare inquirat Tractatus ad praxin in primis spectantes veluti: is de re cibaria Bruyerini, de studio sanitate curanda Gregorii Horstii, VVedelii, & Pujati; de Artificum, & Monialium, Principumque valetudine tuenda Ramazzini; de Peste, plerumq. Opera; de morbis militum in castris Lucæ Antonii Portii, de Atrophia; & Hæctica Christophori Bennet, de Pthysiologia Mortoni, de Arthritidum speciebus Musggravii &c. neque prætereant Scriptore de Thermis, & Aquis salubribus balneo. & potu usurpandis, inter quos excellunt: pro fontibus Medicatis Germaniæ Frid. Hoffmannus, pro Thermis Carolinus Bergerus, pro Typlicensibus Castius, pro Embsensibus VVolfartus, pro Ægranis Langius, pro Schvvalbacensibus Hensingius, pro Pfrmontanis Slarius, & Heisterius, pro Italicis, simulque omnium regionum Andreas Baccius, qui unus pro omnibus valet, quamvis postea docte egerit de fontibus Mutinensibus Ramazzinus, de Apennensibus Gratianus & Vandelli, & de Pisanis Cocchius, de Selteranis D. Venel, &c.

Hisce omnibus facultatibus præstantiorum Scriptorum ope lustratis, melioribusque inde haustis documentis in memoriæ cancellis alte impressis jam Medicus parum distat a summa in Arte perfectione, & ægrorum lectu-



ris par est utiliora adjumenta præstandi, & famæ suæ valetudinique bono consulendi. Quia ejus officium hic totum non definit, sed non raro accidit, ut scripto interrogationibus de judicandis, & curandis morbis respondere debeat, aut sententiam dicere coram magistratibus: de occisus. de vulneribus, de veneno, de potentia, & impotentia utriusque sexus, de infanticidio, virginitate, legitimo partus tempore, morbis simulatis, & dissimulatis, aliisque similibus, ideo in utraque parte Auctores compertos habeat oportet, qui de meliori consultationum forma, & de Forensi Medicina placita tradunt. In priori classe sunt præsertim Raymundi Joh. Fortis, Pompeii Sacci, & Friderici Hoffmanni consultationes, sed Italico Idiomate elegantissime scriptæ: eæ Joseph del Papa, Francisci Redi; Antonii Vallisnieri, Joh. Mariæ Lancisii, Marcelli Malpighii, aliorumque quorum consilia una cum iis duorum postremo loco memoratorum in duos Tomos collegit Cajetanus Armilleus, & Venetiis 1743. edidit Ioseph. Corona. In Medicina demum forensi præstant Teichmejerus, Bohnius, Zittmannus, Valentini scripta forensia, sed præ omnibus Pauli Zacchiæ quæstiones Medico Legales, Joh. Ernesti Hebenstreis Anthrophologia Forensis, & Michaelis Bernardi Valentini Corpus Iuris Medico Legale. Num hisce temporibus tunc memorati Scriptores Thyroni Medico congruant, nullus dubito; num vero omnes necessarii sint, plane non affirmo; cum tamdiu ii primas obtinere possint, donec, meliora edituri prodeant. Disciplinis enim acquirendis præstantia magis, quam copia librorum inservit. Sicut stomachus abundantia ciborum gravatur, & valetudo detrimentum capit; euchymi contra, & pauci adjumento sunt; ita plus unus ex optimis, quam plurimi libri ediscendis Artibus faciunt, qui veluti mentis pabulum intellectum rerum ordine informando, & varietate instituendo, pauci & selectiores Disciplinas, multiplices & varii eruditionem adjuvant; immodicus vero eorum usus ut ordini, & perspicuitati officit, ita memoriam tantum, non autem igerium exercet.

## S Y L L A B U S

Auctorum quorum sententiæ in hoc Opere recensentur.

<i>Ægineta</i>	<i>Gandolphus</i>	<i>Placentinus</i>
<i>Anelius</i>	<i>Glissonius</i>	<i>Platnerus</i>
<i>Arbuthnotus</i>	<i>Gorter</i>	<i>Pujati</i>
<i>Aræteus</i>	<i>Hamilton</i>	<i>Purcellus</i>
<i>Aurelianus</i>	<i>Harris</i>	<i>Purmannus</i>
<i>Baglivus</i>	<i>Harvæus</i>	<i>Riverius</i>
<i>Ballonius</i>	<i>Hecquetus</i>	<i>Ruyschius</i>
<i>Barbette</i>	<i>Heister</i>	<i>Sampsonius</i>
<i>Barbeyracus</i>	<i>Helvetius</i>	<i>Scardona</i>
<i>Bellini</i>	<i>Helvigius</i>	<i>Sckenckius</i>
<i>Bellostus</i>	<i>Hildanus</i>	<i>Schmitzius</i>
<i>Blegneus</i>	<i>Hippocrates</i>	<i>Schomberg</i>
<i>Boerhaavius</i>	<i>Hoffmannus</i>	<i>Schvvietten</i>
<i>Bonetus</i>	<i>Hollerius</i>	<i>Semertus</i>
<i>Calmetteus</i>	<i>Junstonus</i>	<i>Septalius</i>
<i>Cardanus</i>	<i>Juckerus</i>	<i>Sponius</i>
<i>Cathervoodi.</i>	<i>Kinps-Macoppe</i>	<i>Stepheus</i>
<i>Celsus</i>	<i>Lancisius</i>	<i>Storchias</i>
<i>Charletonus</i>	<i>Langius</i>	<i>Sydenhamus</i>
<i>Chesneavius</i>	<i>Listerus</i>	<i>Sylvius</i>
<i>Chayneus</i>	<i>Littrius</i>	<i>Tovvnetus</i>
<i>Chiratus</i>	<i>Lomnius</i>	<i>Tozzi</i>
<i>Cole</i>	<i>Lovverus</i>	<i>Trallianus</i>
<i>Covvandus</i>	<i>Malpighius</i>	<i>Trillerus</i>
<i>Deckersius</i>	<i>Mauriceau</i>	<i>Turnerus</i>
<i>Deodatus</i>	<i>Mayerne</i>	<i>Velschius</i>
<i>Diemerbroeckius</i>	<i>Mayovvius</i>	<i>Verduc</i>
<i>Donckersius</i>	<i>Meadius</i>	<i>Verna</i>
<i>Ettmullerus</i>	<i>Mercatus</i>	<i>Verzascha</i>
<i>Fizes.</i>	<i>Mercurialis</i>	<i>Waldschmidt</i>
<i>Floyerus</i>	<i>Morgagnus</i>	<i>Wsinhart</i>
<i>Foresti</i>	<i>Mortonus</i>	<i>Werlhof</i>
<i>Freindius</i>	<i>Musggravius</i>	<i>Willisius</i>
<i>Fromannus</i>	<i>Petitus</i>	<i>Wisemannus</i>
<i>Fullerus</i>	<i>Pitcarnius</i>	<i>Yves</i>



# SYNOPSIS

UNIVERSÆ

MEDICINÆ PRACTICÆ, &c.



## CAPUT PRIMUM

*Sive Fasciculus Morborum primus.*

### FEBRES IN GENERE

*Ex observatione & inter legendum.*

Art. 1. **F**EBRES ( ut rectæ annotavit Proœ-  
clarissimus Sydenhamus ) cum mium.  
Appendicibus suis duas fere  
tertias partes omnium, quæ sunt  
morborum, complent; ideoque  
his exponendis, utpote quæ  
etiam totis corporibus inhærescunt, merito exordiri  
statuimus.

Art. 2. Febris autem ( inquit idem ) nihil aliud est, Febris  
*Allen Pars I.* quid.  
A quam



quam naturæ conamen materię morbiſicę, corpori valde inimicę, exterminationem in ægri ſalutem omni ope molientis.

**Februm diviſio.** *Art. 3.* Februm diviſio maxime generalis & genuina eſt in *Effentialem & Symptomaticam*.

**Effentialis.** *Art. 4.* Febris effentialis eſt cujus cauſa primaria in ipſo ſanguine deliteſcit, a nullo alio morbo ſolidarum partium originem ducens, aut quocumque modo pendens, atque hæc eſt *Febris abſoluta & proprie dicta*.

**Symptomatica.** *Art. 5.* Febris ſymptomatica eſt febris ſecundaria, quę non propriam ſubſiſtentiam habet, ſed a graviore alicujus partis affectu originem trahit, & frequentiffime ab inſigni aliqua inflammatione pendet, unde *Febres varie inflammatorię dictę*.

**Effentialis diviſio.** *Art. 6.* Febris effentialis dividitur in *Ephemeram, Intermittentem, Continentem & Continuam*.

**Ephemera.** *Art. 7.* Febris omnium mitiffima eſt Febris ephemera, ſive diaria, i. e. Febris unius diei; quę ab inſolatu, exercitio nimio, vel aliquo alio accidente externo oritur, & ſpatio 24. horar. ultro terminari ſolet. Sola quiete, & in lecto decubitu curatur.

**Intermittent.** *Art. 8.* Huic proximę ſunt Febres intermittentes, ſcilicet, quotidianę, tertianę, quartanę ſimplices, tertianę, quartanę duplices &c. Hę more Febris diarię ſpatio 24. horarum plus minus pro iſthac vice finiuntur: verum pro peculiari illarum genio, ſingulis, vel alternis diebus, vel quarto quoque die, recrudescere ſolent.

**Continens.** *Art. 9.* His congener eſt Febris *ταλχις*, ſeu continens, quę quidem eſt Febris continua, ſed non uno tenore pergens; ad plures dies ſine, *ταλχις* protenditur, habet tamen ſua *remiſſionis & exacerbationis* tempora, ſtatis, vel incertis periodis ſe invicem excipientia; *intermiſſionem* verò nullam habet.

**Continua.** *Art. 10.* Februm gradus proximus & ultimus eſt *ταλχις*, ſive Febris continua proprie dicta, quę ab initio ad finem ubique eſt æquabilis, *ſine ſymptomatum exacerbatione & remiſſione periodica*: hujus generis ſunt Febres malignę, Febres peſtilentiales, ipſa peſtis, &c.



## Sydenhami sententia.

*Art. 11.* Ille dubio tramite errat, atque incerto ducitur filo, qui in Febrium curatione non continenter ob oculos habet *anni constitutionem*, quatenus huic aut alteri morbo epidemice producendo favet, cæterisque morbis omnibus una concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis: hæc autem variæ constitutiones aut habitudines ab occulta & inexplicabili quadam aeris alteratione pendent, quæ proprias ac sibi peculiares Febres producunt, quæ *stationariæ* nobis audiunt.

Ratio habenda est anni constitutionis.

*Art. 12.* In novis Febribus cunctandum est paulisper, & ad magna remedia non nisi pede tardo procedendum, interim morbi genium ac morem diligenter pensitando indicationes præsertim a *ledentibus* & *juvantibus* sumendæ sunt; neque pudet fateri me non semel in curandis Febribus; ubi nondum constaret, quid mihi agendum esset, nihil prorsus agendo & mihi & ægro consuluisse optime; dum enim morbo invigilarem, quo eum opportunius confodere valeam, Febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum semetipsum redegit, ut jam mihi innotesceret, quibus armis esset debellanda. Non enim levis est consolatio viro probo in rebus dubiis, facileque errori obnoxio se saltem inculpatum tueri, si se minus utilem præbere nequeat.

Et in novæ febribus ingressu paulisper cunctandum est.

*Art. 13.* Calidum solum non est Febris causa, (inquit Hippocrates de vet. medic.) sed ea est calidum & amarum simul, calidum & acidum, calidum & salsum, aliaque innumera. Ex frequenti etiam observatione compertum est Febrem in corporibus sanis evenire posse, in quibus nullus apparatus morbificus, vel quoad plethoram, vel cacochymiam, &c. occasionem subministraret; nihilominus hujusmodi homines præcedente insigni aliqua aeris, victus, &c. rerum non naturalium. mutatione, Febre corripuntur, propterea quod eorum sanguis novum statum & conditionem adipisci gestit, qualem ejusmodi aer aut victus postulaverit.

Febris causa.

Evenire potest in corporibus sanis.

*Art. 14.* Indicatio generalis curatione Febrium

Indicatio generalis est,

est, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito congruentem contineatur, ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat, unde periculosa symptomata, nec illinc nimium torpeat, ne naturæ conamen frustretur; atque hinc exurgit norma sanguinem mittendi plus minus, vel prorsus omittendi.

Vomi.  
torium, *Art. 15.* Si adsit vomendi proclivitas, vomitorium propinare necessum esse omnino videtur; alias etenim accidere solet diarrhœa in Fabris progressu, ægro interdum admodum periculosa. In initio Febris emeticum propinari debet, sed, si omissum fuerit, quovis morbi tempore adhiberi potest, modo vires ægri ferre valeant; post hoc autem paregoricum hora somni propinandum est; diebus insequentibus, si repetitio venæsectionis minus indicetur, & non aderit diarrhœa, enemata alternis diebus in usum venire possunt, usque ad decimum vel duodecimum diem, quo tempore negotio ad secretionem vergente medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo, ad concoctionem accelerandam. Si fermentatio recte progrediatur, nullis omnino remediis opus est; despumatio etenim est opus naturæ.

Cathar-  
thicum  
exhiben-  
dum sub  
finem. *Art. 16.* Usitato circa diem decimumquintum, si adsit in urina laudabilis separatio, & symptomatum remissio, catharticum adhiberi debet, ne sedimentum a fermentatione hic illic depositum in sanguinem remigrans recidivam conciliet, quandoque tamen ad diem decimum septimum differendum est.

Cathar-  
sis post  
V. S. *Art. 17.* Pro comperto affirmo, nihil ita certo, atque ita potenter ægrum refrigerare, atque catharsim post venæsectionem celebratam: testatur enim experientia catharsin post venæsectionem quibuslibet aliis remediis felicius certiusque Febrem perdomare, tum quatenus intestinis illuviem dimovet, tum quatenus anodyno viam sternit. (Schedul. Monit.)

*Art. 18.* Ad genuinam sanguinis depurationem duplex *plex secretio* requiritur; una per *fæces* fit, altera per *flores*, hæc sensim & paulo pleniori *diæta*, potius quam sudore manifesto ut plurimum peragitur; separatione hac per flores jam facta minus periculosa est diarrhœa.



## Boerhaavii sententia.

Art. 19. Febris est frequentissimus morbus, *inflammationi* individuus comes, qui ingenti symptomatum numero plerumque stipatur. Febris quid?

Art. 20. In omni Febre, à causis internis orta, horripilatio; pulsus velox; & calor; vario tempore, & vario gradu; adsunt; hæc autem ubi velociter decurrunt, Febris acuta; ubi tarde; lenta audit. Febris fere semper cum sensu frigoris incipit; & progrediente morbo maxime a velocitate pulsus primario cognoscitur; adeoque velocior cordis contractio cum aucta resistentia ad capillaria Febris omnis acutæ ideam absolvit, quæ à causis infinitis produci potest. Sanitas ægroti videtur esse *cynosura* primaria; in quam natura in Febribus collimat; frequenter vero Febris in mortem desinit; quandoque in alium transit morbum. Symptomata quæ in omni febre adsunt.

Art. 21. Curatio Februm generalis summatim comprehenditur, vitæ ejusque viribus consulendo; in acre irritans corrigendo & deturbando; lentorem dissolvendo; expellendoque; & symptomata mitigando. Si in Febre exorbitare naturâ deprehendatur, moderamen sit abstinentia; victu tenui; potu aquæ; venæsectione; Clysmate refrigerante; &c. si segnior appareat; excitabitur ope cardiacorum; aromaticorum; volatilium, &c. Sublata Febris causa symptomata reliqua cessabunt, quatenus ab ea primario pendent; adeoque; si ferri queunt sine vitæ periculo, singularem curationem vix requirunt; nec temere turbari debent: Si vero intempestiva & nimis sæva fuerint; singula sunt lenienda suis remediis propriis; habita semper ratione causæ & status morbi ipsius. Curatio generalis.

## Ettmulleri sententia:

Art. 22. Febris est motus nature, seu quædam luxta, quæ spirituum plus minus alteratorum ope id, quod est hostile œconomix animali, eliminare satagit. Quid vult natura per febrem.

Art. 23. Quo magis acuta est Febris, eo tenuior convenit diæta licet ægri ad plures dies jejuni jaceant, petinde erit, nec unquam vidi febricitantem fa- De diæta.

ne pereuntem, sed potius, si quid iugeritur, Febris exasperatur, &c. nam in alimentis appetitus præscribit rationem, *quantum & quale, & tempus.*

Vomito-  
ria &  
sudori-  
fera.

*Art. 24.* Vomitoria in Febribus fere omnibus in principio sunt proficua. Sudoriferorum usum insa natura nobis monstrat, signis coctionis apparentibus sunt optima; & etiam in toto morbi decursu sunt utilia; immo horum usu promiscuo Febres non raro curantur. Spiritus salis armoniaci, vel sal volatile ejusdem, est febrifugum universale, & usu repetito raro fallax. Saccharata quæcunque in Febribus insigniter nocent. *Hippocrates* in omni Febre vinum porrigit. Semper observavi quandiu urinæ sunt crudæ, tamdiu res ægri in statu existere ambiguo; quando vero adsunt signa coctionis fausta possumus ominari: opus hoc coctionis est solius naturæ. Inter signa lethalia nullum est certius, quam frequens manuum ad nares admotio sine ulla materiæ effluxione.

### Bagliivi sententia.

Naturæ  
ductus  
sequen-  
di sunt.

*Art. 25.* In morbis acutis, atque inflammatoriis paucis opus est remediis, satis enim fuerit vias observare diligenter, quæ natura exitum tentat, curamque eo perducere, naturæ obsecundando, alioquin egrotus pessum dabitur.

Inanes  
specula-  
tiones  
nihil fa-  
ciendæ.

*Art. 26.* In Febribus universalibus, id est, quæ ipso de sanguine suscitantur, non admodum laborandum est circa partem affectam, ut inde curativæ deducantur indicationes; Februm siquidem primordia, partesque affectæ in iisdem, nos plerumque latent, & si unquam paterent, oportet *indicationem dirigere ad constitutionem massæ sanguineæ febricitantis*, potius quam ad sophisticam speculationem causarum proximarum, aut quæ in Febribus primoprimæ sunt, quæ nostræ aciei minime subjiuntur.

Tria  
væce-  
ra pro  
urandis  
febri-  
bus.

*Art. 27.* Ideo si primæ viæ sint obductæ, eæque egerendæ atque expurgandæ fuerint, danda opera, ut Februm fomes tollatur; Si vero sanguis febricitans sit exaltatus, & vehemens, ejus reprimendus est impetitus; si nimis crassis humoribus irretitus, atque coagulatus, exaltetur, ac dissolvatur. In hisce enim tri-  
*bus*



*bus præceptis* omnium prope illarum Febrium cura versatur, quæ ortum non ducunt ab organi læsione, verum ab humorum congerie, aut in ipso sanguine, aut in primis viis. Et cum ad crisin natura vergat, aut eas jam exiverit, tum a remediorum copia tanquam a peste cavendum.

*Art. 28.* Ex odore, quem ægri spirant, soleo sæpe, utrum morbus facilis vel difficilis, brevis vel diuturnus, vel alterius generi futurus sit, judicare. In ægris qui morituri sunt, nonnullis ante mortem diebus solet, dum pulsum tangimus, ab eorum exhalare corpore fœdus quidam ac veluti *cadavericus odor*, qualem spirant in templis cadavera, ut sæpe observavi, & velim, ut serio animadvertant medici *Animadv. in pract. nov.*

Ordo  
cadave-  
rosus  
mortis  
præsa-  
gium.

### *Friderici Hoffmanni sententia.*

*Art. 29.* Licet autem febris humano generi tam infestus, & pernicialis sit morbus, hanc tamen peculiarem obtinet facultatem, ut motu intestino & progressivo, quo absolvitur, acutiori causam suam destruat, ac se ipsum sanare possit, immo aliis, & gravibus, & longis morbis superveniens eosdem vincat, atque expugnet. Ipse *Hippocrates* & *Celsus* febrem habuerunt medicinam, & morborum præsidium, quo magni etiam morbi curantur; paralyse, epilepsy, convulsivi motus, affectus spasmodici, sic dicti: hypochondriaci; quin consilium duxerunt; suppressa citius febre, novam accendere. Et testantur etiam observationes, quod valetudinarii post febrem: longam sanitatem fuerint adepti, quin quod temperamentum, & mores fuerint immutati, qua de re latius videri potest dissertatio nostra *de febrium salubritate*.

Febris  
sæpe  
saluta-  
ris,

*Art. 30.* Afferro formalem febris rationem, sive, ut ita loquar, fundamentalem causam consistere in *forma* spasmodica universi generis nervosi & fibrosi affectione, quæ maxime ex spinali medulla procedit, & successive ab exterioribus ad interiores partes vergit. Docui id ipsum pluribus & momentosis rationibus in dissertatione *de vera motuum febrilium indole ac sede*. Idem vero etiam luculenter arguunt omnia, quæ

in febre præsto sunt pathemata, atque phænomena dolor scilicet dorsi, præsertim circa lumbos, horror, rigor, frigus, præsertim extremorum; tremor, unguium livor, vasorum in manibus & pedibus detumescentia, curis contracta & arida, oscitatio, pandiculatio, pallidus: & lividus faciei color, tremens & palpitans cordis motus, præcordiorum anxietas, spiratio ægra, inquietudo, corporis jactatio, sensus ebullientis circa præcordia sanguinis, pulsus contractu, parvus ac debilis, nausea & inclinatio ad vomitum, alvi & perspirationis suppressio cum urina tenui & aquosa.

*Art. 31.* Hinc prona jam fuit consequentia, quod *Causæ* omnia quæ totum nervosarum & vasculosarum par-  
*materia.* tium systema ad spasmos irritare & sollicitare pos-  
*les va.* sunt, ad ingenerandam febrem sint aptissima. Horum  
*riæ.* classem ducunt vehementes animi commotiones, terror in primis, & ira; materia venenata & subtilis caustica, vel intus genita vel per contagium suscepta, intercepta perspiratio: sudores critici cohibiti, exanthemata retropulsa, materia purulenta ulcerosa; passim in partibus adhærescens; alimenta nimis acria, corruptæ & biliosæ primis in viis hærentes cruditates; nimix vigilix, dolor vehemens ac nervosarum partium tensio in inflammationibus; tumoribus, & abscessibus, læsiones nervosarum partium ab acuto instrumento, ab acri & corrosivo pharmaco, balnea frigida & vicissim nimis calida, aut adstringentia. Sed pro differente harum causarum indole, & vario quo nervosum genus infestant modo, differunt etiam prognatæ inde febres; ut nonnullæ sint benigniores, aliæ intermittentes, aliæ continuæ, simplices vel compositæ regulares, vel anomalæ, exanthematicæ putridæ hecticæ, vel lentæ; ut porro quædam facilius vel difficilius sanationem admittant, quædam cito decurrant, quædam longius extrahantur, quædam etiam hominem perimant. De qua febrium origine, earumque causis, & differentiis, pluribus egi in dissertatione de *generatione febrium.*



## Farrago sententiarum.

*Art. 32. Hippocratis Aphorismus de diæta in mor-* Regule  
de diæ-  
ta.  
bis acutis sic se habet : ubi peracutus est morbus ;  
statim extremos habet labores , & extreme tenuissimo  
victu uti necesse est ; ubi vero non , sed plenius ci-  
bare licet , tantum a tenui recedendum , quantum mor-  
bus remissior extremis fuerit . *Sect. 1. Aph. 7.*

*Art. 33. Graviter errant illi , qui acutos & in-* Incom-  
modum  
nimis  
reme-  
diorum  
copiæ.  
flammatorios morbos remediorum copiâ tamdiu affi-  
ciunt , donec natura , quo se vertat nescia , & hinc  
inde , tum a morbi vehementia , tum a remediorum  
pondere , varie distracta ; tandem cogatur succumbere :  
perturbato enim , distractoque motu illo ordinato na-  
turæ a repetitis toties , vel absque methodo exhibitis  
medicamentis , nec Febris minuitur , nec crisis stato  
tempore succedit , sed patiens dubio Marte collucta-  
tus , vel in perniciem , vel in chronicos morbos de-  
labitur . *Baglivius.*

*Art. 34 Hippocratis aphorism. 36. §. 4. Sudores* De die-  
bus cri-  
ticis.  
febricitantibus boni , qui manare cœperint die tertio ,  
quinto , septimo , nono , undecimo , decimo quarto ,  
decimo septimo , vigesimo primo , vigesimo septimo ,  
tricesimo primo , tricesimo quanto , ii enim sudores  
morbos judicant : qui secus evenerint , laborem , & &  
morbi longitudinem , & recidivas significant . Apho-  
rism. 24. §. 2. Index septimi quartus ; sequenti se-  
ptimanæ octavus initium ; spectandus quoque est un-  
decimus ; siquidem is secundæ septimanæ quartus est ;  
rursusque decimus septimus spectandus : is enim a  
quarto decimo quartus est , & ab undecimo septimus .  
Dierum ( inquit *Lister* ) indicum & contemplabilium  
a *crises explicandas* tota doctrina valde obscura est .  
Est quidem trium concoctionum quædam mensura , ut  
ex anatomia & statica medicina plane constat : ita  
Februm intermittentium periodi statæ sunt ; in aliis  
vero morbis acutis , quales sunt Febres symptomati-  
cæ , ut pleuritis , angina , variolæ , & Febres conti-  
nuæ , *crises* , earumque indicia forte non ita promptè  
animadvertimus , quod parum naturæ , sed nobismet  
ipsis

Indici-  
bus .

Doctri-  
na co-  
rum  
valde  
obscura .



Utilitas  
vomito-  
rii in fe-  
brium  
princi-  
pio.

ipsis (quod tamen veteres non fecerunt) totam fe-  
bre sanationem vindicamus.

Virtus  
singula-  
ris rad.  
Ipeco-  
cōanhar.

*Art. 35.* Nullum remedium (inquit D. D. *Freind*)  
sub initiiis Febrium est æque salutare ac vomitorium,  
sæpenumero & necessarium est, si quando, quod ple-  
rumque sit vel nausea, vel ventrisculi gravitas, vel et-  
iam capitis dolor invaserit: hoc medicinæ genus apud  
vetustissimos *Græcos* haud infrequens fuit, & *Celsi* tem-  
poribus *Romæ* perquam familiare. Medicamenti, quo  
vomitus cietur, interior est quædam actio; quæ nus-  
quam alias se manifestius prodit, quam in celebri illa  
radice *Ipecaconha*. Hujus sane vis in attenuandis humo-  
ribus eximia effi; cui & fidem facit summa herbæ a-  
maritudo, & vividus ille, qui apparatu Chymico eli-  
citur, *sal.* Equidem hanc radicem non parca manu ad-  
hibitam esse comperi, cum nulla fere vel per os vel  
per alvum sequeretur purgatio. Elapsa autem una aut  
altera hora incallescere cæpit ægrotus, ita ut, pulsu ex-  
citato, tandem in uberrimum sudorem colliquesceret.

Febres  
vix sine  
evacua-  
tione  
curan-  
tur.

*Art. 36.* Hoc unum spondeo (idem laudatus author)  
quemquam experiundo comprobaturum, quod scilicet  
ex Febribus multæ evacuantibus solis, etiamsi haud  
alio fuerit remedio usu., cedere consuescant; vix ullæ  
autem, quæ paulo vehementius invaluerint, medicina  
qualicunque, si ab hoc evacuandi instituto decesseris,  
restringui possunt.

Metho-  
dus Lu-  
dovici  
in cu-  
randis  
Febr.

*Art. 37.* Hæc est accuratissima Danielis Ludovici  
methodus curandi Febres continuas, nempe, in prin-  
cipio præmisso vel omisso vomitu, mox volatile ali-  
quod v. g. tincturam bezoardicam, mixturam sim-  
plicem, spirit. C. C. & pro circumstantiarum ratio-  
ne cum opiatis exhibendo; in statu fixiora, terrea,  
alcalina, in declinatione cancrina, corallina, &c.  
hac nempe methodo nec crisin negligit medicus, nec  
otiose eam expectat.

*Art. 38.* Quo mitiora pathemata sunt circa pri-  
mas vias & regionem stomachalem, eo mitior & sa-  
lubrior est Febris.

Signa  
progno-  
stica.

*Art. 39.* Facies turgida & subtumida morbi lon-  
gitudinem pronunciat.

*Art. 40.* Quo magis sudant febricitantes, eo mi-  
nor

I. *Febres in genere.* II  
est *sedimenti copia in urinis; Glutinosus sudor*  
*ssimus.*

et. 41. *Quanto urina rubicundior est in initio*  
*citius terminatur Febri, cum signis bonis ad*  
*cum malis ad malum: Urina alba, aut pal-*  
*la admodum cruda in Febribus ardentibus pe-*  
*sa est, & plerumque mortem portendit, præ-*  
*terea si adsit delirium; convulsiones enim sunt in*  
*inquo.*

et. 42. *Surditas in Febribus, urina existente cru-*  
*delirium grave portendit; sed si cum signis co-*  
*lis jungatur, bene ominatur.*

et. 43. *In Febribus, si ægri non possunt discer-*  
*colores, imminent convulsiones.*

et. 44. *In omni Febre pulsu existente languido, Cautela*  
*ali, aut formicante, cane petus & angue opiat de usu*  
*centur.* opii.

et. 45. *Observatione constar, quod crebra sangui-*  
*ssio homines Febri aptiores reddat præ cæteris: quare*  
*vulgo dicitur, quibus sanguis semel detrahitur,*  
*nisi quotannis idem faciant, in Febrem proclives*  
*& pinguescere. Villis.*

et. 46. *In Febribus continuis; si pulsus sit fortis* Prognos-  
*tenore pergens, ut ut deliria, tremores, tendi-* ticon  
*subultus, cæteraque dira in genere nervoso sym-* genera-  
*ta subitam ruinam minari videantur, semper be-* le.  
*æfagit, e contra vero pulsus celer, debilis ac va-*  
*s mortem præ foribus adstantem indubitanter præ-*  
*ut ut reliqua symptomata adblandiantur. Mor-*

et. 47. *In curatione Februm summum ac acerr-* Acumi-  
*medici ingenium requiritur. Judicio præpollenti,* ne in-  
*ati innate & incommunicabili, plurimum de-* geni-  
*. Morbi genius, anni constitutio, ægroti tempe-* opus  
*ratum, & vivendi modus, symptomata singula &* est.  
*rsa, & innumera alia incidentia, & accidentia,*  
*conjunctim & divisim animo præsentis & sereno*  
*inter perpendenda sunt; e quibus inter se rite col-*  
*lagaci medico, lente festinanti, exurgit clara ac*  
*cta medendi methodus; & plerumque insequitur*  
*morbi exitus. Veritatem hujusce mei effati lon-*

ga jam annorum serie non sine gratissimo animi d  
clamento feliciter expertus sum.

Eadem  
pharma-  
ca sem-  
per fe-  
brem  
non sa-  
nant.

Art. 48. Valde communis est morbus, qui febris dic  
& nuspiam aliquis extat, cui persuasum sit, unum  
tum remedium ad eandem subigendam valere. Obse  
tione dignum est, quæ Pharmaca quodam tempore fe  
fugarunt, alio eandem virtutem non obtinere. Cor  
ipse Peruvianus tanti habitus; cum primum in Euro  
prodiit, subinde frustra adhibitus fuit, etiamsi plurima  
ligentia & cautione usurparetur. Veteres Centaur  
minus ut singulare adversus hos morbos remedium c  
brarunt; nunc vero tantos effectus, vel qui ad hos prox  
accedant nobis intueri non licet, cujus differentia r  
ab Aeris mutationibus; a quorundam miasmatum p  
dominio, atque adeo a diversitate nutritionis, quan  
hiscæ elementis plantæ mutuantur, oriri posse ve  
niliter credimus; Febres item singulis annis; cum  
sint eadem, quamvis eadem symptomata ob oculos sist  
prudentem exigunt Medicum ut aliud usurpet re  
dium; quando illud quo diu usus est nondum ægru  
salantis gratiam revocavit. Nulla ergo remedia tut  
dantur generalibus, quæ necessario in qualibet Fe  
simplici; atque etiam subinde in compositis & com  
catis usurpari debent. M. I. G. *Medicus Bruxella*  
*Lexico Med. seu Dictionnaire Medicinal.*

A qui-  
bus in-  
cipien-  
da cu-  
ratio.

Art. 49. Incipiendum semper, ait memorarus Sc  
tor, a Clysmate purgante vespere ægrotanti exhib  
do, quodque sequenti modo concinnatum ceteri cu  
libet vices exerere potest.

24. Fol. Malv. Parietar. Mercurial. Betæ ana n  
j. Senn. orient. unc. j. Sal. Tartar. ℥. j. Aq. f  
℔. j. ebull. per horæ,  $\frac{1}{4}$  & colat. dimid. pro pu  
adde Mellis unc. jv. f. Clyster. vespere injiciend  
Postridie extrahatur sanguis ad unc. x. & die  
quenti detur Emeticum. Hæc sanè methodus nunq  
fallax est, quocumque febris deinceps Typo in  
prodeat, non obstante quod nonnullis practicis vid  
tur binos tresve accessus nullo objecto Pharmaco i  
ctos relinquere; sed nisi de specificis pharmacis  
intelligendum est. Generalia quæ laudantur cito t



I. adhiberi nequeunt, cum primæ viæ infarctæ æque semper inveniantur. Ægro item propinanda aqua pura nitro depurato imbuta ad libitum; ammo præcipue febris calore vigente affatim haurienda; & quia Ptisanæ ex herbis & radicibus factæ cipiis onerantur fermentescibilibus, laudabile idcirco erit iisdem abstineri.

Art. 50. Si æger non purgatus fuerit quantum ex-Quomo-  
t, quod cognoscitur ex oris amaritie, acidis eru- do con-  
tionibus &c. ad alterum Emeticum biduo a primo tinuan-  
eniendum est. Si Venter plenus est atque tensus, dam,  
scera doleant, gravitas genua teneat &c. purgan-  
est ut sequitur 24. Senn. mundat. ʒ. ij. Cheresol.  
n. j. Aq. font. unc. viij. Infund. per hor. 8. super  
er. calid. & colat. add. Mann. elect. unc. j. per-  
t. iterum, atque colat. add. Crem. Tart. ʒ. sem.  
up. fior. persic. unc. j. m.

Art. 51. Certissimum est alvum Laxantia febres Obser-  
d ægre, & sine reditus periculo compescere. Irriva-  
tio  
de e-  
vacuan-  
tium  
usu.  
n hinc est specificis vacare remediis, dum primæ viæ  
etæ adhuc reperiuntur, quæ si ita non se habeant  
antibus id obtinetur, quæ sæpe febrium intermitten-  
um, quarum accessus cito reiterant, fermentum per al-  
um præcipitant. Fatendum quidem est Empiricos  
osdam, imo Circulatores nonnullos specificis sæpe  
ores tollere, quorum si optatum effectum interdum  
gri non vident, id negligentia tribuendum est eo-  
n, qui generalium remediorum usum antea despexere.

Art. 52. Quodsi febris simpliciter continua videat- Reme-  
dia ad  
febrem  
simplici-  
ter  
conti-  
nuam.  
ur, h. e. malignitatis expers, veluti absque purpura,  
riolis, aliisque gravioribus symptomatis, sequens re-  
medium jubendum est, quod laudato Auctore fidem  
iciente, omnium febrifugorum huc usque inventorum  
præstantius haberi debet.

24. Sal. Tamarisc. Absynth. Armoniac. ana ʒ. iij.  
hin. Chin. unc. ij. f. pulv., quorum Syrup. de Ab-  
ynth. unc. ij. fiat Opiatum. cujus ʒ. j. detur mane,  
ptidem trihorio a meridie, totidemque vespere. Ha-  
enda observatio est, ne ægre hoc remedio utatur nisi  
ora elapsa post ultimo assumptum cibum, ejusque vis  
specificæ æque tuto Continuas simplices, ac Inter-  
mit-

Reme. mittentes subigit, modo per XV. dies continuetur  
 dia ad *Art. 53.* Si vero febris est Maligna, quod cog  
 i brem scitur ex pectoris oppressione, hypochondriorum  
 mali. ventris rumore, gravedine capitis, delirio, raptu  
 gnam. cerebrum, motibus convulsivis, nausea, inclinatio  
 ad vomitum, vigiliis &c. tunc ommissa Ptisana vel  
 tione nitrata, altera paratur ex Rad. Scorzonæ,  
 Raf. C. C. Dein alterum propinatur Vomitorium,  
 Confect. Hyacinth. drachma admiscetur, & quoti  
 jubetur ægro usus pulveris ex Ocul. cancr. ℥. j,  
 Sale Tartari, vel absynth. vel Armoniaci gr. xx  
 cum jure carniū hauriendus.

Conti.  
 nuatio  
 Reme-  
 diorum  
 ad fe-  
 brem.

*Art. 54.* Quando febris ex sanguinis oritur dis-  
 lutione; quod ex pulsu cognoscitur parvo & frequen-  
 ti, ex oculis splendentibus, nec non ab ægri inquie-  
 tudine; vel quando oritur ex coagulatione; quæ cog-  
 noscitur ex pulsu duro, & tenso, ex difficultate in-  
 spirationis, dolore lateris, & somnolentia, bis in die  
 optimo successu sequens haustus usurpatur.

*℥. Stib. diph. gr. xx. Sal. Tart. gr. xxx. A-  
 flor. Tunic. lil. alb. ana unc. ij. Sp. sulph. p. c. gutt.  
 iij.* In omnibus malignis febribus putridis, & colliqua-  
 tivis hoc remedii genus palmam ceteris quidem præ-  
 pit. Juvat autem in iisdem colliquativis febribus, quæ  
 alvi fluxus comitatur, vomitorium præmittere ex Rad.  
 Ipecacuanhæ ℥. sem. jure carniū hauriendum. Si ve-  
 ro symptomata hoc remedio semel exhibito non re-  
 mittant, postmodum reiteratur. Hoc omne illud est  
 quod ad publicam utilitatem litteris consignare fas era-  
 reliqua enim Clinici experientia præstanda relinquun-  
 tur, qui morbi progressui invigilando, augescentibus  
 sæpe & iminentibus symptomatis opportune & con-  
 gruis auxiliis subveniat.

Regula  
 pro usu  
 evacuan-  
 tium in  
 febribus.

*Art. 55.* Veluti præcipua Praxeos Regula habenda  
 est, ne diebus Criseos qui sunt 5, 7, 9, 11,  
 14, 21; nec etiam in statu febris purgans aliquod  
 jubeatur, sed in declinatione aut remissione & diebus  
 omni febre expertibus, idem usurpare præstat. Vitan-  
 dæ itidem sunt Ptisanæ refrigerantes, Sp. Vitrioli,  
 Hordeata, Emulsiones, Amygdalæ, & pulli juscula  
 &c. hujusmodi namque remedia, & quæ magnifice &

glorioſe a quibusdam celebrantur, nulla maiori virtute pollent ad brevi tempore febrem compeſcendam, niſi ut validius revertatur, & maiori vexet deinceps moleſtia. Certiſſimum eſt ergo remedia, quæ motum ſanguinis fermentativum componunt, cum hoſtem noxiū abigere nequeant, niſi palliativorum vim, & effectum præſtare.

## DE FEBRIUM SYMPTOMATIS gravioribus

*Inter legendum & obſervandum.*

*Arbuthnoti Sententia.*

*Art. 56.* **M**aximi reſert, ut aptum regimen præſcribatur ad frigus, quod principio februm Obſer. variationes circa ſigores. corripit, nam hoc in gradu idem contemnere periculum eſt; rigor enim diuturnus graviorem morbum aſſendit, & primum greſſum in mortem ponit. Quouſque perſiſtit, ſanguinis circulatio lentior eſt, & qui in arteriolis capillaribus remoratur, vi cordis obſiſtendo anxietates facit, & occaſionem præbet, ut circa ipſum per polypoſæ concretione generentur. Patet hinc cur ſigores inflammationibus augmentum adferant. Qui ex quartana febre pereunt, durantibus rigoribus occumbunt; nullum enim triſte ſymptoma datur, quod a diuturno rigore produci nequat.

Rigore item perſiſtente nec calida Analeptica, nec irritantia medicamenta conveniunt; ſiquidem illa vehementius ſuper dexterum cordis ſinum agendo ſanguinem nimio impetu in pulmones adigunt, hæc vero rictius vaſa minima conſtringendo mala ſubinde inveniunt.

Nil igitur aptius Aqua hoc in caſu invenitur, quæ ſolvendo ſimul, & laxando rigores cito abrumpit, & citius alexipharmacis, & Analepticis ſudores prolicit. Quare efficacior reddi poteſt Vini Rhenani additione. Nonendum item eſt, ægrum, frictionibus ad corporis extremitates habitis, plurimum levare poſſe.

*Art. 57.* In anxietatibus, quæ febrem comitantur, Anxie. rates. regimen calidius præſcribere licet, quia cum eadem ſæpius



sæpius a spasticis constrictionibus, & a flatibus foveantur, utiliter Aromaticorum virtute adjuvantur.

Indicatio est contra anxietates: ut substantiæ saponiææ dissolvendo sanguini aptæ adhibeantur: Utiles quoque sunt fructus maturi, plantæ quædam lactiginose: ut lactuca, endivia &c. In primis vero mel & mellita laudantur.

*Art. 58.* In siti febrili: ne sit potus frigidus, quia sitis. frigidi liquores facium, gulæque glandulas contrahendo, æque cito sitim non extinguunt, ut qui mediocriter calent; quare hoc in casu potu leviter subacido ægre confortandus est, & quia omnia salia sitim augment, excepto nitro, ideo spiritus nitri dulcificatus ad hunc usum optime facit. Faciunt quoque decoctum album Avenæ, & Emulsiones, modo stomachi debilitas, & flatuositas absit; secus aqua pure cum vini Rhemani pauxillo præferri debet.

*Art. 59.* Nausea, & Vomitus ex gravioribus sunt Nausea febrium symptomatis, quia ægrum ita constituunt, ut & Vo. nihil admittere intus possit, quare Vomitorio opportune exhibitio sæpe hoc malum prævenitur, vel vomitu aliquandiu tepida excitato curatur.

Quousque vomitus persistit, acida, & styptica, & acerbata indicantur, quippe quæ stomachi fibras corroborant. Observatione quidem dignum est, ægros hoc in statu leviter acidis delectari, contra vero pingues oleososque liquores naturaliter adversari.

Hoc item symptoma frequentius cohibetur laxantibus, quæ alvo soluta biliosas fæces extrudunt. Secundo attendendum est hoc in casu, & in quibusdam aliis ægrotantium appetitui, qui subinde res quamvis inconcinnas expetendo: ut Sal, acetum, &c. ab iisdem tamen plurimum levantur.

Vomitus qui a biliosa saburra producitur, haustu salis naturæ acido, qui a putrida, omnigenis salibus tractari debet. Hoc autem in casu emulsiones cum cremore tartari, Vinum Rhenanum cum aqua, gelu ribesiorum, conserva cydoniorum, acetosa decocta in jure carniū optime conferunt.

Si Vomitus a copia pituitæ exoritur, aromaticis curabitur.

Si cum stomachi inflammatione vexet, perniciosus est.

*Art. 60.* Flatus, atque spasmi a febris calore humorum particulas rarefaciente producuntur, quare anodynis, calmantibus, & refrigerantibus eidem obviam eundum. Flatu  
& spasi-  
mi.

*Art. 61.* Virium debilitas cum febre sociata principio morbi a vasorum repletionem nimia exoritur, eadem vero declinante ab inanitione, quare binæ contrariæ causæ diversam curationis methodum exigunt. Priori casu evacuatio, & dilutio requiritur, altero dandum est ægro plenius nutrimentum, & vini cum aqua usus permittendus, nec non aromata parva quantitate, gelatinæ, & juscula concedenda. Debilitas.

*Art. 62.* Temperatur demum calor Febrilis phlebotomia, quiete non solum corporis, verum maxime spiritus, aquosis, subacidis &c. Calor

*Inter legendum & ex observatione.*

*Art. 63.* Frigus in Februm initiis oritur e immutata cordis contractione liquidis ad extrema fere stagnantibus; unde oriuntur, si diu maneat. *polypose* in vasis majoribus *concretiones*, & interdum mors subitanea insequitur; ideoque quo majus in initio frigus, eo periculosior est Febris, in peste incipiente frigus est summum. --- Optime curatur potu aquæ calidæ *nitrosæ* cum paucis vino, *decoct. ceccin. frictione blanda*, &c. Frigus

*Art. 64.* Calor intensissimus in Febris & velut incendium cum magno & forti pulsu fere semper *venesectionem* postulat; quandoque etiam *clysmata lenientia* calorem mitigat. Nimius sanguinis fervor & ebullitio *cupulapiis*, *emulsionibus* & *decoctis appropriatis* attemperandus est: sed apprimè cavendum est; ne ex nimia attemperazione, spiritus elasticitate sua plus justo orbentur, & inde Febris ardens inopinato in *malignam* mutetur. Calor.

*Art. 65.* Febris *lipyria* dicitur, quando interiora *Lipyrias* uruntur, exteriora vero frigent; oritur ex *inflammatione visceris interioris valde sensilis*, algor autem non est tactu medici judicandus, sed ægri judicio, qui se *Allen Pars I.* B algere



algere dicit, & tegi jubet; tepent enim membra; hæc Febris brevi terminum absolvit, plerumque intra triduum vel quatrimum, & vix unus evadit, nisi statim ab initio occurratur.

**Sitis.** *Art. 66.* Ad sitim in Febris extinguentiam melius est frequentius & parcius bibere, quam una vice multum ingurgitare; sequens est porus gratissimus febricitantibus; *℥. Aq. font. cum pane tost. decoct. ℔ij. vin. rhenan. ℔j. gelatin. CC. ℥ij. syr. cydon. vel e succ. citr. parum misce.* Convenit etiam decoct. ad sitim *Fulleri*, vel decoct. *coccin. ejusdem.* Gargarismata quoque usui esse possunt, ut gargarisma commune *Fulleri*, decoctum *rosarum* pro gargarismo, &c. Frequens ablutio oris cum simplici aqua multum confert ad sitim fallendam. *Sitis* (ut recte monet *Helmontius*) non oritur a calore, sed a defectu salivæ, hinc guttæ aliquot *spir. sulphur.* plus levant sitim; quam integra mensura aquæ frigida; in eundem finem etiam conducunt *succi e vegetabilibus & fructibus*, ut *acetosæ, aurantiorum, limonum, citronum, ribium, berberum, cydoniorum*; &c. Præ ceteris commendabiles sunt hi succi per spontaneam residentiam post *sulphurationem* secundum *Helmontium* depurati; & in loco frigido asservati; *tamarindi* quoque optime conveniunt sitim leniendo, & alvum blande laxando; hæc vero *acida & refrigerantia* non sunt omnibus Febricitantibus indiscriminatim porrigenda; sed opus est maturo consilio: si enim præter sitim importunam adsit etiam summa debilitas; tum vinosa & spirituosa tutius propinanda sunt.

**Jusculum a. vena. ceum,** *Art. 67.* *Ptisana* ex hordeo omnibus aliis sorbitionibus præfertur ab Hippocrate in lib. de victus ratione in accutis, & crebrior est ejusdem mentio apud veteres medicos; sed recentiores hordeovitis vertunt ejus cruditatem ac flatulentiam, & *jusculum avenaceum* substituunt.

**Siccitas linguæ & prunellæ.** *Art. 68.* *Siccitas & asperitas linguæ* corriguntur *humectantibus, & lenientibus.* Febris cum *prunella* dicitur, quando lingua, crusta nunc albicante nunc nigricante obducta; colore nigricante puniceo apparet tincta; ipsa saliva infecta videtur esse maxima causa. In *prunella* præter *mucilag. cydon. &c.* conducit sequens



quens gargarisma; ℞. Liqueor. e rapis coct. express. ℞. succ. sedi major. depurat. ℥iij. mellis despumat. ℥j. sp. sal. armoniac. q. s. m. Sequens quoque mixtura commodissima est, ℥; Alb. ovi unius; fortiter agitetur cum aq. spermat. ranar. ℥iv. mel. ros. ℥i. m. Ad linguæ etiam ardorem & siccitatem quandoque in usu sunt sequentia; viz. Mucilago sequens ℥. Mucilag. cydon. ℥ij. pulp. tamarind. amygd. dulc. excort. ana ℥j. ol. sulph. per campan. gut. xx. syr. de rub. Id. o q. s. misce. vel decoct. ulmi Bar. gargarisma commun. Fuller. loboch rub. vel loboch vitellin. ejusdem.

Art. 69: Nausea & vomitus in Febribus, cum a Nausea  
crapula ortum ducant; leni vomitorio (v. g. liquor. & vo-  
posset; cum foliis cardui benedict. incoct. copiose inge-  
sto, addendo inter vomendum bis terve sal. vitriol. ℥.  
vel cochi oxymel scillit.) tutissime curantur; ubi vero  
fermentum febrile ventriculū petit; & enormes vomiti-  
ones biliosas excitat; ut ægri vix quicquam vel medica-  
menti vel alimenti retinere valeant; imprimis convenit  
juscūlū tenuissimū pulli affatim ingerere; & postea  
remediis appropriatis tonum ventriculī laxatum firmare;  
sequens Julapim est valde efficax. ℞. Sal. absynth. ℥.  
iv. succ. limon. recens express. ℥ij. misceantur & finita e-  
bullitione add. aq. cinamom. hord. ℥iij. menth. Stephan.  
ana ℥i. sp. croc. ℥i. ol. caryoph. g. iv. syr. Cydon. ℥i. m. In-  
terdum ad laudandum confugiendum est. Plura de vo-  
mitione sistenda videantur alibi.

Art. 70: In Febribus aliquando accidit Diarrhœa Diar-  
colliquativa magno ægrotantium damno, quæ evacua-  
tio non natura vi; sed morbi potius impetu; & acri-  
monia turgentis; humoris naturam stimulantis fit, adeo-  
que symptomatica est, & sisti debet; convenit decoctum  
album pro potu ordinario; recte exhibentur pulveres  
testacei absorbentes diaphoreticis admisti; & postremo  
ad diascordium, theriacam, &c. deveniendum est. E-  
nema sequens quandoque singularem præstat opem, ℞.  
Fol. ros. rub. m. ij. coq. in lact. chalyb. ℥vj. in colatura  
dissolv. diascord. ℥vj. m. f. enema diutissime retinendum.  
Hic etiam plurimum facit; mihiq. in frequentiusu  
fuit, Enema de malicorio Fullerii. In genere observa-  
tus in Febrium initiis alvum laxiorem quam adstri-  
ctiorem meliorem esse, in progressum vero morbi pe-

jorem. Unicum hic notatu dignum observare licet, nempe, in diarrhœis colliquativis in declinatione Febrium accedentibus, & diu, non obstantibus remediis quibuscunque adhibitis, perseverantibus, solam sorbitionem *jusculi pullini* prohibito omni alio victu & potu quocunque diarrhœam brevi penitus tollere, & ægrum restituere, ut experientia me docuit.

**Dysuria.** *Art. 71.* Interdum Dysuria est symptoma molestissimum. *Emulſiones communes* effervescentiam humorum in Febribus ardentibus plurimum compescunt, & hoc molestissimum symptoma plerumque sublevare solent. ut etiam *ol. amygd. dulc. cum syr. de alth.* Dysuria ex applicatione vesicatoriorum in Febribus *gum. arab.* commodè medetur, *solutio scilicet ad ℥ii. in decoct. bord. ℥ij.* pro potu communi. Emplast. epispastic. Fulleri est omnium longe optimum & certissimum. Operæ pretium esset fortasse, experiri vires *Camphoræ* intermiscendo ipsam in compositione epispasticorum, num stranguriam vel ardorem urinæ præcavere potis esset.

**Sudor.** *Art. 72.* Sudor in Febribus, qui vel morbi initio vel quovis alio tpmore ante diem criticum, nec adhuc visis coctionis signis, profluit, est *symptomaticus*, & frequenter *colliquativus*, qui ægrotum gravat, & morbum exasperat; ideoque si modum excedat, arte, si fieri possit, cohibendus est. Prohibetur surgendo ex lecto; corpus a nimis integumentis liberando, aerem frigidiusculum admittendo; a calefacientibus abstinendo; *leniter astringentia & blanda acida* capiendo, &c. egregiam vim in sudoribus sistendis habet *succharum Saturni*.

**Dolor capitis, &c.** *Art. 73.* Immanis capitis, lumborum, vel artuum dolor in Febribus maxime in initio ut plurimum *vesectionem* postulat; manente nihilominus cum vehementia dolore injiciendum est *enema laxans*; fortassis levamen aliquale dolenti capiti conferre potest sequens epithema *℥. Sem. papav. alb. parum contus. ℥j. placet. rosac. ℥j. vitel. ovi unius, acet. sambucin. q. s.* misceantur super ignem, & f. epithema fronti admovendum, & sæpius renovandum.

**Vigilia.** *Art. 74.* Vigiliæ pertinaces in Febribus succurrendæ sunt, ne dissipatis spiritibus vires frangantur. Investiganda est causa vigiliarum; si a fervore & siccitate

pro



proveniant, conveniunt refrigerantia & humectantia; si a dolore, propriis remediis leniendus est dolor; non nisi necessitate coacti ad *opiata* confugiemus. Obiter monendus est medicus, ne *criticis vigiliis*, seu ab inquietudine critica suscitatis auxilium *hypnoticis* præbere sataget.

*Art. 75.* Prædicto malo contrarius est *sopor nimius* Coma in Febribus, seu *coma*, sive *assidua somnolentia*; quando sopor morbosus evadit, excutiendus est omni arte ne calor natus opprimatur; injiciendi sunt *clysteres acres*; *epispastica* variis partibus admovenda sunt, & *cataplasma de haleribus* sive *de raphan*. *Fulleri* plantis pedum applicandum; interne conveniunt *salia volatilia*, *coephalica* &c.

*Art. 76.* Pervigilium frequentissime est causa delirii, non ideo delirium *hypnoticis* curari tentandum est; nam id esset temerarium, sed indaganda est causa, & remediis appropriatis auxilium ferre, conandum est. *Camphora* (inquit *Quincy*) in delirio Februm somnum conciliat opio neutiquam proficiente. Delirium Febris imminere signum præbet, *urinarum*, quæ antea valde tinctæ erant & *flamineæ*, in *renues* & *aquosas* mutatio.

*Art. 77.* Convulsiones quoque interdum superveniunt, tremores item & affectiones *spasmodicæ*, in tali rerum statu diligenter expiscanda est causa horum symptomatum, unde medicus intelligat, quibus remediis internis opem ferre valeat, interim plantis pedum applicari possunt *duo columbi* pullive recenter mactati & per medios secti, vel toti pedes involvi possunt *calidis pulmonibus agninis*, *vitulinis*, vel *vervecinis*; renovari debent hæ applicationes saltem ter in die.

## FEBRIS EPHEMERA.

### D. Fizes sententia.

*Art. 78.* Febris hæc ita dicta fuit, quod per diem hoc est horas viginti quatuor durare soleat, extenditur tamen interdum addilem tertium conclusive; cumque ulterius extenditus abit in *synochum imputrem*, aut etiam *putrem*.



Typus

*Art. 79.* Febris Ephemera ea est febris continuæ simpliciter brevis species, in qua pulsus magnus est, modice celer ac frequens, æqualis & mollis, calor mitis absque gravibus symptomatibus, quæque intra diem, aut ad majus intra tres dies sua percurrit tempora.

Diagnosis.

*Art. 80.* Febrem hanc non antecedit cibi fastidium, nec corporis lassitudo, nec horror, multave oscitatio, verum repente ea febris velut tuta accedit cum calore, interim nullis febrilibus symptomatibus notabilibus stipata est, qualia sunt capitis dolor aut ventriculi, nausea, vomitus, inquietudo corporis, æstus, immutationes in urina; & similia, solvitur brevi, interdum latenter sine manifesta ulla evacuatione, sæpius per copiosos halitus aut madores; aut per sudores, neque multos, nec foetidos.

Causa proxima.

*Art. 81.* Causa hujus febris est materies febrilis constans particulis parum crassis, quibus admixtæ sunt, & laxè adunatæ multo copiosiores particulæ tenues, duræ, actuosæ, a quibus quidem sanguis exagitur protinus, duciturque in rarefactionem non tamen impetuosam, quod sanguis vix spissior fuerit factus, ex qua rarefcentia aliquantum difficile transit sanguis per vasa nonnulla minima incitatis simul ex tensione majori suscitata cordis & sanguiferorum viribus & adauctis, ex quibus sequitur frequentia pulsus modica & celeritas, magnitudo sine tensione tamen vel duritie, calor adauctus nec tamen æstuosus nec acer, neque symptomatum gravium productio, sanguine nimirum non ægre admodum per vasa minima transeunte, symptomatum siquidem febrilium gravitas a difficili eo transitu excitatur potissimum.

His autem materiei febrilis particulis cum exigua insit viscositas, ea facile solvitur, particulæque eæ tenues motu sanguinis agitativo vel destruuntur facile, vel solutæ penitus per cutim cum dispensa excernuntur, unde cito dissipata materia febrili febris brevitates ejusque terminatio, aut modo insensibili, aut per halitus copiosos & madores, aut per sudorem aliquem suavem.

Causa remota.

*Art. 82.* Causæ febris diariæ remotæ evidenter esse solent; eæ namque potissimum existunt: vigilia, sollicitudo, mæror, ira, solis æstus, lassitudo post exercitium immodicum, temulentia, inedia, & similia; quæ qui-

quidem causæ omnes febrem eam excitant, quatenus occasionem præbent, ut sanguinis inspissetur leviter simulque fiat aliquantum acrior, seu, quod idem est, quatenus procreantur ab eis in sanguine particulæ nonnullæ paulo duriores & magis activæ, quæ omnes simul sumptæ, ut materia febrilis, febris ephemeræ spectari possunt.

Febris ephemera ex præfatis cognosci aut saltem suspicari potest, neque enim de ea, nisi cum terminata est, Medicus certus fit, cum interdum talis existimata continuetur in putridam, fit enim aliquando ut materia febrilis, tum in sanguine, tum in primis viis delitescat gravis, cujus spissamentum non evolvitur nisi post dies aliquot, febrem acutam excitaturum, dum in principio partes tantum quædam ipsius mobiliiores extricantur, ac sine gravibus symptomatis febrem excitant, quæ imponit pro febre ephemera.

*Art. 83.* Semper est absque periculo febris ephemera, tum quod gravibus careat symptomatis, quod par-  
Prognosis.  
 rum difficile fluere sanguinem per vasa minima, primasque vias a pravorum succorum apparatu liberasse denotat; tum quod ipsius materiæ motibus sanguiferorum spontaneis & motu sanguinis agitativo evolvi facile & attenuari valeat per cutem deinde absque molestia discutienda facile & ableganda. Interea tamen cum circa febrem eam falli possit medicus, ut vidimus; suspendendum est iudicium ad tertiæ diei finem.

*Art. 84.* Committenda est naturæ febris hujus sa-  
Curatio  
 natio: hoc est sanguiferorum motibus spontaneis & sanguinis agitativo. Id unum tantummodo ab arte expetitor, ut nulla committatur culpa, qua in incepto opere natura turbetur; quapropter tota prima die relinquendus æger sine alimento, potandusque aqua tantum, aut ptisana aliquo diluente: ut infuso capillorum veneris; si autem ultra diem febris protrahatur jacula ei exhibenda quoque erunt, interdicto omni alimento solido, ne ab eo pravi quidam succi in primis viis procreentur, qui febrem putridam excitare possent, nunquam enim in febre quacunque digestionem bene fiunt. Verum si calor paulo nimis adauctus perciperetur, vel aliquod accederet symptoma paulo molestum, ut capi-



tis dolor aut aliud, sanguinem saltem semel mittere prudens foret, tanto magis quo cum febris ephemera corpora potissimum juvenilia & robusta aggredi soleat, ex tali evacuatione nihil detrimenti timeri possit. Tætero si iis observatis febris intra dies tres non dissipetur, tunc Medicus illum non esse febris ephemeræ genium gnarus inquireret per signa, an tunc febris synochus putris aut imputris existat, quo ut infra docebitur, febrem quantocyus efficaciter impugoet. Imo si ante diem tertium signa putredinis manifestentur, succurret ut febris putridæ incipienti.

*Hecqueti sententia.*

Quid sit *Art. 85.* Ephemera febris, juxta scriptorum judicium, ad spiritus magis quam ad sanguinis corruptionem spectare videtur; aut ephemera febris, quæ pauperes & operarios invadit, quamque *Courbature Galli* vocant, ab imminuto fibrarum Tono exoriri evidentiissimum est; quia ex diuturnitate laboris, nervosæ fibræ debiliores factæ laxantur & staccantur, unde solida debilitata, quantum par est ad circulationem sanguinis promovendam contrahi nequeunt. Est ergo in hoc morbo *virtus Systaltica*, cui incumbit omni præstare valetudinis conversationi necessarium, quæ inepta nanciscitur sanguinem deturbandi. Hinc eodem ubique stagnante molestia parit, & impedimentum iis partibus ubi remoratur, & sistit.

*Signa.* *Art. 86.* Sic talis Morbus, vulgo *Courbature* nuncupatus, ex lassitudine repente exorditur totum corpus tenente, quam rigores sequuntur, capitis gravitate & universali oppressione conjuncti, cum febre itidem calida, decem vel duodecim horis persistente, quæ demum sudore desinit.

*Causa.* *Art. 87.* Inordinata perspiratio præcipua *Courbaturæ* causa videtur, nam a violentia exercitationum, & musculorum diuturno motu in operariis & pauperibus, sanguis per totum corporis habitum dispergitur, atque eo quidem promptius & facilius, quod solis ardor, ad modum succus cucurbitarum; eundem ad externa attrahit. Accedit etiam ex negligentia & sæpius impossibilitate corpus mature obtegendi, ob-



oca humilia, humida, & insalubria, in quibus degitur. Cum cutis pori improvide constipentur, plurimum, quod perspirare debebat in sanguinis massam recedit, unde humore heteroclitico gignito, adversus hanc naturam insurgit, ut omnibus viribus ad externa corporis ablegat, in quo conatu natura febris consistit.

Art. 88. Generali medendi methodus in hoc malum sita est, ut videlicet spiritus animales compellantur, fibrae ad naturalem tensionem revocentur, sanguinis quantitas in iusta mediocritate detineatur. Sanguinis imminutio phlebotomia expeditur, cui medio deinceps addi potest Emeticum temperatum, forte corpus aegri succo alimentitio scateat, vel stomachus impeditus videatur ab impressione, quam vis moris morbifici adtulit. Tunc enim huiusmodi vomitorium cum apto regimine hoc est humectante. & nulcente eo quidem salubrius est, quo foret causticum insalubrius.

## FEBRES INTERMITTENTES.

Art. 89. Febres intermittentes multiplicis sunt generis; atque usus invaluit easdem sequenti ratione a pluribus nutuo distinguendi: *Quotidiana* dicitur ea, quae febrium inter-  
em hora qualibet die revertitur; *Tertiana*, quae mittentium di-  
it quovis tertio die inclusive; *Quartana*, quae quartum di-  
quovis die inclusisse. Si Febris quovis quinto die finitio.  
at *Quintana* dicitur, si sexto *Sextana* si septi-  
*Septimana*. &c. Dantur etiam febres *Tertianae*  
*simplices*, vel *triplices* dictae, aliae vero *duplices*, tri-  
esque *Quartanae*, quarum typus sequenti ratione  
ernitur.

Art. 90. *Tertiana duplex* est quae binos eodem  
accessus habet, postridie autem nullum; vel sin-  
die unum. Differt febris haec a quotidiana, quia  
in accessus horam non habet, sed secus ac in quo-  
na primus tertio correspondet, secundus quarto,  
deinceps. *Duplex Quartana* ea est in qua mo-  
ni eodem die accessus ingruunt, duobus septe-  
bus diebus omni accessu expertibus relictis,  
singulis diebus accessus adest, tertio semper im-  
mu-

muni relicto. Quoad triplices Tertianas & Quartanas interdum bini accessus eodem die redeunt, interdum diversis diebus; quod ubi contingit, observatur priorem accessum correspondere quarto secundum quintum, tertium sexto, atque ita deinceps.

M. I. G. Sententia.

Ad fe. a generalibus remediis semper initium sumendum est  
bres in. Quando febris locum non cedit, sed pertinacitet in  
permit- sistat, ut in Autumnalibus frequenter occurrit, reme-  
rentes dium usurpabitur methoeice, ex Salibus, & China  
remedia. china conflatum cujus præparationem alibi tradidimus.

Art. 91. Cujuslibet generis sit febris intermittens, quod æqualis efficacix fore experientia probavit. *℞. Chin. chin. ʒvj. Aloes succotrin. Rhabarb. ana ʒij. Cinnab. natural. Lapid. Hæmat. ana ʒ. sem. pulverent. simul & cum Syrup. absynt. q. s. f. Opia* de quo capiat æger magnitudinem avellanæ quotidie mane stomacho jejuno, totidemque sera cubitum iturus, usque dum febris eum deserat, & per duos vel tres dies etiam post febris discessum continuetur. Hujus remedii præstantia commendabilis & specifica quidem est, maxime in quartana febre, quam nulla relicta noxa satis frequentet, sed aliis tractata methoeice sæpe recurrentem, felicissime subigit. Potest etiam loco ejus sequens usurpari. *℞. Nucis myrist. n. Alumin ʒij. conter. simul & in cyath. Vini alb. ner. infund. per horas quinque; dein trahenda infusione propinetur tota dosis una hora ante frigoris cessum, & stragulis deinde æger probe obtegatur.*

Art. 92. Efficacius autem antifebrile, quod mihi perspectum est, sequens ipse reputo. *℞. Ran. virg. q. v. quibus intra duobus testis quarum juncturae sta obturantur probe ad ignem exsiccatis fiat pulvis subtiliss. per setaceum vel potius sericeum trajiciendus. Porto ʒ. Rad. Cichor. Sylv. Malv. App. quibus exsiccatis subtilissime itidem seorsim conteruntur. His prestitis ʒ. Pulv. suprad. Ranar. virg. unc. i. pulv. rad. Cichor. ʒ sem. pulv. rad. Ma. Apii ana ʒ ij. misce. Hujus pulveris dosis pro* far



tribus est ☉ i. pro adolescentulis ☿ ii. & ab ætate  
 aetatis 20. usque ad 60. est ♄ j. Sumitur in cyatho  
 aërio sp. vin., cui vix ac pulvis subscedit, additur  
 tantumdem aquæ, quibus recte agitatiss fit haustus, & os  
 itea aceto & aqua abluitur. Tum æger Ptisana utatur  
 radicibus cichorei sylvest. & glycyrrhizæ tantum,  
 usque in dicti remedii usu perseverat. Prima remedii  
 as stomacho jejuno hauritur, blborio vero elapso jus  
 nium vel Ptisana, trihorio post altera remedii dosis  
 trihorio iterum elapso Ptisana, trihorio demum post  
 tia remedii dosi, atque itidem tertio elapso trihorio  
 ana. Ægrum fas est, cibum consuetis horis  
 umere, sed postridie dabitur jejuno remedium, & tri-  
 o elapso ptisana; postea cibum capiet, & die ve-  
 rascente alteram remedii dosim hauriet, & trihorio  
 ptisanam. Sic quoque tertia die semel tantum ho-  
 matutinis & stomacho jejuno remedio fruatur, &  
 orio elapso ptisana. Pro certo habendum nullam dari  
 rmittentem febrem etiam in locis palustribus, &  
 osis, ut illud est Zelandiæ, præcipue vero quar-  
 um, ut ut contumacissimam, quæ huic remedio  
 cedat. Cavendum tamen a Lacticiniis, Butyra-  
 Caseosis & Saccharatis.

Art. 93. Alterum remedium pro omnibus intermit-  
 tibus tanto mirabilius, quo simplicius, quodque ut  
 imum sanat, malum citreum est. Hoc sub frigo-  
 febrilis accessu nullo adempto cortice devoratur,  
 æger stragulis obtectus ad sudandum decumbat.

Art. 94. Vino modice utendum est semper aqua Quomodo dan-  
 do, non solum in febribus intermittantibus, sed do dan-  
 continuis etiam remittentibus, etsi aliquid de mali- dam vi-  
 tate participant. Id omne, quod ab eo impendere num fe-  
 est, levis est tantum capitis circumgyratio, aut bri-  
 tis alienatio, quæ symptomata, utpote leviora & tantibus.  
 cia, non prohibent, quin prædicto modo vinum  
 petur; etenim ægri molestiæ ab utilitate, & com-  
 is inde emanantibus affatim compensantur.

Art. 95. Quoad Topica sive remedia externa quo- Extrema  
 nonnulli in curarione intermittantium febrium ad fe- remedia  
 itentem celebrant, duorum hic meminerimus, quo- bres,  
 vis ceteris præstat. 4. Cortic. Allii, Croc. Pi-



per. Sal. comun. Fuligin. q. v. f. pulv. Acet. subigen-  
 dus; quo in pastam redactio quartus digitus utrius-  
 que manus singula die, qua febris imminet, obvolvatur.

Art. 96. Aliud Topicum 4. Sal. tenuis man.  
 Sal. comun. man. i. contund. simul additoque aceto  
 quantum ovi cortex capere potest, & tantundem Fu-  
 liginis durioris & splendentis diu misceantur omnia  
 atque addito demum ovi albumine f. emplastrum, can-  
 pis utriusque manus applicandum.

Art. 97. Huiusmodi externa remedia interdum effe-  
 ctum obtinent, sed iis plurimum non est fidendum. Prae-  
 stantius, quod adhiberi potest, Theriaca est, qua in spiri-  
 tu vini dissoluta, eadem in accessu frigoris spina dor-  
 si confricatur, ubi febris intermittens, est; sed in conti-  
 nuis febribus ad vitanda deliria plantis pedum pasta farin-  
 ae plurimum fermentata, & aceto soluta admoveri potest.  
 Monendum tandem est, ne huiusmodi topicis antifebrili-  
 bus manus admoveatur, nisi generalibus adhibitis reme-  
 diis, secus vero aut recidivæ periculum impendit, aut  
 febris in immodicam longitudinem protrahit.

Art. 98. Observationem demum non præterimus  
 quod si febris a quovis alio morbo producat, ut  
 Diarrhœa, Dysenteria, Pleuritide &c. danda est op-  
 portuna præcipuo morbo, febre quodammodo prorsus dis-  
 specta: siquidem eodem adempto febris etiam sim-  
 pliciter subtrahitur, & sponte sua, rite sanato priore morbo  
 eadem conquiescit.

### Mortoni sententia.

Art. 99. **F**EBRIS intermittens est calor præternaturalis in sanguine accensus ab insolito spirituum expansione statis periodis redeunte; in hac autem Febre calor, rigor, & sudores se vicem excipiunt; adsunt etiam in paroxysmo ægritudo universalis, nausea, & vomitus, dolor capitis, lumbago, &c. Paroxysmus quidem acutus est, morbus vero ipse ut plurimum plus minus chronicus. Febris intermittens simplex facillime cognoscitur; ubi enim sese iam conspectum dat: quotcumque autem sint ejus varietates (h. e. quotidiana, tertiana, qua-  
 ta-

Morbus  
 febrim  
 produ-  
 cens pri-  
 mo cu-  
 randus.

Definitio  
 febris  
 inter-  
 mitten-  
 tis.

a, &c.) fermentum morbosum omnium idem est, viribus corsicis Peruviani certo acto cedit.

Art. 100. Species Febrium intermittantium complexes sunt: quotidiana, tertiana, & quartana; quotidiana, tertiana, & quartana duplex; semitertiana, &c. Sunt etiam Febres intermittentes quinto, sexto, vel septimo die recurrentes. Contigit mihi in praxi videre fœminam per septimanam Febre laborantem, deinde post septimanam omnino liberam; atque ita alterius septimanis febricitantem, & alternis apyrexia sentientem, idque per longum tempus. Cortice Peruvia curata fuit.

Species feb. intermitt.

Historia rara.

Art. 101. Neque venæsectio, neque vomitoria, cathartica, aut diaphoretica, neque aliud quodcunque medium in paroxysmo exhibitum aliquid ad curam hujus morbi promovendam conducere observatur, a justa dosi vini benedicti trihorio ante terminum paroxysmi expectatum exhibita, sæpius Febrem tertianam curatam novi. Antimonium diaphoreticum paulo ante adventum paroxysmi datum in illum morbum tollit; Sal absynthii febrifugum augere, & sequentem haustum usu comprobavi, ℞. Aq. ben. theriacal stillat. ana ℥ij. sal. absynth. ʒj. op. limon. ʒi ss. misce; sumat æger dimidiam partem trihorio ante paroxysmum, & reliquam in primo insultu. In Febribus intermittantibus (inquit Reus) pro singulari secreto mihi est lapis Lazur a ʒj. ad ʒj. cum spiritu vini ante paroxysmum traditus. Efficacia plurimorum amarorum antequam vires corticis Peruv. satis exploratæ fuissent) experta fuit: uti absynthii, cardui benedicti, gentian. flor. chamæm. fere specifica, & privadecocti amari febrifug. seq. ℞. Fol. matricar. card. absynth. summit. centaur. min. stor. cham. ana sem. card. ben. citr. ana ʒj. sal. absynth. ʒiss. in aq. font. q. s. ad ʒiss. dosi ʒiij. vel iv. quæ quaque hora extra paroxysmum. Item pulvis febrifugus sequens; ℞. flor. cham. subtilissime pulve-rit. ʒi. antimon. diaphoret. sal. absynth. ana ʒj. f. pulvis pro una dosi quarta quaque hora extra

Curatio



paroxysmum, utilissimus est quidem iis; quibus vires corticis defecerunt, vel quando ob <sup>ισχυρὰσις</sup> non possumus exhibere. In confesso est his & huiusmodi remediis Febres intermittentes æstivo tempore quando

<sup>Cortex</sup> <sup>Peruvia.</sup> <sup>nus re.</sup> <sup>medium</sup> <sup>polichre-</sup> <sup>stum.</sup> que curari: *Cortex* vero *Peruvianus* consensu medicorum ( hodie omnium ) est *catholicum febrifugum*, quod omnes Febres intermittentes, in quavis anni tempestate, in omni ætate, & temperamento, penitus; citò, tuto, & feliciter sanat: neque opus est, ut medici ingenia sua amplius torqueant in aliis febrifugis explorandis: *Cortex Peruvianus* sudorem omnino nullum excitat; tantum omnigenas concoctiones & vestigio emendat; sine ulla sensibili evacuatione; nisi aliquando alvum aliquoties; idque leniter admodum moveat: Modus exhibendi nundierum omnibus innotescit. Hactenus de Febribus intermittibus simplicibus.

<sup>Febris</sup> <sup>intermit-</sup> <sup>tens spu-</sup> <sup>ria:</sup> *Art. 102.* Symptomata vero Februm intermittens *spuriarum* nonnumquam sunt perquam vehementia, & typus Febris ipsius in variis suis stadiis sub larva vomitionis; diarrhœæ; doloris alicujus gravissimi; &c. absconditur. A periodica symptomatum vehementium exacerbatione & remissione; nec non a urina lateritii coloris verus morbus potissimum dignoscitur: alios etenim morbos frequentissime simulat, unde arrepta occasione, creantur nunc hæc, nunc illa gravissima symptomata, vomitiones, diarrhœæ tormentosæ, cholera morbus, colica, dolore lateris purtorii, tanquam pleuritici; ophthalmia; apoplexia, hemicrania; spasmi universales, vel particulare, dolores nephritici, &c. Item dolores parturientium æmuli. In fœmina quadam huiusmodi dolores; alternis diebus recurrentes; duobus vel tribus partu septimanis accedentes semel ipse observavi idemque ab alio observatum fuisse audiui. Et ( quod rarius adhuc videtur ) dolorem unius cruris periclitice revertentem in homine quadragenario semel in praxi adnotavi: dolor fuit vehementissimus per 24 interdum per 30. horas durans, unde ingens intumescencia totius membri superveniebat; tumor cruris erat quasi partim flatulentus & partim cœde-



atosus, qui nonnisi longo post tempore fasciatione ad  
 istinam dimensionem redactus fuit. Ambo hi egroti  
 rticè Peruviano sanati fuerunt.

Art. 103. Versatilis quidem est horum affectuum Curatio.  
 roteiformium genius, sed ab uno eodemque fer-  
 ento pendentes omnes, unica antidoto; nempe cor-  
 ze Peruviano; cum prudentia adhibito, facile pro-  
 gantur.

Art. 104. Nemo unquam a Febre intermittente in- Prognosi  
 rimitu; nisi in primo paroxysmi stadio; duran-  
 ; scilicet, algore ex spirituum oppressione or-  
 . Febres intermittentes; ubi valde chronicæ eva-  
 nt; viam sternunt ad alios morbos maxime fu-  
 stas

Art. 105. Sequens historia inter casus oppido Historia  
 uros merito recenseri potest. Paucis abhinc an-  
 s Vvincaunrionæ in agrò Somerssetensi mortuus  
 senex; Theologus, nomine Bulgin; hic an-  
 am agens trigésimum quartum in Febrem inter-  
 mittentem quotidianam incidit; quæ per totum  
 itæ cursum (dictu mirabile; verissimum tamen)  
 per sexaginta scilicet annos; usque ad vitæ in-  
 extrema senectute terminum, duravit. Febris  
 um frigore præeunte; calore & sudore succeden-  
 bus per diuturnum istud spatium, utcunque non  
 mper cum eodem seivissimo impetu, constanter  
 men, quotidie illum invasit. Postremo senio  
 otius quam morbo confectus nonagesimum quin-  
 em agens annum obiit. Hæc narratio a filio &  
 tia prædicti senis adhuc viventibus; fidei indubi-  
 tæ ambobus, renunciata est.

# FEBRES INTERMITTENTES cum Caro.

## Verboſe ſententia.

Carus  
cum in-  
termittentibus  
ſociatus.

Art. 106. **E**X tertianarum genere fuerunt omnes in quibus id quidem Febrium ſymptoma obſervavimus, vel obſervatum comperimus, ſimplices aliæ, aliæ paroxyſmo ſecundario adſcito duplices, quamquam *Galenus* ſoporem quotidianæ maxime proprium eſſe notat, & *Fureſtus* Carum ex quartana memorat. Tempus quo id contingit, in tertium primariæ acceſſionis paroxyſmum, ſive diei morbi quintum, ant ubi acceſſiones valde anticiparunt in quartum incidit: nonnullos ſerius afflixit. Fuit ſane hoc ipſius febris & paroxyſm ſymptoma, qui cum aliquo ſenſu conſuetorum motuum juſto tempore plerumque incœpit, ſtatim deinde interdum alias vero nonniſi ſenſim, & cum incremento acceſſionis ſopore illo accedente, & increſcente. Pulsus in plerique frequens. in unico per novem ante mortem dies continuos apoplectico tardiffimus, in quibſdam exantlati quidem tempore paroxyſmi, non autem ipſo affectu ſoporoso, naturalis, in multis durus fuit, & intermittens. Verbis ſanè *Eugalenus* ejuſmodi acceſſionem deſcribere licet: *profundo ſomno, caro ſcilicet correptu, abſque omni ſenſu ac motu jacuit, ut ne digitum haberet quem dimoveret, & ſola reſpiratione a mortuo differret*, hæc autem plurimis ore hianſe ſingultim, & cum ſtertore fiebat, quo maxime indicio apoplexiam a Caro, gradu ad illam proximo, dirimere ſolent. Auctores: *Nullis vellicationibus excitari atque revocari a ſe potuit, & ſi poſt vellicationes punſionesque, vel poſt phlebotomiam, ſcarificationes, ſternutamenta clyſmata acria, cauteria, leviter aliquando oculorum palpebras attolleret, ſtatim tamen ruſum ille conſueverant: interdum inæqualiter, ut altera ſemiclauſa appareret, vel manebant immotæ & apertæ ſine viſionis ſenſu. Idque malum quibuſdam in ſingulis febrium acceſſionibus recurrerebat, iis que deſinentibus ſponte ſolvebatur, etſi obtuſiores tum quoque ſenſu*

viderentur, neque plane integri, sed quodam quasi stupore præoccupati: paroxymo etiam deinde gravius an dies affligere solito. Nonnullis prima statim vel altera talis accessio exitio fuit. Aliqui evigilarunt quidem finiendi paroxysmi tempore, sed diutius longe, quam ante hunc laborantes, magis alii; alii minus: continue febricitantes, somniculosi, magno stupore, immo interdum veluti catoche, seu catalepsi affecti delirantes, anxie, & assidue micturientes, motibus vel haud voluntariis, vel anxiis jactati, dextro latere interdum, tanquam ad hemiplegia immoto, vel parum mobili. Hi vero sub ingressum novi paroxysmi, iterumque sopore iterum, immo sæpe apoplexia insanabili correpti, sub eo ipso vel quod paucioribus evenit, post aliquot demum dies, sensim exspirarunt. Complures mature satis advocato Medico, posteaquam medicina & tempore excitati fuerunt, melioris, & præcipue longioris remissionis, aut intermissionis participes facti, medicamentis generosis ab instante paroxysmo, & mortis periculo vindicati sunt. Pauci sine ejusmodi remediis, sponte naturæ, post toleratos aliquor paroxysmos soporosos, sub longo languore febris intermittens, variorumque symptomatum, vel convalescerent sensim, vel consumpti, aut relapsi, atque extincti sunt.

Casus.

*Art. 107.* Unicum mihi visum est exemplum in muliercula sexagenaria, quæ quidem extra accessiones aliquantulum, post externa remedia, sensum vigorem rem recepit, medicamenta vero nulla admisit, & nihilominus tandem, diu misere conflictata, rediit cum sanitate in gratiam.

*Art. 108.* Neque vero ullum ex remediis, quæ fe- Corticis  
brifuga audiunt, in tam ancipiti rerum statum, certum Peruviani  
satis fidumque comperimus, præter unum illum Corticem  
Peruvianum sive Chinchinam tantopere multis in  
invisam. Ejus vero virtus omnium manifestissima in  
restituenda subito æconomia corporis, horrendis symptomatibus per paroxysmos turbata, excitare potius ad  
rectum usum detegendum, vel confirmandum, & contra  
abusum muniendum, cordatos medicos deberet, &  
imperfectis de modo agendi ideis, ad vituperandum  
hoc divinæ providentiæ munus, & castrandam genero-



so præsidio materiam medicam febribus medentem seduci non patimur.

Modus  
usur-  
pandi.

*Art. 109.* Atque in hoc quidem, de quo scribimus, rerum statu pulverem corticis electi subtilissime tritum, in substantia, quod dicunt, longe quippe, ut in confesso est, & in vulgus notum, efficacissimis omnibus anteponi-mus præparationibus pharmaceuticis & chemicis, quas ipsi magni alioquin æstimamus. Exeunte igitur, & in inter-missionem, immo vel remissionem satis observabilem terminato paroxysmo, facta vel omiſſa pro indicanti-bus evacuatione, drachmam integram pulveris tertia, immo vel altera quavis hora exhibuimus, quocunque modo minime nauseoso deglutiri commode potuit, ut unicia una aut etiam amplius in accessionum interval-lis assumpta, vel penitus instantia symptomata averteret, vel minueret certe, & periculum amoliretur. Et lon-ge tunc profecto tutius major hæc, & repetita, quam exigua, & vano medicamento timore, refracta, & ra-ra dosis, aut nescio quibus correctionibus castrata, præ-betur. Quicquid enim metuendum est, id non a corti-cis particulis naturæ amicis, sed a pernicioſa materia morbosa est metuendum, si incassum imbelli remedio tentata fuerit, proximo forte paroxysmo jugulatum re-linquit ægrum, quem servare potuisset. De hoc morbo sane verum est, quod poeta de animo iracundo canit.

————— nisi servit,

Quam-  
diu con-  
tinuan-  
dus.

*Imperat: hunc frænis, hunc ut compesce catenis.*

*Art. 110.* Declinante accessione repeiendus est sta-tim cortex, nullaue alia medicina, nisi quid urgeat: interpolatus, in notabilium paroxysmorum intervallis tertia vel quarta quavis hora dandus, neque desisten-dum est prius quam paroxysmi fugati sint penitus, & æger cum sanitate in gratiam rediisse videatur: adju-vante optima diæta, & quam primum fieri potest moderato motu in aere liberiori, puriorique. Pulsu æquabiliter perpetuo bonus sit, lingua sana, urina qua-lis per sanitatem consueta, vel solito limpidior ali-quantum, & copiosior, appetitus naturalis, vel natu-rali, acrior, nullus dolor, nulla functionis turbatio quæ sub febris acciderunt, præsertim per intervall-paroxysmorum, affligat amplius, lassitudo corporis qua-

si ulcerosa, & cutis color febrilis evanuerit, antequam a continenti corticis usu desistas. Atqua hæc, si quid in arte certi est, certissime ita evenient intra unius plerumque, vel saltem alterius hebdomadæ decursum. — Imminui dosis periculo superato potest, sed non facile, his quidem in casibus. ubi vitæ periculum instans adfuit, infra scrupulum unum, vel drachmam dimidiam vel quantum fere æquipolleat decessi aut in-  
 usi ter, quater, quinquies, vel sexies; si fieri potest, quotidie assumendum.

### Heisteri Sententia.

Art. III. Speciatim vero *sitim*, æstumque nimium Ulterio  
febris  
& sym-  
ptom.  
tum cu-  
ratio. moderantur, ac simul sanguinem spissum attenuant, æ-  
 tremque temperant, partim *sufficiens potus aquosus*, ut  
 infusum Theæ, Coffeæ, veronicæ, card. bened. præ-  
 fertim in principio paroxysmi, aliaque similia: item  
*cerevisia tenuis* cum paucis nitro vel frustulis dissecti  
 citri adjectis. Vel præsertim in progressu paro-  
 xysmi, aut ejus declinatione, quando cum primis æ-  
 tri potum calidum averiantur, *decoctum hordei citra-*  
*um*, aut blande acidulatum, v. g. spir. sulph. vitriol.  
 vel syrup. citri, ribesior. berberis, vel cerasor. acid.  
 vel etiam aqua simplex pane tosto alterata cum vel si-  
 ne frustulis citri; vel syrupo acidulo q. s. ad gratum  
 saporem, vel aqua simplex cum paucis vino & sac-  
 charo, additis vel omissis citri frustulis; partim *mix-*  
*turæ diaphoreticæ* ex aquis destillatis temperatis, cum  
 pulveribus temperantibus, & leviter diaphoreticis; pro  
 materia vitiosa febrili cum corrigenda tum e sanguine  
 expellenda: ut Lap. cancr. antim. diaphor. aliisve  
 temperantibus jam *alibi* laudatis, addito syrupo quo-  
 dam grato ex modo laudatis. Quibus ita, una cum  
*lieta parca* & tenui, per aliquod tempus rite usur-  
 patis, hæc febres, præsertim vernaes, post aliquos pa-  
 roxysmos, intra quatuordecim dies, vel citius quam  
 optime sæpe solent profligari.

Art. III. Quodsi vero intra hoc tempus non fiat, Specifi-  
ca an-  
tifebri-  
lia. primæ tamen viæ bene prius purgatæ, & vitiosi hu-  
 mores ex parte correcti sint, tunc ad *specificæ anti-*  
*febrilia*, id est febrim peculiari virtute sistentia acce-  
 lia.

dendum est, qualia plurima laudantur, & inter hæc maxime *specificum antifebrile Crolii*, aut *Strobelbergeri*, itemque *Regulus Antimonii medicinalis*, aliaque similia terrea ad ℥j. bihorio vel trihorio aute paroxysmum exhibita, commendantur, Ita & *mixtura febri-fuga Crolii* ex aquæ cardui bened. un. ij. Sal. absynth. ℥. s. succ. citr. ℥iij. constans, vel in robustioribus ex Sal. absynth. ℥j. & succ. citr. ℥iv. aut Essent. absynth. ℥j. cum Essent. vitriol. ℥. sem. ante accessionem semel iterumque data, sæpe juvat. Præterea omnia *salia neutra* præcipue vero tart. vitriol. arcan. dupl. Sal digestiv. Sylv. Sal armoniacum, Sal antimoniatum &c. nec non *salia fixa* majori paulo dosi & sæpius exhibita febres has sæpe profligant. Quidam *alumen* vel per se ad ℥j. vel 3. sem. vel cum N. M. part. æqual. datum valde extollunt, sed ob nimiam adstrictionem, & inde metuenda mala, valde suspectum est; id quod & de *pulvere galarum*, qui a Gallis in Acad. Reg. ad ℥j. valde laudatur, sentiendum esse puto.

Nonnulli *piper* quoque præsertim phlegmaticis ad grana xx. & ultra; alii *piper hispanicum* vulgo dictum, ex spiritu vini aliquoties sumptum valde commendant, quæ vero ob fervorem nimium facile præsertim imbecillis nocent, & calorem præternaturalem, vel alia mala inducunt.

Alii *Nucem Vomicam*, & huic affinem *fabam S. I. gnatii* a gr. v. ad x. vel solam, vel cum aliis mixtam, & ante accessionem datam magnopere laudant; alii *vitrum antimonii*, immo ipsum *arsenicum* ad gr. j. vel ij. immo gr. iij. pro specifico euporisto habent; quæ vero tanquam violentiora & venenata, aut ad naturam venenorum quam proxime accedentia, non facile, & forte non nisi in casu uecessitatis, ubi securiora nihil præstarent, adhibenda. *Flores chanomeli* contra in decocto, quam in forma pulveris aut electuarii, larga dosi propinati, securissimi sunt, & multum sæpe in febribus hisce debelandis præstant. Ita & *radix pentaphyli* aut *Imperatorie* aut *gentiane* vel & *cortex cascarille*, vel cortices aurantiorum in pulvere vel electuario larga & sæpe repetita dosi, febres has egregie, & tuto sæpe tollunt. Id quod etiam non raro *crocus martis antimoniatum*; quem Stahlani valde



extollunt perficit, itemque *pilule Vvildegansis* dictæ. At si securiora ex his debitum effectum non præstant, sicuti sæpius cuntingit, aut certioris effectus causa omnibus illis tanquam minus certis uti nolumus, ne scilicet ægri nimis diu a febre torqueantur, *corticis peruviani* sive *chinæ chinæ* legitimus usus (licet multis adeo exosus sit, & multa obloquantur) intermittentes quascumque certo & tuto etiam profligar.

## De Gorter sententia.

Art. 113. Quæ medicamenta febris causam extinguunt *Antidota* vocantur. Febris vero continuæ causa, quæ Antifebilia. non fuit ex intermittente orta, nullo mihi cognito medicamento extingui potest, at vero in intermittentibus varia summa laude extolluntur. Quid non Riverius in suis observationibus prædicat de febrifugo suo ad gr. xx. exhibitò, quod alvum movet, & quandoque vomitum, quamvis præparationem alto silentio supprimat? Quibus encomiis non extollitur Sal Ammoniacum & ejus spiritus? neque *Gentiana* neque *Chamelum* auctoritate carent: Imò Alumen, aliaque adstringentia celebrantur. Omnibus tamen palmam præripit *Cortex Chinæ chinæ*. Experientia in his omnibus est consulenda. Si autem quis invenerit tutissimum & promptissimum, ægrotantium salutem confectare velit exopto. Ego vero in multis horum, licet omnem cautelam adhibuerim, raro felicem successum obtinui, nisi quandoque in sale Ammoniaco. Verumtamen nunquam tanto successu, quanto in Cortice Peruviano, hujus ergo usus paulo altius inquirendus.

Art. 114. Multa accepit hic Cortex nomima, omnium frequentissime cortes *China china*, vel *Kina-Kina* & *Peruvianus* ex arboris & regionis nomine. Cortex Peru. vianus. Item *pulvis Patrum* quia Patres e Societate Jesu Romæ pauperibus gratis eum largiebantur; etiam *pulvis Cardinalis de Lugo*, quia primus ex India in Hispaniam eum transtulit.

Art. 115. Crescit hæc Arbor in America Peruviana circa Loxam in montis cacumine, non valde prosera est, ornatur floribus albis & cœruleis, foliis inter prunorum, & seminibus quasi cucurbitæ; neque

in his, neque in ejus transfundante resina tanta vis febrifuga invenitur, quanta in cortice.

**Electio.** *Art. 116.* Egligendus recens, vegetus, non admodum crassus, a ramulis derasus, facile terendus, odore peculiari grato, saporeque aromatico amaro, atque colore cinnamomi, præditus.

*Art. 117.* Inclaruit ejus virtus primo in Regno Peruviano 1616. brevi post iterum suppressa, at majori studio exulta iterum 1648. multa tamen passus est dein fata, quæ lites hucusque nondum composita sunt.

**Ufus.** *Art. 118.* Usus Corticis primarius est in febribus intermittentibus puris, atque symptomatibus obstinatissimis ex febre intermittente productis; atque etiam in febribus continuis, ex causa intermittentium naris: Extinguit enim febris intermittens causam, sine sensibilis evacuationis augmento, verum omnibus ex phænomenis insensibilem perspirationem augere videtur, qua via forte subactam materiam educit, quum aliis in evacuationibus nullum præbeat indicium. Si vero simul hæreat cacochylia in primis viis, ea primo purgante, vel emetico educenda, si plethora urget, venæ sectione minuenda, sed tunc statim exhibendus, priusquam vires detrita non possent in actum ducere medicamentum; quando frustra sæpe præscribitur, majori dosi exhibendus, ut observatio docuit.

*Art. 119.* In aliis præterea morbis quandoque, sed tamen minus certe, multa præstat, ut in debilitato tono solidorum, hysteriis, hypochondriacis, ventriculi inapetentia, atrophia ex nimia humoris evacuatione, chlorosi, Leucophlegmatia, hydrope, vel podagra enervatis; epilepsia, & convulsionibus istis, quæ ex inanitione excitantur, hemicrania, aphtis, & singultu in fine febris, si in longum tempus protrahantur, atque omnibus symptomatibus a febre intermittente relictis, egregium etiam inter roborantia, sua leni adstrictione, & amaritudine meretur nomen.

*Art. 120.* Prudens vero Medicus ejus usum intermitteret aliquandiu, si ipsa febris intermitens inveteratum malum expellere possit; aut si aliquid prius sit educendum. Quando etiam coacti sumus ob vehementiam febris statim exhibere corticem, & dein educere hu-

humorem malignum, summo cum successu; prestat enim mutare methodum, quam ut, nimis religiose servata Methodo, pereat æger.

*Art. 121.* Ejus usus non modo suspectus, sed e-Abusus. tiam damnandus in febribus symptomaticis, humorum putredine, acrimonia scorbutica, pure latente, melancholia biliosa, cacochema, bile acri adusta, inflammatione, erysipelate, multisque febribus epidemicis, & pestilentialibus, ab acri inquinatone, atque in omnibus febribus acutis continuis; febris enim intermittens causam, non vero continuæ extinguit.

*Art. 122.* Antequam exhibetur, non est opus ulla præparatione, nisi in primis viis hæreat cacoehylia, quæ educenda est; omnes enim evacuationes, aliaque, quæ corpus debilitant, actionem hujus febrifugi minuunt; si cero alvus nimis laxa sit, vel vomitus urget, compescenda prius; ingressum enim corticis in vasa lactea impediunt.

Præparatio corporis.

*Art. 123.* Tempore Apyrexix, vel quando ea adesse debebat, incipiendus, & continuandus singulis vel alternis horis ejus usus ad semidrachmam vel ultra pro dosi, donec redeat paroxysmus; continuandus finito paroxysmo, donec cedat febris, quæ quandoque uncias duas, vel tres exigit, præprimis si corpus fuit debilitatum, vel si quartana in continuam fuit conversa: verum tertiana quandoque drachmis duabus cedit. Licet unica vice ad unciam sumatur, nulla inde fuit facta molestia, & tamen sine recidiva curata fuit quartana, & plusquam semel vidi in ægris, qui suo periculo una vice integram quantitatem, partitis vicibus assumendam, devoraverant, ex quorum imprudentia didici, non opus esse, ita timide dosin definire. Verum in aliis morbi §. 100. sufficit, si quotidie ad semidrachmam vel drachmam unam assumatur. Hoc tempore non est opus, æger rigidissima inedia vexetur, aut calidiori regimine, imo jugis decubitus in lecto remoratur operationem; sed commendet modo alimenta facilis digestionis. Nihil præterea addendum cortici, nisi aliquod symptoma talia exigit. Sæpe addere debemus anodynum, vel adstringens, quia alvum quandoque laxat: verum purgantis admistio ejus minuit vi-

Exhibendi tempus & dosis.



res. Præscribitur omni forma : pilularum, electuarii, infusionis, decocti, clysmatis. Sed simples dosis in substantia tantum valere solet, quantum duplex in infusione.

Quid  
postea  
agen-  
dum.

*Art. 124.* Fugata febre nihil moliendum; nisi quod continuetur per mensem quotidie assumere semidrachma ejusdem corticis aut unica per 14. dies, ita enim metus recidivæ enanescet. Si purgante vel vomitorio vexetur æger, brevi a febre curatus, ut plurimum febris recidivat. Quia vero curata febre ut plurimum nimis augetur appetitus, cavendum est, ne æger se alimentis repleat, sed modicam servet diætam. Ita tuto, & felicissime curatur febris, sine recidivæ periculo.

### Farrago sententiarum.

Causa  
proxima  
feb. in.  
termitt.  
tentium.  
Galen  
metho-  
dus in  
quarta.  
na.

*Art. 125.* Post accuratum examen totius historiæ Febrium intermittantium causa proxima constituitur vitæ scositas liquidi arteriosi, superveniente dein causa quantunque velocioris, & fortioris contractionis cordis, atque resolutionis ejus, quod stagnerat. *Boërhaave.*

*Art. 126.* Galenus hac methodo curavit quartanis; primo propinavit vomitorium, die sequenti dedit succum absynthii bibendum, & denique bihorio ante paroxysmum dedit theriacam. Sed his adminiculis tuto inniti nequimus. Febris tertiana veteribus, quibus vires antidoti Peruvianæ ignotæ fuerunt, curatu erat valde difficilis, quartana opprobrium medicorum audiebat; at hodie secus esse nemo non noscit: quo enim longius recedunt intermittantium paroxysmi a natura Febrium continuarum, aut quo majus est intervallum inter accessiones, eo minus periculi ab illis impendit, quoniam amplius, est locus commodiorque curationis.

Epithe-  
mata,

*Art. 127.* Epitheinata & pericarpia quandoque profunt Febribus intermittantibus abigendis; ejusmodi est Emplast. febrile pro carpis D. Michaelis ℥. Fulig. furni splendent. ʒiſ. terebinth. ʒvj. tel. araneæ. ʒss. camphor ʒij. ol. scorpion. q. s. m. f. emplast. pro carpis Mortonus duo sequentia ex propria experientia commendat. ℥. Pulv. oliban. terebinth. tenet. anap. c. f.

*æ. f. pericarpia. ℥. Fol. chelidon. maj rutæ ana m. j. fuliginis e tignis combustis, sapon. venet. salis marin. ana p. æ. cum aceto acerrimo f. massa, &c. Empl. rubrum febrifugum sequens scrobiculo cordis applicatum in tenellis infantibus frequenter prodesse deprehendi. ℥. Thur. subtilissime pulv. ʒv. minii ʒj. olivar. q. f. f. empl.*

Enema

*Art. 128. Qui corticem Peruvianum ore assumere pertinaciter respuunt, curari possunt cum enematibus ex ejusdem decocto; istiusmodi est enema febrifug. Fuleri, sed pueris certius solet opem fere quam adultis.*

Ad algorem.

*Art. 129. Dum febrilis horror, aut frigus universam cutim convellit, tum oleum destillatum caryophyllorum epigastricæ regioni illitum remissionem horroris undequaque procurat. Baglivius.*

Vire. succi limo. num.

*Art. 130. Ansam mihi suppeditari autumabam, aliquid ad artis nostræ incrementum ediscendi, idque aliquoties tentas, non infeliciter processit; in Febribus scilicet intermittentibus, circa initium paroxysmi, hausto calido succi limonum cum saccharo & aq. fontan. tantum semel atque iterum exhibito; exacerbationes vel in totum cessasse, vel saltem in dies præter expectationem simul cum siti deferuisse, & intra paucos dies plane siluisse, deprehendi, subsequente utique manifesto effectu, urinæ scilicet, & imprimis sudorum larga promotione. Piso p. 315.*

Specifica alia.

*Art. 131. Sunt & alia nonnulla remedia a quibusdam plurimum decantata, tanquam Feb. intermit. specificè curantia. Nempe pulvis corticis interibris fraxini a ʒj. ad ʒj. cum paulo sale absynthii in vehiculo idoneo exhibitus, more cortici. Peruv. vires ejusdem adæquare, immo superare, dicitur; felici cum successu sæpe exhibuit doctissimus & insignis medicus D. Hen. Vaghan. Idem perhibetur de cortice ulmi prope radicem. Flores salis armoniaci optimum febrifugum censentur, præcipue in Febribus intermittentibus. De quo remedio audiatur clarissimus Boerhaave: non novi (inquit ille) melius febrifugum quam gr. xx. salis armoniaci in calido haustu, una vel duabus horis ante paroxysmum. Succus rad. gentian. inspissatus, & in vehiculo appropriato cum myrrha assumptas propter ejus vim febrifugam non immerito usurpari*

potest ad instar cort. Peruvian. cujus succedaneum fere est ( inquit Ettmullerus . ) Sed forsā *cortex radice pruni sylvestris*, i. e. *spinæ nigræ* vulgo appellatæ, est adhuc præstantius medicamentum, quod olim honorandus D. Sloan in literis mihi datis communicavit. *Camphora* est remedium diaphoreticum nobilissimum, & omnium adhuc notorum certissimum. Insignis est ejusdem usus in curandis Febribus intermittentibus, & viribus corticis Peruviani magnopere opitulatur.

**Recidi-**  
**variationis**  
**præca-**  
**tio.** *Art. 132.* Unicum hic, quod multa experientia dici, in bonum comune evulgari volo de *Recidivatione* præcavenda; nimirum, Febre cortice Peruviano prius fugata, cui penso istius remedii unica vel ad lummum sesquiuncia semper sufficit, inter triduum vel quatrimum propinare soleo *medicamentum aliquod chalybeatum*, & huic operi levissimas præparationes eligo, & in hunc fere modum præscribo. *℥. Vin. chalybeat. pharm. Londinens. ℥ij. tinctur. stomach: amar. Quincii ℥ij. vel iv. misce dosis coch. iv. vel v. bis in die, vel loco hujus infusum chalybeatum amarum sequens. ℥. Limatur. ferri ℥iv. succ. limon. N. iv. aurat. acid. N. vj. infund. per hor. 24. deinde add. rad. gentian. ℥j. aristoloch. rotund. ℥j. cort. v. v. winteran. rad. calam. arom. ana ℥ij. summil. absynth. centaur. min. ana p. j. vin. alb. ℥iv. aq. gent. comp. ℥ij. infund. frigide per septimanam, & decantetur pro usu. Vel. ℥. Flor. sal. ammoniac. martiat. ℥ij myrrh. elæ. ℥j. rubig. ferri ℥ij. extract. rad. gent. q. s. m. f. pil. med. dos. iv. bis in die, superbibendo infus. stomach. amar. sequent. ℥. Rad. stomach. zedoar. cassumuniar. ana ℥ij. cort. stav. aurant. amar. Hispalens. ℥ij. sem. cardamom. min. ℥j. summit. absynth. Rom. p. j. infund. in aq. bullient. ℥j. coletur frigide. Atque ita ventriculo optime consultum est, ut res in vado sit; Febris nullatenus recrudescit, nisi ex gravi aliquo sex rerum non naturalium errore. Interdum in casu ancipiti, & in corporibus valde debilitatis *chalybs* & *cortex Peruvianus* junctim maritati melius cedunt, quam alteruter eorum seorsim exhibitus: in hunc finem decoctum nigrum sequens est remedium appropriatum: *℥. Cort. Peruv. pulverisat. ℥ij.**

**Deco-**  
**ctum ni-**  
**grum.**



℞ij. *chalyb. cum tart. præp.* ℥j. *coq. in aq. font.* Tinctu-  
 ℥iij. *lento igne ad 15i . . addendo sub finem conditionis* ra bur-  
*cinnam. acutissim.* ʒij. *colatur. add. aq. absynth. ma-* gundi-  
*gis comp.* 15j. *in vel in magis delicatulis vinum cha-* ca.  
*libeatum prædict. in tinctura sequens usus tempore*  
*commista; dosis ad coch. iij. ʒl. Cort. peruv. pulve-*  
*risat. ʒx. calam. arom. cinnam. ana ʒj. cort. aurant.*  
*ʒij. cochinel. ʒss. macera per biduum in vin. alb. U-*  
*lissiponens.* ℥iiss. *filtratur, &c. hanc ob venustum co-*  
*lorem tincturam Burgundicam vocant.*

*Art. 133.* Febre profligata victus paucus ac tenuis, medicamenta amara, stomachica, & roborantia adhuc aliquandiu sedulo continuanda, haustulus vini generosi in pastu usurpandus, frigusque diu vitandum, & ne moribus hic, quod ei alias solemne est, facile recrudescat, præsertim si jam antea pertinacioris fuit indolis, aut jam sæpius recruduit, bis terve in die portio aliqua corticis chinæ vel cascarillæ, & quidem in tertianis curatis post octiduum a superata febre, in quotidianis vero & quartanis tertia quavis, post debellatam febrem, hebdomada salutariter usurpanda, subjuncto, tempore idoneo, motu corporis moderato, & præsertim ambulatione, aut equitatione; aut unctione frequenti.

*Art. 134.* Si ægri *Sudores* in paroxysmi declinatione oriundi refrigeratione corporis impediuntur, ii augment lassitudinem corporis, morbum protrahunt, & varia insolita æque sæpe gravia hoc ipso symptomata excitant & febres Ieves facile in lentas periculosissimas hecticam, cachexiam, oedemata, asthmata, hxdropem, aliosque, pessimos morbos transmutant, quæ mala sæpe infanti Cortici Peruviano, sed falso adscribuntur.

*Art. 135.* Frigus nimium in paroxysmo quarundam febrium, & præsertim quartanarum lenitur calore lecti, potu calido, balsamis stomachicis, & aromaticis, ventriculo ac spinæ dorsæ calide illitis; item spiritu vini rectificato, linteis complicatis calide ventriculo impositis, stragulis sufficientibus, lapidibus, aliisque machinis calidis pedibus sepositis.

*Art. 136.* Febre debellata si c-bi desiderium dietius deficiat Rec. Vitrioli Martis Ludovici; aut Elixir vitrioli Mynsicht bis terve in die ad gutt. 50. sum-

sumpta egregie profunt, interpositis lenibus purgantibus.

*Art. 137.* Oedemata post intermittentes, ut sæpe vel ob potum nimium, vel ob sudorem impeditum relicta, frictionibus, motu corporis, exercitationibus, salibus digestivis, atque essentiis, itemque infusis amaris, cum vino, aut cerevisia paratis, præsertim ex cardo benedict. summit. absynth. bacc. junip. cort. aurant. & cascarill. immo & ipsius chinæ chinæ curantur, interpositis subinde remediis martialibus, lenibusque laxantibus, atque observata simul tenui ac parva dieta, & vitato potu nimio.

*Art. 138.* In febribus intermittentibus senum, soporosis dictis, ubi ægri altero vel tertio paroxysmo in soporem gravem, aut tertio vel quarto paroxysmo in apoplexiam lethalem incidere solent, ut præstantissimi practici observarunt, mox post paroxysmum, quo sopor ille accessit, cortex peruvianus sæpe & larga dosi est exhibendus, ut sequens paroxysmus avertatur; alias ægri plerumque in sequenti paroxysmo apoplectici moriuntur. Confer hanc ob causam utilissima scripta celeb. Itali Torti & VVerlhof. nostri de febribus. *art.* ( 106. )

*Art. 139.* In febribus inveteratis aliquandiu salia, vina medicata amara, & pilulæ amaræ balsamicæ, interjectis purgantibus, sunt usurpanda antequam specifica sive sistentia exhibeantur.

*Art. 140.* Quoties ex quartana hydrops oritur, nullo remedio melius uterque curatur morbus, quam cortice peruviano, tam in substantia, quam in infuso recte exhibito. Conf. Filli Dissert. de quartana, & hydrope per corticem Peruvianum curatis an. 1740. Helmstadii editam. *Heisterus.*

## FEBRES REMITTENTES.

## Mortoni sententiæ.

Art. 144. **F**ebbris  $\sigma\omega\epsilon\chi\eta\varsigma$ , continens sive remittens Typus febris remittentis simplicis.  
 Ex manifesta *exacerbatione* & *remissione*, singulis ut plurimum, vel alternis, diebus, statuta & certa hora, periodice recurrentibus facillime dignosci potest, atque equidem ab intermittente induntaxat discriminatur, quod calor febrilis in intervallis hujus Febris nunquam penitus extinguatur, & singuli exacerbationis paroxyfmi cum algore & horrore minoribus incipiant. Sub finem cujuscunque paroxyfmi æger sudoribus plerumque perfunditur, & urina, quæ durante paroxysmo rubedine multa perpetuo tingitur, in remissionibus hypostasim laudabilem ut plurimum deponit. Atque sic se habet typus Febris remittentis simplicis.

Art. 142. In Febre vero remittente *spuria* gravia Symptomata in genere nervoso suboriuntur, nempe: dolores in musculis, tendinibus, & membranis, rheumatismum, pleuritidem, colicam, ceterosque id genus morbos inflammatorios, & spasmodicos simulantes; & a patribus glandulosis enormes subsequuntur humorum excretionem; vomitio scilicet immodica, cholera morbus, diarrhœa, dysenteria, &c. unde typus  $\sigma\omega\epsilon\chi\eta\varsigma$  *spuriæ* multum obscuratur: paroxyfmi periodici inde incerti, & nonnunquam sæpius eodem die recurrere solent: scilicet evacuatione, vel dolore aucto, calor, & pulsus minuantur: his autem diminutis illi augeatur. Spuria.

Art. 143. Febris remittens simplex, qua talis, Prognosis.  
 & quamdiu talis, raro admodum, si unquam est funesta; priusquam exitialis evadat, typum ac genus suum mutat, & transit in *malignam*.  
 Spuria vero sive mixta, ut in se non sit funesta, ratione symptomatum adjunctorum ægrotantes haud raro evivis toilit. Quo exacerbationes, & remissiones diei hora magis certa redeunt, & quo remissiones magis sunt protensæ, eo melius, & vice versa. Evacuaciones in  $\sigma\omega\epsilon\chi\eta\varsigma$  a natura institutæ fere semper sunt



sunt *infidæ*, arque ut plurimum *symptomaticæ*: Evacuatio critica, & salutifera fit solummodo *per sudores*, vel *salivationem*; prior est magis cita; altera vero æque certa, licet tarda & molesta. Durante morbi augmento pessimum signum est, si urina sensim in tenuem, & pallida mutetur, & pulsus magis celer, debilis, ac vacillans evadat, &c. e contra pulsus fortis, & constans, urina rubedine multum tincta, & contentis saturata, multo magis, quæ hypostasim laudabilem deponit, ubi morbus adistatum pervenerit, optimum præsagium exhibet, ut ut reliqua symptomata contrarium prognosticon denunciare videantur.

*Art. 144.* Febris remittens simplex viribus corticis *Curatio.* *Peruviani* æque certe cedit, ac ipsa intermittens; quippe fermentum febrile in utraque fere idem est. Efficacia ejusdem Antidoti in *tales* spuria debellanda est propemodum æque certa, ac in simplici (modo rite ministretur, respectu ad symptomata vehementia habito) non autem adeo cita est, quoniam morbus est intensior, ideoque majorem remedii quantitatem postulat; in iusta autem ac regulari hujusce antidoti exhibitione, atque repetitione, harum Februm cura radicalis consistit.

*Duratio* *Art. 145.* *Curacionem symptomatum maxime urgen-*  
*debet* *tium quod attinet vel potius mitigationem, in his sicut*  
*esse alia,* *in aliis febribus, alibi (Articul. 63. &c.) dictum*  
*si febris* *fuit. Interim saterit in præsentiarum adnotare, quod,*  
*typum* *si quando Febris remittens, vel ex peculiari morbi*  
*mutave-* *genio, & indole, vel ex errore aliquo typum muta-*  
*rit.* *verit, & in continuam vel malignam migraverit,*  
*curacionem tunc prorsus aliam exposcit, ut infra vi-*  
*debitur.*

## FEBRIS CATARRHALIS.

Benigna seu lymphatica acuta.

*Art. 146.* Febris hæc ad continentes sive remittentes spectat, ut ejus invadendi forma ostendit, quæ plurimum ad quotidianam continuam accedit. Sed quas *Mortonus* continente febres vocavit, has *Jun-*

*ckerus* continuas facit, ideo parum solliciti de vocabulis ipsam rerum naturam prosequamur.

*Junckeri sententia.*

*Art. 147.* Invadit hæc febris plerumque circa vespertas tempore æquinoctii præcipue autumnalis. Præcedunt vel statim junguntur gravedo, aut coryza, raucedo, molestia deglutitionis immo intra collum erysipelacea quasi constitutio; prægravatio pectoris, tussis satis quidem violenta parum tamen excernens & per totum morbum fere durans universi corporis languor. Invadit autem hæc febris, frigore horrido, immo rigore, præcipue vero tensivis doloribus in dorso.

*Febris  
cate-  
rhalis  
signa.*

*Art. 148.* Durat hoc frigus per dimidiam circiter horam, aliquando integram, raro ditius; & calor succedit protinus satis quidem lenis, cum angustia tamen, & anxietate circa præcordia conjunctus; quæ circa præcordia pathemata in paucissimis tantum subjectis nauseabunda, aut vomibunda observantur. Durat hic æstus pro gradu plethoræ per horas bene multas; ita ut primis paroxysmis vix altero mane notabiliter tepescat.

*Art. 149.* Pulsus est celer, & frequens, appetitus & vires labefactatæ, somnus imminutus, caput est magis debile quam dolens. Ad diarrhæas hæc febris valde inclinât, interdum accedunt vomitus; sudores quoque tempore matutino æstum excipientes febrem sensim mitiorem reddunt, ac catarrhales hos morbos infringunt; elapso tamen primo vel secundo septennario febris cum symptomatibus cedit. Urina demum præter colorem aurantium febribus acutis familiarem hoc peculiare habet, quod pauca mora tenuissimam cutem vitro subtiliter adhærescentem ostendat lacteoliventis coloris cum sedimento roseo pallido.

*Art. 150.* *Hippocrates* jam observavit a fluxione ejusmodi materiæ acris causticæ in pharyngem præcipue, oriri raucedines, cynanchas, erysipelata, peripneumonias, & quamdiu materia in tali intemperie existat; perdurare talia pathemata; si vero spissescat, & concoquatur, illa minui, & febrem solvi.

*Pro-  
gnosis.*

*Art.*

*Art. 151.* Nisi ergo mature & placido fucceſſu , materia hæc ſenſim abſtergatur , & diſſipetur , ulceratio ſanioſo ichoroſa ſuccedit , quæ prompte in ſpha-celoſam , & ſuneſtam putredihem ruere ſolet ; id quod ſatis confirmant ulcera illa externa , ex diuturno eryſi-pelate vel phlegmonibus non diſcutiendis oriundà , quæ licet topica præſentiora admittant , peſſimam tamen indolem exhibent .

*Art. 152.* Quo acrior igitur inflammatoria ſtaſis ſub-  
beſt , eo propior diſto eventui exiſtit .

*Art. 153.* Quo magis autem febris *ſimplex* & *be-nigna* catarrhalis dici meretur , eo longior ab hoc e-ventu diſtat ; magis autem in lentas , & heſticas fe-bres propendet , præcipue quando nimis abſorbentibus , & refrigerantibus tractatur .

*Art. 154.* Indoles hujus febris non eſt , ut *apoſtaſes* formet , ſeu materiam ſemel reſolutam extrinſecus in locum arctiorem cumulet , uti hoc in parotidibus , & an-gina contingit . Quando autem per intempeſtivas artis commotiones aliquid extrinſecus protruditur , adparentes tales *apoſtaſes* pro criticis excuſſionibus vulgo vendita-tæ , genio huic feбри proprio non debent imputari .

*Art. 155.* Multo lenius adhuc decurrunt *febriculæ* illæ catarrhabus adſines , quæ hyeme tepida repentinis tumoribus e. g. glandularum ſub auribus , tonſillarum &c. ſuperveniunt .

*Art. 156.* Ceterum quam benigna etiam ſit hæc fe-bris catarrhalis , eſt tamen contagioſa , uti & ipſi catar-rhi tenuiore , & coryza ejusdem indolis eſſe observan-tur . Quo magis autem contagioſa reperitur , eo cer-tius petechiæ complicantur .

*Art. 157.* Diarrhœæ , quando ſub initium acce-dunt , minuunt imperium morbi : in ſtatu quæ ſuper-veniunt , ſi moderatæ , & indolentes exiſtant , non a-deo ſunt periculofæ . Alvi autem adſtrictio hic æ-que ac in petechialibus purpuratis nocentiſſima eſt , & præcipue in ſtatu , deliria , comata , convulſiones inducit .

*Curatio.* *Art. 158.* Indicatio eſt , ut vitium lymphæ io-muco , & tenacitate conſiſtens corrigatur . Reſolvunt lentorem , ( 1. ) Radices catarrhales alexipharmaco-  
diu-



liureticæ: præcipuæ rad. pimpinellæ albæ, vincetoxi-  
ci, ari, helenii, Imperator. Angelic. ( 2. ) Essent.  
alexipharm. ex. gr. *Stablii*, tinct. antimon. tartari-  
zat. ( 3. ) salia colliquantia digestiva e. g. arcan. du-  
plic. tart. vitriol. nitrum antimoniatum.

*Art. 159.* Motus febriles secretorii, & excretorii  
eundem finem respicientes prudenti ratione sunt ad-  
juvandi; cui scopo antifebrilia temperata ex. gr. es-  
sent. alexipharm. *Stablii*, mixtura simplex, pulvis be-  
zoardicus ex nitro, antimon. diaphor. ocul. cancr. a-  
cid. citr. saturat. & sale digestivo satisfaciunt.

*Art. 160.* Tussis sicca tuto est mitiganda: in quem  
finem conducunt ( 1. ) Antifebrilia modo commenda-  
ta. ( 2. ) Liquiritia cocta, syrup. violar. de erysimo  
*Robelli* ( 3. ) Emulsio ex amygdal. vel sem. card. be-  
ned. mariæ, parata. ( 4. ) Mucilago hordei, avenæ,  
( 5. ) ol. amydal. ( 6. ) Trochisci becchici.

*Art. 161.* Alvus semper aperta est servanda ( 1. )  
per diætam liquidam ex prunis, passulis, pomis, ( 2. )  
per potum sufficientem tepidum, ex infusis thee, ve-  
ronicæ, tussilag. teucris veri, ( 3. ) per clysteres e-  
mollientes cum stimulo salino ( 4. ) per pilulas *Sta-  
lianas*, vel *Beccherianas* mane exhibendas.

## FEBRES ACUTÆ STOMACHICÆ,

et intestinales, a quibusdam mesentericæ dictæ, a  
nobis autem malignæ remittentes.

### *Heisteri sententia.*

*Art. 162.* A plerisque hæc febres ad malignas re-  
vertuntur, quia inusitata quædam ac gravia, vel mox  
in principio symptomata ipsas comitabantur, vel per  
rationem consuetam diaphoreticam, & potissimum  
odoriferam eas insequiebantur, qua plerisque ægris  
træcordiorum angustia; anxietates, dolores circa  
ventriculi regionem, virium prostratio, deliria, e-  
ructationes varia, & præsertim petechiæ aut purpu-  
ra inducuntur; & in ipsum tandem vitæ periculum ii sæ-  
pe conjecti sunt.

Ad ma-  
lignitas  
relatæ.

De no-  
minibus  
earum .

*Art. 163.* Febres autem hæ in primis viis : hoc est in ventriculo , & intestinis potissimum ; sedem suam habere videntur . Nonnulli easdem mesentericus appellarunt ut *Baglivus* , & speciatim *Burchardus Medicus Rostochiensis* . *Sydendhamus* summus ille Medicus similes quoque febres . descripsit in tractatulo de novæ febris ingressu .

Species  
februm  
huc spe-  
ctanti-  
um .

*Art. 164.* Manifeste igitur ad hoc genus pertinent dysentericæ , & petechiales sive petechizantes ; aliæve congeneres , ad malignas vulgo referri solitæ : præterea febres nonnullæ catarrhales dictæ , itemque continuæ quotidianæ , & quam maxime tertianæ , ut & febris semitertiana sive hemitritæus , quo nomine a Veteribus eæ intelligi solent , ubi ægri vel quotidie , vel tertio quovis die novam accessionem sive horrorem ac postea calorem experiuntur magis intensum , & ubi sæpe , quando corpus in lecto commovent , horrore quodam afficiuntur , unde & *pavores* id est *horrificæ* veteribus dictæ sunt , atque *semide* & *hemitritæi Hippocratis* synonyma sunt , quas veteres rursus pro symptomatum varietate in plures alias ut *Typhodem* , *Affodem* , *Elodem* , *Epialam* , & *Lypiriam* subdiviserunt : quæ vero essentia omnes conveniunt , sed symptomatibus tantum nonnullis differunt .

Earum  
diagno-  
sis .

*Art. 165.* Sunt itaque omnes hæ febres tales ( 1. ) ut ægri eis correpti per vices horreant , sed incerti temporibus ( 2. ) *dentes* , *lingua* , & *fauces* viscida & spurca pituiti , ac speciatim *lingua* squalore sæpe luteo , fusco , vel nigricante , ipsis obsitæ sint , ita ut adstantes plerumque fœtorem oris , ægri vero ipsi adversum *saporem* gustu inde percipiant ( 3. ) *alvus* fluxus ut plurimum adest , & excrementa , quæ per anum ejiciuntur fœtorem sæpe pessimum spirant ( 4. ) *hypochondria* tensa sunt , & sæpe simul valde dolent ( sine dubio a copiosis , & turgentibus humoribus noxiis in ventriculo , & intestinis contentis ) ( 5. ) *pavores* frequentes in somno incidunt , ut propter eam dormire aut quiescere nequeant , qui sensibilibus etiam vigilando haud raro sunt molestissimi ita ut ex levissima sæpe causa concutiantur . &c .



hementer expavescant: atque hos pavores in febribus  
tis quibuscumque, haud sine ratione, pro certior  
indicio habet *Burchardus* mineram febris in intestinis  
rere, quæ etiam ratio esse videtur, quare tunc  
febres *Hippocrates* terrificas dixerit, atque multo  
que præfagii habuerit ( 6. ) *dolores* quoque plerumque  
sunt *capitis*, & *cervicis*; a spasmis, ut videtur  
( 7 ) *urina* initio morbi ut plurimum naturali similis ( for-  
te quia tunc causam morbi nondum est in sanguine ) in  
progressu turbida est, ac limosum sedimentum deponit,  
quod sæpius ita usque ad finem durare solet.

Art. 166. Adfunt quidem sæpe adhuc alia signa, prognos-  
is. quæ vero non tam febres; hæc; quam potius gra-  
vem; & periculosum earum statum, si adfunt; indi-  
care solent; qualia ( 1 ) sunt summæ præcordiorum  
anxietates ( 2 ) dolor ventriculi aut lateris unius  
circa hypochondria acutissimus, pleuritidem mentiens  
( 3. ) vires valde prostratæ, & lypothimiæ ( 4. )  
ardor interne, sed externe frigus ( 5. ) motus manuum  
remulus, subsultus tendinum; mens vacillans, sin-  
cultus; floccorum collectio, & sudor frigidus, quæ  
ultima simul materiam morbi malignam atque sum-  
mum vitæ periculum indicant, atque simul ex his in-  
dicii peti potest præfagium.

Art. 67. Sunt & quædam symptomata hisce fe- Sympto-  
ribus familiaria, quæ vero proprie non ex natura mata  
arum, sed potius & plerumque, sicut in aliis mul-  
as, ex malo ipsarum regimine, ac presertim nimis  
alido vel sudorifero, dum scilicet eo ipso, ut su-  
ta jam dictum est; materia vitiosa ex intestinis ad  
anguinem ac partes nobiliores propellitur, sed exha-  
re forte a sanguine in cute ob spissitudinem vel  
liam rationem nescia, hinc inde in ea hæret, & ma-  
ulas aut papulas rubicundas; aut lividas producit,  
quo casu tunc febris petechialis, vel purpurata dici  
onsuevit; vel si ad aures interne deponitur, surdi-  
tem sæpe producit; vel circa glandulas parotides,  
el maxillares; atque ibidem tumore, inflammationes,  
abscessus pessimos concitat; si ad cerebrum trans-  
rtur deliria, & phrenitidem; atque sic prout in par-  
m corporis magis, vel minus nobilem impellitur.



diversa necessario mala, & pericula: ut pleuritidem & peripneumoniam, hepatis; lienis, ventriculi, intestinorum &c. inflammationem producit; quæ diversissimam causam, & morbum diversum indicare videntur, licet revera unus, idemque sit morbus, & una eademque causa, atque vix nisi loco affecto, malisque accidentibus inde oriundis, differat.

*Art. 168.* Quare si hisce in malis alvi fluxus supervenit, isque per medicamenta cohibetur, ægri in pejus ruunt; quia materia noxa excernenda cohibetur, sed si sibi relinquitur, dum causa primaria in intestinis hærens sic e corpore expellitur, morbum plurimumque minuit, aut omnino solvit — Hinc *Duretus* antiquo medicamento purgante *hiera picra* dicto per aliquot dies in hujusmodi casibus felici cum successu usus est, cujus primum ingrediens est aloë, quod & *Baglivius* hic valde commendat; ideoque & alia aloetica blanda remedia; ut pilulæ *Frankfurtenses*, *Immanuelis*, vel *Becherianæ*, hisve similes, vel alia idonea aloetica compositio hic adhiberi poterunt. Alii decocto, vel rhabarbari, cum aut sine manna untuntur; vel horum loco apte quoque tinctura, sive anima rhabarbari ad morem *Degeneri* ad cochleare j. vel ij. per intervalla dari apte potest, infantibus vero gutt. 20. vel 50. *Burchardus* sal anglicum purgans hic laudat, ejusque .j. puerperæ cuidam optimo cum successu exhibuit, quo sexdecim secutæ sunt sedes cum perfecta febris hujusmodi intestinalis solutione, adeoque; & aliis cum fructu dari potest. Alii ægro mannam cum cremore tartari, & nitro feliciter dedere. Ego sæpius potiuncula ex leni decocto tamarindorum, & foliis *fennæ* cum manna, feliciter usus sum, vel & anima rhabarbari vel etiam pulveris rhabarbari ℥j cum nitri ℥ sem. vel in mulieribus ubi forte menses instant pilulis etiam *Becherianis*: hisque & similibus evacuantibus dolores ventriculi, & hypochondriorum, itemque præcordiorum angustia ægrie tolluntur. Cum itaque evacuantia ejusmodi lenia egregie hic prosint, sudorifera autem, & quæcumque corrigentia alia hactenus tentata noxiam hanc materiam in primis viis non destruant, haud male *Baglivius*

*vius indignabundus quasi in eos, qui febres tales solis alterantibus curare volunt; invehitur medicos, dicendo: quantum ex ardeo, cum video Medicos ad corrigendam, & dulcificandam solum materiam occupatos; sed de humore peccante foris eliminando non cogitare.*

*Art. 169. Verum præter hæc lenia evacuantia in eundem scopum simul quoque lubricantia varia apte adhiberi, atque illis interponi ac subjungi possunt: ut scilicet sunt potus feri lactis, decoct. C. C. cum pomo citri paratum, decocta ex hordeo cum pomo citri, & saccharo, vel ex avena cum passulis confecta; decocta prunorum dulcium, aut pomorum fragrantium saccharo grata reddita: emulsiones ex amygdalis, & pineis, aut semin. 4. frigid. si recentia sunt, quæ omnia etiam roborandi vi pollent, immo & oleum amygdal. dulc. quoque in iis; qui oleosa non averfantur — itemque potipunculæ diluentes ex aquis temperatis, & syrupo paratæ, atque acidulæ redditæ ad corrigendam materiam acrem; putridam, alcalinam commode etiam porriguntur. Pulveres ex absorbentibus terreis cum nitro; & cinnabari &c. — verum non ad scopum diaphoreticum, & sine regimine sudorifero.*

*Quænam alia adhuc conveniunt.*

*Art. 170. Quodsi laudata lenia evacuantia, & lubricantia ad humores noxios extrudendos forte non sufficiant, atque æger de magnis præcordiorum angustitiis, doloribus ventriculi, & hypochondriorum conqueratur, clysteres quoque simul lubricantes, & demulcentes qualia sunt: ex decoct. avenæ cum olliv. vel lin. vel decoct. fl. chamæm. in lacte cum ol. melle, aut saccharo, quod egregium simul est antispasmodicum, & anodynum, in usum adhuc sunt vocandi — Clysteres tamen semel, bis, terve, in die reiterandi, quoties gravia mala, & cum primis anxietates, aut dolores hypochondriorum urgeant.*

*Clysteres quoque utiles.*

*Art. 171. Quando impetus humorem vitiosorum versus caput ferri videtur, id quod ex capitis dolore, rubore faciei, mentisque alienatione &c. intelligitur, pedes calidis fovendi, superiores vero partes frigidiores, & parum tectæ servandæ sunt, atque ab omnibus calefacientibus, ac sudoriferis abstinendum.*

*Quando morbus caput impetit.*



*Riverius* tunc quoque indusia mutare subet, quod vero vix suaderem. Vescicatoria præterea furis, & rubefacientia, uti vel fermentum cum sale, & sinapi confuso, atque aceto plantis pedum calide impositum, ut sic vehementius a capite revellat. Quem in scopum etiam, præsertim quia vescicatoria tardius agunt, clysmatibus quoque ex decocti prunor. cum foliis senæ, nitro impregnatis revulsio a capite procurari debet, eaque ratione sæpe quidem qui jam desperati videntur, præter spem adhuc restituuntur.

*Art. 172.* Eadem ratione procedendum est si singultus incidit; aut si his non cedat, sal Anglicum Ephamense est propinandum, vel sicut *Duretus*, & *Baglivius* sæpius cum successu fecerunt, hiera picra. Potus Coffeæ etiam in singultu sanando singulari pollet virtute, eumque hic jam pro secreto, commendavit *Baglivius*. Quando singultus ab inflammatione ventriculi camphoræ gr. ij. vel iij. pulveribus antispasmodicis misceri, & sp. vin. camph. ventriculo mixtus imponi cum fructu possunt.

*Art. 173.* Sanguinis missio, quam *Sydenhamus* fere promiscue in febribus commendat, apud nos raro, & nisi in valde plethoricis, aut qui vini copiosiori potui dediti sunt, prodest, & quidem tantum in principio.

*Art. 174.* Quando natura in his febribus alvi fluxum facit; tunc & ab evacuantibus internis, & a clysteribus abstinendum, atque solis fere aqueis tepidis diluentibus ac lubricantibus supra indicatis, ac potionibus satis largiter haustis, ea juvanda est. His terrea nitro adjecto interponenda — Interea tamen tincturæ rhabbari quandoque etiam cum fructu cochleari j. interponitur.

*Art. 175.* Quod si vero natura fluxus alvi nimis vehementes, & colliquativos concitat, ita ut vires ægri valde prosternantur, extrema frigida reddantur, aliaque prava symptomata inde subsequantur, ægro diascordii ʒj. ex aqua cinamomi sine vino, vel cydoniata ʒj. s. exhibenda, quod vires non solum roborat, & fluxum moderatur, sed & simul blandum somnum conciliat. Sed si alvus inde nondum quiescat, iterata vice post aliquod tempus exhibitum ra-



CAP. I. *Febres acutæ stomachicæ.* 55  
 ro spem Medici destituet, quemadmodum præter no-  
 stram experientiam, & Sydenham & Burchardus pag.  
 129. sancte etiam id affirmant.

*Art. 176.* In anxietatibus præcordiorum, & dolo- Ubi an-  
 ribus ventriculi atque hypochondriorum evacuantiâ, xieta-  
 præsertim rhabarbarina supra laudata dari, atque cly- tes,  
 steres leniter evacuantes sæpius injici debent: ut sic & ven-  
 materia noxia a superioribus evocetur, & per inferiora triculi  
 educatur. dolores

## FEBRES CONTINUÆ.

*Art. 177.* *Febris* συνεχὴς, continua, sive *Febris pu-* Febris  
*trida dicta est, quæ per plures dies sine exacerbatio-* conti-  
*nibus & remissionibus usque ad ultimam & integra-* nua  
*sui cessationem perdurat. Ejus causa ita perhibetur.* quid.  
*Fermenta febrilia, seu fomes morbosus in febribus om-*  
*nibus ante dictis, & in hoc quoque gradu tantummo-*  
*do differre videntur.*

*Art. 178.* *Febres continuæ putridæ plerumque ve-* Fomes  
*nesectionem requirunt; intermittentes & malignæ ra-* februm  
*rissime aut numquam eandem admittunt. In Februm* harum  
*progressu ad statum appropinquantium sanguinem de-* omni-  
*trahere nefas est juxta antiquorum præcepta; Cælius* um fe-  
*Aurelianus, Celsus, & reliqui sanguinem mitti solum-* re idem.  
*modo primo triduo requirunt, ultra vero nunquam.* Venæ

*Art. 179.* De venesectione in genere dicendum est; sectio.  
*in sanguine est radix vitæ; & sanguinis est ipsius* Non si-  
*vitæ thesaurus; unde si aliis modis egro vel sine* ne n-  
*periculo, vel æque commode succurrere poterimus,* cellita-  
*sanguini parcatur. Rariores sunt sanguinis emittendi* te.  
*occasiones, quam vulgo creditur. Itali, Galli, &*  
*Hispani sanguinem mittunt, non unciatim, sed li-*  
*bratim. In Germania non ultra quinque vel sex un-*  
*cias emittunt: Inter hos nos Angli mediam viam*  
*amplectimur.*

*Art. 180.* In brachio subter venam basilicam jacet In qua  
 arteria, subter medianam nervus, subter utramque vena.  
 tendo; juxta cephalicam nulla est arteria, neque ner-  
 vus, neque tendo, atque hanc ob causam hæc ultima  
 minimo cum periculo aperiri potest.

*Vvillisi sententia.*

Quatuor

stadia

februm

putri-

darum.

*Art. 181.* In Febribus putridis continuis quatuor numerantur stadia, viz. initium, augmentum, status & declinatio, *in initio* plerumque adfunt symptomata sequentia: rigor aut horror, lassitudo & perturbatio cum siti & vigiliis, dolor in capite aut lumbis, nausea aut vomitus. *In incremento* sequentia, sitis intolerabilis, dolor capitis & vigiliæ pertinaces, deliria, phrenitis, motus convulsivi, oris amaror, sapor ingratus, linguæ scabrities, pulsus vehemens, & citatus, urina summe rubicunda, plerumque turbida, contentis saturata, sine hypostasi aut sedimento laudabili. *Status* morbi *crisin* continet, quæ in Febre continua fere idem est ac paroxysmus intermittentium, qui non nisi stato tempore, & post totidem horas, evenire solet, sic etiam motus critici in Febribus continuis a die quarto in quartum aut forsana a septimo ad septimum contingunt: Hæ *Crises* sunt plerumque per sudorem; vel hæmorrhagiam; sunt etiam aliquando *crises imperfectæ*, quæ morbum non solvunt, quales sunt per urinas, vomitum, secessum, exanthemata, bubones, &c. *Crisicos* tempora sunt valde incerta. Si Febris in principio sit vehemens, plerumque intra dies quatuor expectanda est *crisis*; quod si tardior sit Febris in initio; circa diem septimum ad *crisin* perveniet; si vero adhuc remissius incipiat, ad diem undecimum, aut decimumquartum, vel ultra protrahi solet.

Nota  
bene.

*Art. 182.* Interea notandum est, quod sicut paroxysmi intermittentium statis redeunt temporibus, ita *motus critici in continuis*; (diem autem quartum ut plurimum observant,) nam licet *crisis perfecta* ad 14. 17. aut 20. diem prorogetur, tamen intermedio tempore motus leviores contingunt, quibus materia Febrilis velut per partes amputatur, donec plenior e-  
jus discussionem natura aggredi valeat, *natura etenim ut plurimum, nisi alias perturbata, quarto quovis die partem oneris sui excutere tentat*; quare ut plurimum 4. 7. 11. 14. motus critici, non planetarum directione, sed ob naturæ necessitatem eveniunt.

*Art.*



*Art. 183.* Per declinationis stadium intelligo conditionem ægri & morbi, quæ statum sequitur, sive in salutem sive in mortem tendat, vel alterationem, quam sanguis subit post crisin bonam vel malam, cum res adhuc in dubio versetur: quandoque etenim, crisi imperfecta existente, ægri diuturna imbecillitate labefactantur, & non nisi longo tempore, si omnino, convalescunt.

*Art. 184.* Aliquando in declinatione Februm *incructatio* in partibus oris successit (quasi species *aphtharum*) & etiam adest *salivatio* copiosa, velut ab assumpto Mercurio, cum fœtore anhelitus, item linguæ & gingivarum intumescencia.

*Prya-  
lismus.*

Ut institutur harum Februm therapœia rationalis utilissima est earum divisio in Febres ardentes & lentas, utpote quoad medendi methodum toto (quod ajunt) cœlo a se invicem discrepantes.

*Diviso  
in febr.  
ardent.  
tem &  
lentam.*

## FEBRES ARDENTES.

*Art. 185.* Causus seu Febris ardens ea est, quæ cum majori æstu, siti ferè intolerabili, aliisque symptomatibus insigniorem sanguinis *phlogosin* arguentibus cursum suum peragit, symptomatis magis horrendis stipatur; crisin habet difficilem & evenum periculosum. Calor ad tactum fere urens est hujus Febris *signum pathognomonicum*; & ut plurimum, habet conjunctam insignem alicujus visceris *inflammationem*. )

*Causus  
quid.*

*Art. 186.* Huic Februm classis aliquo modo referri potest 1. Febris *lipyria* dicta in qua interiora uruntur, exteriora vero frigent. 2. *Assodes*, in qua ægredi cubitum eundem non ferentes jacendi situm perpetuo variant in lecto indesinenter jactitantes. 3. *Elodes*, in qua ægri profusissime sudant, sudore nihil proficiente, &c. Sed revera hæc sunt potius Februm symptomata, quam novæ species. Ejusdem quoque commatis est Febris *Calenura* dicta quæ nihil aliud est, quam peculiaris delirii species.

*Lypiria,  
Assodes,  
Elodes,  
&c.*

*Art. 178.* *Calentura* est Febris nauticis peculiaris. Hoc morbo correpti singulari delirii specie afficiuntur; nimirum ajunt se in viroto, quod semper

*Calen-  
tura.*



*in conspectu habent: & presto esse arbitrantur, ambulare velle; &, nisi vi detineantur, in mare profiliunt; atque hoc symptoma est signum hujus morbi pathognomonicum, In mari mediterraneo frequenter occurrit; juvenes robustiores & temperamento sanguineo præditi huic Febri sunt magnis obnoxii. Larga sanguinis missione ut plurimum sublevantur.*

*Boerhaavii sententia.*

**Sympto-** *Art. 188. In Causa adest calor ardentissimus, sicci-*  
mata *tas in cute tota, naribus, ore lingua; respiratio densa*  
frequen- *anhelosa; cita; lingua sicca, flava, nigra, exusta, a-*  
tiora. *spera, sitis inexplabilis; nausea, vomitus; anxietas,*  
*inquietudo, lassitudo, summa: tussicula, vox clangosa;*  
*delirium, phrenitis, pervigilium, coma, convulsio;*  
*diebus imparibus exacerbationes.*

**Prognosis.** *Art. 189. Tertio & quarto die sæpe lethalis evadit,*  
*septimum raro transit, & perfecta; solvitur sæpe hæmor-*  
*rhagia (quæ, si tertio vel quarto die parca, lethalis;)*  
*hæc prænunciatur cervicis dolore, temporum gravitate*  
*tenebriosa, caligine, præcordiorum contentione sine do-*  
*loris sensu, invitis lacrymis sine lethali signo alio, rubore*  
*faciei, pruritu narium, optima fit die decretorio; vomitu,*  
*alvo, sudore, urina, sputo crasso; accessio die pari*  
*peissima, si id ante diem sextum, urina nigra, pauca,*  
*tenuis hic lethalis; lethale sanguinis sputum; lethalis*  
*sanguinis mictus; deglutitio læsa, mala; extremorum*  
*refrigeratio pessima; facies rubra & sudans mala, parotis*  
*non suppurans exitialis, alvus nimis fluxa lethalis; cum*  
*tremore abit in delirium, inde in mortem, rranfit in*  
*peripneumoniam sæpe cum delirio. In Febre ardente*  
*(inquit Hippocrates) si tinnitus aurium cum visus he-*  
*betudine fiat, & ad nares accedat gravitatis sensus,*  
*delirium portenditur.*

**Intentiones curati-  
væ.** *Art. 190. In hoc casu integumenta debent esse mi-*  
*nime aggravantia corpus, situs corporis paulo etectior,*  
*potus copiosus, blandus, demulcens, subacidus, aque-*  
*us, calidus; cibi leves, farinacei, hordeati, avenacei*  
*ex fructibus subacidis confecti; requiritur venæsectio,*  
*si morbi initium, plethoræ indicia, inflammationis sin-*  
*gula-*

ularis signa, calor intolerabilis, rarefactio nimia, re-  
 sulfio necessaria, symptomata urgentia, neque alio re-  
 medio facile superanda, hanc exigant. Indicantur e-  
 iam quandoque *clysmata* blande *laxantia* & *refrige-*  
*rentia*, prout vis ardoris, siccitas alvi, imperant;  
 medicamenta *diluentia*; *nitrosa*, alvum lenissime *la-*  
*xantia*, &c. Interim in animo probè tenenda est Vvald-  
 Schmidii admonitio t Febris maligna ( inquit ille ) in  
 principio sæpe speciem Causæ præfert; cautus itaque sit  
 medicus; ne in errorrm incidat: animadvertendum  
 ergo est, an febricitans de cordis anxietate, virium  
 iactura, aliisque gravioribus accidentibus conqueratur;  
 & qualis sit urina, &c. nam longe diversa est harum  
 Februm curatio.

Remedia particularia his intentionibus satis facien-  
 tia a sectione de Februm symptomatis petenda sunt.  
 ( pag. 18. & seq. )

## FEBRES LENTÆ.

Ettmulleri sententiæ.

Art. 191. **F**ebres lentæ, etiam si sint minus acutæ, Febres  
 sunt tamen continuæ in quantum continuo lentæ  
 affligunt ægros, sed tardiore motu sua dissolvunt tempora,  
 hinc diuturniores sunt, & symptomata habent minus ur-  
 gentia. De febribus his apud practicos pauca prostant. A  
 vitiis lymphæ (vel pituitæ) potissimum oriuntur; & a Sylvio  
 Febres lymphaticæ appellantur, forsan rectius pituitosæ.

Art. 192. Inter has eminent Febres *catarrhales* di- Febres  
 ctæ, quæ in principio & incremento conjunctum ha- catar-  
 bent *catarrhum*, *coryzam*, *tussim*, *raucedinem*, &c. riales.  
 Hæ Febres sunt plerumque lentæ, interdum mites,  
 vespere vero aliquanto exacerbari solent: adest lassitu-  
 do artuum, durant symptomata sub coryza & tussi  
 gravioribus usque ad statum morbi, donec materia ca-  
 tarrhalis ( ut vocant ) coacta fuerit, & spissior mucus  
 emunctus, deinde cessat Febris. Sedes morbi est in  
 glandulis conglobatis.

Art. 193. In Febre catarrhali conducit *decoctum* Curatio.  
*ligni sassæfr.* ( cum rad. *liquiritiæ* & *passulis* ad hu-  
 mo-

morum acrimoniam ) item *succus raparum expressus* cum pauco saccharo ; item *volatilia & sudorifera* , solutio *gum. ammoniac. &c.* vid. catarrhum , tussim , raucedinem , &c. alibi .

Febres  
pituito.  
sæ.

Art. 194. Præter dictas observantur quoque Febres *lymphaticæ* ( potius *pituitosæ* ) vitio lymphæ ( pituitæ ) glandularum conglomeratarum , quæ in certam cavitatem suam effundunt succum ; inter quas eminent parotides & pancreas , quæ in os & intestina , & consequenter in massam sanguineam secretos liquores evomunt . Peccant hi humores , quando sunt nimis viscidi , salsi , & acres , unde excitantur hæ Febres ; ( quæ quoque non improprie interdum Febres *scorbuticæ* audiunt . ) Acutæ continuæ , nonnunquam etiam intermittentes , in hujusmodi *lentas* degenerant , & quandoque in *hecticas* transeunt . Origo harum febrium est plerumque in stomacho ex indigestione & cruditatibus .

Febres  
colli-  
quati-  
væ.

Art. 195. Ideo quæ tam in principio quam in incremento mitius vomitorium ad curam optime viam ster- nit , & postea visciditas vel acrimonia pro re nata corrigenda est ; & symptomata mitiganda , & ventriculus roborandus &c. Pro his scopis consequendis aliquo modo valent remedia sequentia , *Tartarus vitriolatus pulveres testacei , antimonium diaphoreticum , antihecticum Poterii , tinctura corallii , salia volatilia , &c.*

Art. 196. Febres colliquativæ sunt , in quibus cor-  
Caratio. pus breviter tempore insigniter consumitur , & emaciatur : partes solidiores & ipsa pinguedo colliquefcit , nunc per diarrhœam , nunc per sudorem , nunc per urinam , nunc solo ardore febrili sine ulla sensibili excretionem ; Febris aliquando colliquativa ex cancro mammarum cum diarrhœa observata est .

### Hecqueti sententia .

Species  
febris  
lenta  
quæ a-  
lios  
orbos  
inquitur  
se

Art. 197. Urgent inter medendum quasdam occur-  
rere febres , dicas : an febriles pulsum habitudine , quæ nec hecticæ , nec colliquativæ sunt , continuæ ta-  
men , quæque gravium morborum non raro appendices sunt ; sub his pulsus adest celer , frequens , & durius-  
sculus , noctium inquietus , vigilæ , sitis adest , & linguæ

ari-



ariditas, constat appetitus, coctiones perseverant, interim ægrotantes ejusmodi non revalescunt, ad *evexiam* non pervenientes, & in statu neutro versantes; licet expulsus conditione constanti febrem adesse pronuntiares: at, amabo, qualem febrem, quæ si vel in annos plures abeat, nullum conatus dabit indicium, quo ad hanc vel illam propendeat evacuationem aut apostasin? Revera comperta est lenta febris, aut hæctica, quam ferme cum tante dicta misceres, se hæc colliquativa est, pulmonibus minitans, in sudores, sputamina, diarrhæas propendens, quæ nifus exterminantis signa sunt, igitur illam forte pro lenta habendam voles? neque adversabimur, modo a colliquativarum numero illam arceas, proindeque recognoscas conatus omnis exfortem.

*Art. 198.* Inobservatæ febris forte genus est, quæ Febris tota in tonica partium evibratione spasmodica, aut lenta spasmodico arteriarum *rithmo* consistit, quam alit im-<sup>spasmo-</sup>bibitus stimulus, irritatio. fremitus a prægressi febris dica. succussionibus superstes; solidorum anxietudo, instabilitas, aut inconstantia adest a sua cum fluidis inæquali fultura veniens, aut a perditis fluidorum prementorum eum solidis prementibus contactuum, resistantiarum, & distantiarum commesu & proportionibus, unde male fultæ, spasmoque tensæ arteriæ in se celerius reflectuntur, seque motando fremunt.

*Art. 199.* Hujus *ætiologiæ* veritatem promittit curandi ratio, quæ istiusmodi febrim edetur; hanc exasperant *cathartica*, amara lædunt, *diluentia nitrata*, & *absorbentia* juvant modo fatua fuerint, non *salina*, non *acria*, quibus addes *anodyna*, *foetus*, *balnea*; sed hinc aberit *cortex peruvianus* febrium ille Hercules, aut febrium debellator, a quo hæc febris novas acquirit vires; quæ tamen monita omnia cassæ erunt, ommissa corporis, & animi quiete; adeo quiete tractari amat hujusmodi febris!

*Art. 200.* Interim sub assiduo illius labore, arteriarum conatus mille tentari, crederes, quibus in quandam materiam excernendam eluctarentur, ricendo tamen jugiter, enituntur nihil, *critici* enim nihil; aut *judicatorii* observatu usquam est, quo expedire se fuerit hic morbus; irritus ergo, ecce inquit, &

im-

impotens febrilis conatus? irritus quidem si materiem spectes, utilis si ordinem; ordinis autem est, non solum ut absolvat naturæ debitas fluidorum evacuationes, sed & ut teneatur nativi solidorum motus regulas, & leges, sicque servet solidorum cum fluidis amicabile commercium; porro ab hoc concentu recessus, & ab alienatio est isthæc febrilis inquires, quæ proinde nihil aliud est, quam ad quietem conatus.

*Art. 201.* Spasmodica enim affectio est, sub qua partium elastica vis, suum ultra tonum extensa agitatur: at ut suam ad quietem regredi contendit nimium dilatatus elater, sic suum ad tonum redire nititur spasmodicè tensa arteriarum elasticitas; hicque conatus erit illius, quam hic tractamus spasmodicæ febris. Ut ergo nulla foris est, quæ sit conatus expers, morbusque nullus, qui suam non habeat febrem, nullus quoque erit morbus, qui, aut sub quo non sit aliquis proprius conatus, conatus autem ad evacuationem modo, modò ordinem, sed semper ad æquilibrium, a quo tutius animalis œconomix concentus, felicitas functionum, ipsa sanitas.

## FEBRES CONTINUÆ MALIGNÆ.

*Ettmulleri sententia.*

*Febri. Art. 202.* **F**ebri malignæ primum signum est subitanea virum prostratio cirra causam manifestam cum pulsu debili; calor externus non adeo intensus ac in quibusdam aliis Febribus, potius interiora urens; adsunt vigilæ pertinaces mox a principio morbi, inquietudo anxiosa; conqueruntur ægri, & monstrant regionem stomachi seu præcordiorum; urina est sanorum similis; facies interdum solet esse tetra, & a statu naturali multum mutata; livida interdum, aut plumbea. In his Febribus, quod æstus & Febrilis ebullitio ut plurimum remissior sit; malignitati, quæ sanguinem occupat, prorsus debetur, & spirituum magis affectorum & quasi sideratorum, quam turbatorum humorum indicium est: aut saltem in humoribus, præsertim sanguine, fermentativam maligni miasmatis confusionem, & in textura & in motu intestino eorum inor-



inordinationem indicat, & ita incalescentia quidem, sed interne tantum gliscens, non vero ad exteriora pergens accidit, unde natura quasi oppressa non potens est symptomata illa magis regularia exercere; quæ morbo competunt.

*Art. 203.* Ratione symptomatum adjunctorum magna est varietas *Febrium malignarum*; dum quædam cum certis, & insignibus cutis *efflorescentiis*, quædam sine iis, vel paucis admodum, quædam alis symptomatis stipatæ sunt. Magna varietas

*Art. 204.* Nonnulli asserunt (ex observationibus microscopis) in omnibus Febribus malignis, & ulceribus gangrænosus talem adesse putredinem sanguinis, ut exinde copiosissimi generentur *vermiculi*, qui, ubique scaturientes, & corpus lancinantes, tam varia inducant symptomata, necesse est: Sed hi vermes non nisi putredine præcedente generari possunt. In Febribus malignis sanguis est nimis fluidus, vix aut planè non omnino congrumescit, sed hoc quoque est morbi *productum*: Malignitas aliquando est tanta, ut partes nunc internas nunc externas *sphacelo* ac *gangræna* correptas observare liceat. Vermiculi.

*Art. 205.* Audita Febre *maligna* homines contremiscunt; siquidem omnes Febres malignæ sunt admodum periculosæ; & quoad exitum valde incertæ, unde *Galenus* malignas Febres statuta ad judicandum non habere tempora asserit. Surditas in principio periculossima, in statu vero morbi salutem portedit. Narium stillicidium; ut & alvi fluxus, quocumque morbi tempore, sunt pessima signa. Muscarum venatio, aut floccorum collectio est fere semper lethalis. Interdum bubones circa genitalia apparent, quibus die undecimo erumpentibus morbus evanescit. *Medicus* (rectè admonente *Vobldschmidio*) nunquam ab egro recedat, nisi prius inspexerit oculos, quorum insolita mutatio infaustum prædicit eventum; & dum pulsum explorat, semper attendere debet an manus egrotantis sit tremula. Prognosis.

*Art. 206.* Venæsectio in Febribus malignis locum non habet; quò malignior est Febris, eo magis nocet & quo tardius instituitur, eo deterius. ----- *Vomitiva* in primo principio morbi præ cæteris omnibus ma- Curatio.



xime conducunt , antequam natura moliatur aliquam excretionem per cutim ; elapso vero primo principio elapsa est occasio : Et postea cura aggredienda est medicamentis sudorem moventibus ; sudores etenim ( ipsa natura monstrante viam ) causam & morbi fomitem frequenter expellunt , hæc medicamenta bezoardica aut alexipharmaca appellantur ; quo autem major est malignitas eo copiosius provocandus est sudor , respectu semper habito ad morbi genium , diversitatem , ægroti vires , &c. *ter ad minimum in 24. horis sudoeifera sunt propinanda* : interponenda sunt analeptica & blande acida , inter quæ eminet *spiritus nitri dulcis* , ( item *tinctura croci cum spiritu nitri dulci extracta* ) *succus citri* , *cydoniorum* , & *Camphora* est nobile alexipharmacum , sed omnes ejus usum ferre non possunt , præsertim mulieres & literati , quorum spiritus animales sunt mobiles & dissipabiles ; est mirabile concretum , & , si cum cautela usurpetur , vix datur par remedium . *Rob. sambuci* est egregium sudoriferum pro pauperibus : *Cantbaridum* & *vesicantium* usus in statu morbi insigniter potest . *Sal volatile C. C.* & *sal viperarum* sunt sudorifera , & malignitati resistunt : & hic locum habet *mixtura simplex Paracelli* , viz. *24. sp. theriacal. camphorat. 3x. sp. vitriol. 3ij. sp. art. retificat. 3vj.* digere in phiala hermetice obsignata ad tres septimanas , ut uniantur exactissime ; dos. 3j. plus minus in vehiculo appropriato , ciet sudorem . „ Item „ *decoctum sacrum Fulleri* , & *haust. diaphoret. e-* „ *jusdem* ; *bezoard. mineral. tinctura bezoardica* , o- „ *leum Heinsij* .

## FEBRIS PETECHIALIS.

*Ettmulleri sententia.*

Febris *Art. 207.* **F**ebbris petechialis est Febris maligna in petechi- qua , præter symptomata reliquis Fe- alis sym- bribus malignis communia , adest insignis lassitudo to- ptomata. tius corporis , dolor universalis contundens & lancinans : maculæ raro die quarto , sæpius circa semptimum erumpunt , præsertim circa pectus & scapulas , hinc abdomen , crura , brachia ( collum ) ordinario facies

cies solet esse libera: interdum non maculæ solum sed vibices apparent, in declinatione aliquando quasi *ptyralismus* exoritur cum euphoria ægri.

Art. 208. Maculæ hæ in morbo salubri efflorentes *Prognosis* intense rubent instar pulicum morsuum, (petechiæ *sis* differunt a puncturis pulicum, quod in puncturis in medio punctum apparet, quod semper manet etiamsi reliquum ruborem compressione vel frictione pellas.) Hinc pedetentim pallescunt, flavescent, sicque evanescent, & quo magis rubicundæ sunt, eo melioris notæ, e contra, quæ ex rubore livescunt, vel nigrescunt, pessimæ sunt; si retrocedant, ingens periculum imminet. *Contagiosæ* sunt hæ febres, & interdum *Contagiosa* *epidemice* grassantur, admodum periculosæ sunt; plures moriuntur quam evadant.

Art. 209. Quoad curam *Febrium petechialium*, eadem indicationes, atque supra circa Febres malignas *Curatio* ingenere, hic locum obtinent; si præmature & nimis cito maculæ retrocesserint, applicanda sunt *vesicatoria*, quæ etiamsi raro aut nunquam denuo apparere solent, earum tamen absentia vesicatoriis quodammodo suppletur, & symptomata nervosi generis ex earum retrocessione interdum felicissime præcaventur. Apparentibus *petechiis* nihil amplius in primis viis moveri debet; ipsa enemata sunt suspecta.

### Donckersii sententia.

Art. 210. Febris *petechialis*, sive *continua maligna epidemica* in civitate agroque *Coloniensi* circa annum 1673. ad hunc modum se habuit; ex improvise plurimos occupavit anxietas præcordiorum, gravitas circa regionem ventriculi, appetitus dejectio, spontanea virtutum lassitudo, nec non vertiginosus capitis dolor, præsertim circa originem nervorum opticorum; quibus omnibus postmodum cum virium subita prostratione accessit Febris putrida plurimam referens ideam *synochi*: utpote quæ præmissis brevi horrore vel rigore, universum corpus magno. & quem dicunt, præternaturali

*Symptoma.*  
*Inva-*  
*dendi*  
*modus.*



perfundebat calore, sequentiaque secum adducebat symptomata.

*Symptoma.* *Art. 211.* Pulsus in omnibus erat celer, & plerumque parvus ac debilis; sitis, invalescente morbo cum linguæ siccitate, inextinguibilis; urina in morbi principio ordinario quidem apparebat sana, aliquando tamen rubra & obscura, in fine vero augmenti, vel initio status turbata, in declinatione semper cum sedimento, saltem aliquali; alvus in aliis adstricta, in aliis laxa erat; infestabat ut plurimum ægros hypochondriorum præcipue sinistri dolor (quod notandum) per lumbos secundum spinam dorsi ascendens, lancinans, ad scapulas extendebatur, & cui non raro se præbebat comes *pleuritis* vel *angina*; multos in principio augmenti defatigabat alvi fluxus, cum quo non raro lumbrici excernebantur; multi quoque alii in medio augmenti in aurium tinnitum, gravedinem auditus, & aliquando oculorum suffusionem, qui nonnunquam in omnimodam eorundem sensuum ablationem incidebant; omnes denique affligebantur perpetuis vigiliis, & delirio, quod in aliis levius, in aliis gravius fuit, concomitantibus semper rubris vel lividis aut subnigris maculis.

*Solutio.* *Art. 212.* Horum similiumque symptomatum *syndromen* in omnibus, quorum cura mihi commissâ fuit. vel (quatenus ex aliorum relatione potui colligere) quorum natura inversa curandi methodo non fuit plane consternata, septimum circa diem subsecuta fuit *crisis*, vel manifesta vel obscura.

*Contagium.* *Art. 213.* Hic morbus in primo sui ortu aliquandiu apud paucos veluti latebat, pedetentim vero symptomatum malignitate funerumque frequentia longe lateque sæviebat, & ad tertium usque annum plus minus invaluit, & nonnullis in locis tertiam incolarum partem e medio sustulit.

*Prognosis.* *Art. 214.* Si delirium circa diem criticum vel primum accidebat, vel majus evadebat, concomitantibus diarrhœa, obscura voce, & difficillima (citra faucium tumorem) deglutione: necnon digitorum manuum labiorumque tremoribus convulsivis, indubia instanti mortis erant indicia; in hac Febre quando alius aliquis morbus se illi conjunxit, multo periculosior fuit



lethalis fuit frequentius in cacochymicis, plethoricis, & valde obœsis, pulsus parvus celer in morbi principio male ominatur. Maculæ parvæ & nigræ aut lividæ male portendebant: quibus vero floridæ tempestive prodierunt, nempe die quarto seu indicatorio, sub *legitima medicatione*, ut plurimum servatos vidi, alii autem, in quibus tales maculæ serius vel instante die critica sub cuticula obscure proreperent, septimoque die vel immediate post magis debilitarentur, ac pejus haberent non evasere; exitialis quoque ægro ut plurimum fuit, si præter pulsum a principio insigniter parvum, debilem & celerein, urina quoque semper maneat sani coloris & consistentiæ; si ægrotus mente consternatus se non ægrotaſſe aut bene habere & continuo esurire putet; si cum magna faucium linguæque ariditate parum bibat; continuaque adsit oculorum lacrymosa diffillatio: hæc enim & similia symptomata, si non certum interitum, saltem extremum vitæ discrimen denotant. Certus denique pronuntiatur interitus, si circa criticum seu septimum diem, urina in eadem perseverante bonitate & claritate; delirium majus fiat; si sitis aucta sit cum tanta linguæ fauciumque ariditate, ut æger non nisi inarticulate, loqui, neque nisi cum difficultate deglutire queat; si adsint convulsiones; insuper si, exiguis & fuscis sub cuticula obscure emergentibus maculis, alvi fluxus superveniat, mors in propinquo est.

Signa  
ut plurimum  
lethalia.

Est contra vero si pulsus non sit nimis debilis, & si sit mediocriter magnus, & non præter modum celer; si delirium leve & insomnio quam delirio similis; si lingua non admodum sicca, sitisque tolerabilis sit; si maculæ sint *rubræ, majusculæ, rotundæ, claræ, & distinctæ*, si post tertium diem erumpant; & urina circa idem tempus rubra, & obscura, vel cum nubecula spectetur, bonum hinc lætumque præſagire oportet eventum, qui sine dubio septimo die inſequitur, quando scilicet erupto sudore quietoque oborto somno symptomata quæque graviora remittunt, & æger perfecte judicatur.

Signa  
salutaria.

*Art. 215.* Cura ab *alvi purgatione* semper inchoanda est, si nempe nullum aliquid urgens symptoma acrius suadeat; sin vero morbus fuerit valde inflamma-

Curatio.

torius, pleuriticus, vel anginosus, &c. ante omnia præmisso clystere *venæsectio* instituenda est, & remedia *antipleuritica* propinanda; & aliquando phlebotomia est iteranda (sed parce & non nisi cum cautela aperienda est vena in Febribus malignis.) Cathartica valida sunt vitanda, lenitiva, & quæ sanguinem minus exagitant, sunt eligenda. Factis his juxta indicationes particulares evacuationibus, sanguinis naturalis effervescentia confortanda est convenientibus, *Alexipharmacis*, sed non violenter, ac si hostis una vice expellendus esset. Ex innumeris remediis, quæ in hunc scopum apud authores inveniuntur, eligimus vulgatissima, atque ab omni ævo probatissima; & idcirco tutissima; *mithridatum* nempe, *theriacam*, *diascordium*, &c. Cavendum est inprimis ne sudorem expellere conemur, sola vi medicamenti, antequam ipsa natura eum

Potus, sponte excitare molitur. Potus debet esse neque nimis calefaciens; neque valde refrigerans; inchoante crisi cum sudore nihil convenientius & expertus sum, quam ut æ-

Cibus. gri *aquam hordei calidissimam* copiose bibant cum vino mixtam, & quandoque cum *flor. papav. errat. & rasur. C.C. incoct.* Cibus debet esse tenuissimus vel potius nullus.

Art. 216. Purgationis in morbi principio necessitatem, & bonos effectus non tantum inculat ratio manifesta (de qua, si quis velit, videatur author) sed & experientia mihi confirmavit, adeo frequens, adeo certa, adeo clara, ut si hæc falsa sit, aut esse possit, nulla certa aut sit, aut fuerit, aut futura sit unquam.

Cathartica.

Art. 217. Remedia cathartica mihi usitata fuerunt vel hujusmodi *apozema* vel *electuarium* subsequens: *℞. Fol. sen. mundat. ℥iij. sem. fœnic. ℥iij. crem. tartari ℥i. coq. in q. s. aq. font. ad ℥vj. in colatura dissol. pulp. tamarind. ℥ij. syr. ros. solutiv. ℥. ℥j. m. sumatur partitis vicibus. Electuarium sic se habet; ℞. Pulp. tamarind. ℥ij. confect. alkerm. pulv. jalap. ana ℥i. resin. ejusdem gran. vj. diagrid. gr. v. cum q. s. syr. de cichor cum rheo f. electuarium. Misturam alexiteriam fere semper hujusmodi cochleatim bibendam propinare solebam; *℞. Theriac. andromach. diascord. fracastr. ana ℥j. sal. absinth. ℥ss. ocul. cancrorum ℥ij. aq. card. ben. meliss. ana ℥ij. theriacal. syr. papav.**

Alexi.  
pharma.  
ca.



pav. errat. ana ʒj. sp. sulph. q. s. ad gratum acco-  
rem, f. mixtura. Ex magno ægrotorum numero, quos  
sub mea habui cura, licet aliquando quinque, sex,  
vel septem simul in eadem domo Febre ista laborave-  
rint; nullus, quod meminerim, sit desideratus præter  
unum virum & unam foeminam. Fides sit penes au-  
thorem.

Succes-  
sus ad-  
miran-  
dus.

Art. 218. In calce libelli historias LII. hac Febre  
decumbentium in medium profert, quorum duo tantum  
mortui sunt. Illius methodus est plane singularis, &  
si dictis fideri adhibenda sit, proculdubio curationes  
hasce laudano potissimum acceptas referre (ut mihi vi-  
sum est) debemus: in omnibus enim fere præscriptis  
Laudanum larga manu propinavit; exemplo sit locus  
sequens, ℞. Diascod. ʒiʒ. laudan. opiat. gr. ij. m.  
℥. bolus pro una vice, concessio eodem tempore in po-  
ru ordinario syrupo papaveris errat. p. 467. His ex-  
pendendis haud mihi suppetit tantum otii, sed ad  
propositum revertendum est.

Sed in  
dubium  
vocan-  
dus.

## DE FEBRIBUS ERUPTIVIS in genere.

*Inter legendum:*

Art. 219. **F**ebres Eruptivæ; quarum crises per e-  
ruptiones cutaneas expectandæ sunt;  
(quales sunt variolæ, morbili, Febris scarlati-  
na; Febris cum rubeolis; crystallis, Febris miliaris;  
&c.) præter symptomata aliis Febribus communia hoc  
habent peculiare & sibi proprium, nempe, *ingentem*  
*pectoris oppressionem*; quæ harum Febrium est signum  
vere *pathognomonicum*; nimirum est quidam validus  
naturæ conatus materiam morbificam a centro ad cir-  
cumferentiam propellendi; unde certamina gravissima,  
anxietas præcordiorum, pectoris angustia & oppressio-  
nes maximæ: facta autem eruptione, statim hæc dira  
symptomata evanescent. Ejusmodi *pectoris oppressio* in  
aliis quoque Febribus est *crisum præcursor* (unde di-  
ctum illud, nox ante crisin est molestissima) in his ta-  
men serius accidit, scilicet sub morbi finem; in eru-

Febri.  
um erup-  
tiva.  
rum  
sympro-  
mata  
peculi-  
are.



ptivis vero non procul ab initio, imo frequenter propemodum in primo insultu; quoniam *efflorescentia* in propinquo est.

**Symptomata** *Art. 220. Præter symptomata aliis Febris communita (inquit Mortonius) in Febris eruptivis adsunt quædam signa quædam quasi pathognomonica, talia sunt pulsus insigniora & debilis, & celer, respiratio cita & anhelosa, hypochondriorum oppressio & angustia, urina pallida, ac tenuis, comæ, seu vigilie pertinaces, subsultus tendinum, nonnumquam spasmi manifesti, & deliria prorsus efferrata, gravativa palpebrarum debilitas, oculorum rubedo, punctura dolorifica, & lacrymæ involuntariæ, in gutture dolor ulcerosus, rauco clausa, tussis perpetuo molesta.*

*Art. 221. In erysipelate, variolis, morbillis, Febre scarlatina, &c. (inquit D. Freind Hist. Med. p. 75.) si symptomata vehementiora fuerint, si caput aut pulmones vehementius urgeant, aliæve partes ingenti dolore super modum afficiantur; ratio postulat, ut vena incidatur, ac tuto fieri licet. Et teste experientia (nichil enim frequentius expertus sum) audacter affirmo me nunquam observare potuisse eruptiones istiusmodi ex venæsectione retroire.*

**Exanthemata** *Art. 222. Humores acres stimulant in corpore re-tenti: ut urina, sanies atrabilaria, cancrofa, herpetica, sphacelata, materiæ alias evacuari solitæ; vel caco-chymia, atrabilis, materia Erysipelatosa, ea febris inter-mittentis, & continuæ acutæ, atque malignæ ad ner-vorum principia delata, convulsiones funestissimas suscitant: ita etiam materies podagrica, rheumatica ex articulis, variolosa, morbillosa, scabiosa, herpetica, Erysipelatosa, scarlatina acute in caput delata, verum ante horum eruptionem convulsio producta minus periculi portendit: scorbutica convulsio levè paralyti ut plurimum conjungitur: venerea vero doloribus circa noctem acutis jungitur, & aliis hujus morbi signis. De Gorter.*

**Eadem interdum hæc febrem produ-cunt.** *Art. 223. Vitio relicto ex febre intermittente, continua, maxime hæmitritæo, variolis, morbillis, febre scarlatina, inflammationibus diuturnioribus internis febribus putridis, & ephemera potrecta non bene sanata — si vero opus misceatur sanguini ex abscessu,*

CAP. I. *De Febribus eruptibus, &c.* 71  
vomica, ulcere interno quodam præprimis pulmonum,  
aut aliis ulceribus externis, & fistulis, produxerit fe-  
brem hæcticam, medicamentis antipuricis curandam.  
*De Gorter.*

*Art. 224.* In omnibus denique exanthematicis refri-  
geratio, itemque lecti; & industi mutatio summe sunt  
noxia, adeoque serio vitanda: nam hæc facile mor- Quod-  
nam re-  
gimen  
obser-  
van-  
dum.  
tem, ut sæpe vidi, aut gravissima saltem mala indu-  
cunt. E contrario autem nimius calor quoque est per-  
niciosissimus. Tranquillus vero decubitus in moderato,  
& æquali calore, ad blandam, & æqualem transpira-  
tionem semper conservandam, quam utilissimus est, at-  
que quam maxime commendandus, nisi forte in le-  
nissimis Variolis, morbillis, scarlatinis & urticatis,  
ubi deambulatio in cubiculo temperato, clauso, ipsis  
concedi potest, quamdiu ambulare volunt, aut pos-  
sunt: *Heisterus.*

## FEBRIS SCARLATINA.

*Sydenhami sententia.*

*Art. 225.* **F**ebbris *scarlatina* quovis anni tempore,  
sed ut plurimum sub autumnum, se Febris  
prodit, infantes præ ceteris infestas; Rigent, horrent- scarla-  
tina.  
que in initio, ut in aliis Febribus, neque vehementer  
ægrotant, postea cutis universa maculis parvis rubris in-  
terstinguitur, latioribus magisque rubentibus, at non  
perinde uniformibus, ac sunt in morbillis: ad duos  
tresve dies perdurat rubedo, & deinde evanescit, cu-  
tem relinquens aliquanto asperam & furfuraceam.

*Art. 226.* Quoad curam naturæ prorsus relinquenda curatio  
est, vel, si medicatione opus sit, cum morbillis satis  
convenit.

*Art. 227.* Febris *scarlatina* ( inquit *Mortonus* ) a Efflo-  
rescen-  
tiæ mo-  
dus.  
morbillis minime distat, nisi efflorescentiæ modo;  
morbilli confluentes dici potest. Idem postulat regi-  
men, eandemque medendi methodum. Efflorescen-  
tia in morbillorum interstitiis figuram diversam viz.  
oblongam, quadratam, vel multangulam obtinet,  
unde cutis variegata est: in Febre autem *scarlatina*



*una continuata inflammatione & rubine cuticula perfunditur.*

*Juncheri sententia.*

Historia  
Scarlatinae ac-  
curata.

*Art. 228.* Incipit & hæc purpuræ species cum leni horripilatione, quam temperatus subsequitur æstus, plerumque siti moderata, faucium ardore, & virium dejectione stipatus. Adest etiam oppletio pectoris, respirationem difficilem reddens, cum tussicula sicca. Accedit capitis gravitas vertiginosa, aut dolor magis acutus. Dic quarto tota facies intumescit, & erumpunt maculæ intensius rubicundæ, primo parvæ, mox vero latiores redduntur, & coalescunt, ac totam faciem summa rubedine tingunt. Circa hoc tempus in quibusdam, præcipue plethoricis superveniunt hæmorrhagiæ narium. Postea hæ maculæ latæ etiam in pectore, dorso, tandem in artibus prodeunt, & totam superficiem tegunt. Postquam duos, aut tres dies ita subsistere, rubor ille insignis perit, facies detumescit, & squamulæ decidunt. Febris satis tranquille excurrit, & cum moderata diaphoresi salutarem eventum obtinet. Alvus ordinarie toto hoc tempore est clausa, uti etiam in reliquis speciebus, quæ tamen sub finem morbi sponte aperitur. De reliquo hæc febris sereno, & æstivo tempore usitatus affligit.

*Art. 229.* Febris scarlatina quando sibi relinquitur nihil mali portendit, & sponte interdum iterum cessat. Si autem imprudenter tractatur in primis per regimen nimis calidum, aut per alia sanguinem commoventia, mala plerumque consecutaria habere solet. Sufficiens hæmorrhagia narium sub eruptione scarlatinae contingens, morbum insigniter imminuit.

*Art. 230.* Methodus vero medendi hic eadem omnino est, ac quæ ad purpuram urticatam adhibetur; cuius ex eodem descriptionem mox subnectemus.

*Heisteri sententia.*

Diagnosis.

*Art. 231.* Febris scarlatina cognoscitur, quando in febre acuta maculæ amplæ, rubræ, ad colorem scar-



scarlatinum accedentes in cure hinc inde prorumpunt, æque mox primis diebus, immo quandoque antequam febris percipiatur, quæ supra cutem non elewantur, & quidem etiam in facie, ubi petechiæ vix unquam prodeunt

*Art. 232.* Per se quidem non adeo periculosa, & Methodus  
medicandi. queros fere solum aggreditur. Quando levior. sola natura, præsettum si aptum regimen accedat, sæpissime sine medicamentis curatur; sed si paulo gravior, causa morbi optime corrigitur, & quoque expellitur sufficiens potu diluente, temperante, acidulo, potiunculis, & mixturis temperantibus ac diluentibus, ut & pulveribus temperantibus, & blande diaphoreticis, quando ægri a pulveribus non abhorrent, vitatis medicamentis, & alimentis omnibus calidioribus, quia ab his morbus redditur gravior, servatoque eodem regimine & victu ut in ceteris exanthematicis, & speciatim variolis. Qua via maculæ post aliquot dies sensim disappearerunt, cuticula fere tota per lamellas decidet, & ægri tunc reconvalescent: quo tempore purgandi, & postea adhuc per plures dies in cubiculis, præsertim si tempestas frigida est, conservandi, ut transpiratio aliquandiu libera conservetur, utpote quod ad sanitatem integram recuperandam valde hic est necessarium.

*Art. 233.* Quod si vero ægri aut parèntes hoc negligant, post tres circiter hebdomadas *tumore venenosis* immo totius sæpe corporis, sive *anasarca* cum vel sine febre corripuntur, immo & *tumoribus glandularum*, aliisque sæpius malis gravioribus; *urina* si-  
Quomodo  
anasarca  
post  
scarlatinam  
curatur mul solet fieri fusca ac turbida, & multi inde moriuntur. Cum vero novus hic morbus, (quem quidam pro altera febris scarlatinæ periodo habendum esse censent) ex retentis noxiis humoribus in corpore ortum trahat, optime ei medetur remediis, quæ hos humores e corpore educunt; id quod optime fit: 1. o alvum ducuntibus, iisque per intervalla repetitis, 2. o quæ eos per urinam, utpote quam viam natura, *urina* illa fusca ac turbida, indicare videtur, expellunt; qualis præ ceteris est tinctura tartari bis terve in die ad x. xv. vel xx. guttas exhibita; vel & huic liquor terræ foliatæ tartari; aut spiritu ni-  
tri

tri dulcis commodè admisceri potest; 3.º quando infantes aut pueri purgantia assumere renuunt; clysteribus quoque e decocto fol. fenn. satis apte purgantur. Sudoriferis vero hic nihil efficitur, dum sudor vix ulla ratione obtineri potest. Interea tamen partes tumidæ a frigore probe sunt defendendæ: nam si valde frigent, sæpe instantis mortis inditium præbent. Si febris combinata est, quæ frequentissimum hujus mali solet esse symptoma, mixturæ & potiunculæ temperante ex aquis diureticis paratæ, horis pomeridianis, & vespertinis sedulo exhibendæ, symptomata remediis suis propriis sunt oppugnanda.

## FEBRIS cum PURPURA URTICATA.

Diagno-  
sis.

*Art. 234.* Febris hæc invadit sæpius cum subtili sensu refrigerii in superficie corporis. Subsequitu rinde moderatus calor, hunc comitatur sitis non tamen adeo intensa; jungitur etiam aliqua capitis perturbatio, aut lenior ejusdem dolor. Tandem cum multo pruritu, & superficiali tensione, & rigore hinc inde exanthemata tam in facie, quam in reliquo corpore erumpunt.

*Art. 235.* Hæc exanthemata cutim superant, & cito in notabile augmentum adcrescunt, ac paucas quasdam eminentias, paulo latiores coloris pallido rosei urticarum læsiones referentes, offerunt. Nonnumquam cum tuberculis semi erysipelaceis, & asperitate serpiginea efflorescit, & aliquo modo erysipelatis indolem imitatur.

*Art. 236.* Febris si adest mitioris indolis esse solet, non tamen constanter permanent exanthemata, sed diurnis in primis horis evanescent, quibus etiam motus febiles remittunt. Circa vespèram vero, ubi febris revertitur, denuo prodeunt, & eo tempore etiam pruritus molestus, & ardens insigniter adfligit. Totus morbus intra triduum, aut quatrèdium finem suum assequitur, & si a febre immunis est, adhuc citius exitum sortitur. Una cum temperata diaphoresi exit, & post cessationem exilissimæ squamulæ ab affecta par-

Curatio. re secedunt.

*Art. 337.* Si umquam alibi certe in purpura metho-



CAP. I.      *Febris cum purpura &c.*      75  
 Methodus medendi debet esse temperatissima . Hinc essentias alexiphamacas ut ut temperatas , durante morbo hic excludimus , & solos pulveres febriles cum portionibus diapnoicis , & emulsioibus adhibere commendamus . Immo in purpura simpliciore non maligna , sed chronica , nec antimoniata quidem fixa adhibenda esse censemus , quoniam in sensibilibus plus commotionis excitant , quam imperitus forte crediderit *Confer. Præfat. Illustr. Stablii .*

*Art. 238.* Quando diarrhæ hæ accedunt pulvis corticis casarillæ ad grana decem pulveri febrili miscendus est . Sudores spontanei , qui durante morbo uon exigua incommoda efferunt , neque supprimendi , neque promovendi , sed prudente ratione moderandi , vel tolerandi sunt . In declinatione morbi essentiæ alexipharmacæ temperatæ cum lenissimis laxantibus locum habent .

*Art. 239.* Regimen coactum licet noxium sit , caveant tamen sibi decumbentes , ne exiguum etiam aeris accessum refrigeratorium admittant : hinc necessarium erit per illos dies , quibus purpura durat , lectum non sternere .

*Art. 240.* Quando exanthematum recessionis motus subest , potus aquæ calidæ ex. gr. thee commendatur , extra hunc autem timorem pro potu ordinario cerevisia dilutior , bene tamen defœcata , usui esse potest .

## M O R B I L L I .

*Sydenhami sententia .*

*Art. 241.* In morbillorum apparatu primo die ca-  
 lor & frigus se mutuo expellunt ; die secundo Fe-  
 bris sensibilis adoritur vehementi ægritudine , siti , lorum  
 inappetentia , lingua alba ( non vero sicca ) tussicu-  
 la , capitis atque oculorum gravedine , & somnolentia  
 perpetua stipata , plerumque etiam a naribus & oculis  
 stillat humor ( *signum certissimum* morbillorum ingruentium ) insuper maculæ latæ & rubræ in facie & pectore conspiciuntur ; sternutat æger , intumescunt palpebræ ( viz. paulo ante eruptionem ) vomit , sæpius

Historia morbi.  
 accurata.



pius tamen laborat diarrhœa cum dejectionibus subviridis coloris . Ingraveſcunt ſymptomata ad quartum uſque diem, vel aliquando ad quintum, quo tempore maculæ pulicum morſibus ſimiles prodeunt, quæ tam numero quam magnitudine auctæ ratematim coaleſcunt, & faciem maculis rubris variæ figuræ interſtingunt, quæ quidem maculæ a parvulis quibuſdam papulis rubris haud longe ab invicem diſſitis ſuper cutis ſuperficiem paululum elevatis couſtantur, digitorum levi tactu deprehenduntur, oculis remotis fugiunt : a facie ſenſim ad pectus, ventrem, crura, &c. ſe diſfundunt. Die ſexto aut circiter aſperescit facies emorientibus puſtulis; octavo in facie penitus evaneſcunt, non vix ullibi inveniuntur; tunc temporis augetur Febris, & ſpirandi difficultas, urget tuſſis, &c. *Morbilli omni vacant periculo, ſi modo perite traſſentur.*

*Art. 242. Morbilli ab Avicenna variolæ cholericæ appellati cum ipsis variolis coarvi ſunt, &*  
*Curatio.* quoad curam his cum illis ſatis convenit; Diacodium quotidie veſperi exhibendum eſt; linctus quoque & apoſemata pectoralia propinari poſſunt ad tuſſim leniendam . Sin vero ex calidiore regimine, vel aliter; febris, dyſpnœa, aliave accidentia poſt morbillorum deceſſum ſuperſint, *venæſectione* ſola curantur, quæ ſine metu in tenellis audenter celebranda eſt . In regimine intenſe calido exanthemata aliquando liveſcunt, & nigreſcunt, in adultis phlebotomia & temperatiore regimine ſublevantur aut pereunt; in peripneumoniam incidunt .

*Art. 243. Morbilli nonnunquam ( inquit Sylvius & omnes hoc ſcimus ) per aliquot dies diſtingui non poſſunt a variolis, ne quidem a medicis peritiſſimis, atque diu in praxi verſatis: longe proinde ſatius eſt in re dubia medicam vel ſuſpendere iudicium, vel dubie dumtaxat reſpondere .*

*Mortoni ſententiæ.*

*Curatio Art. 244. Quoad curam morbillorum, in primo in ſingultadio, ſcilicet, ante eſſoreſcentiam pauciſſima remedia*

ia sunt adhibenda, nisi gravissima symptomata super-  
 veniant, uti spasmi, enormes humorum colliquationes, diis.  
 xc. Si spiritus nimis irritentur, & in spasmos rapiantur,  
 remediis appropriatis compescendi sunt, nempe  
 pulvis & aquis cæphalicis cum tinctur. castor. pul-  
 vere de Gutteta, &c. Et si nifus spirituum inde non  
 minuatur, guttæ aliquot *laudani liquidi* propinari de-  
 bent. Ad *diarrhæam* quod attinet, satius est palliati-  
 va curatione ejusdem molestiam, quoties insolito more  
 ævit, minuire, quam contra naturæ legem eam pe-  
 titus tollere, atque ita ægrotantem occidere; absti-  
 neat æger a cerevisia, bibatque decoctum album, &  
 exhibeantur pulveres testacei; nonnisi extrema neces-  
 sitate ad *laudanum* perveniendum est. Ad tussim fe-  
 rinam ab acri lymphâ ortam quadantenus co-  
 hibendam conveniunt *mucilaginosâ*, *pectoralia*, *oleum*  
*amygdalarum dulcium*, &c. (privatim *syrupus e cor-*  
*al.* & *tinctura ejusdem*.) In tussi morbillorum patho-  
 gnomonica, sæpe permolesta, & convulsiva, & nonnun-  
 quam lethuli nullum remedium præstantius novi (in-  
 quit Harris) quam gummi tragacanthum copiosius sum-  
 ptum in linctu vel decocto pectorali solutum, & pulve-  
 ribus testaceis mixtum. Id enim gummi catarrhum ma-  
 xime lenire solet, tussimque inde prognatam, sympto-  
 ma morbillorum primum, sistere aut levare aptum  
 natum est, longe melius tutiusque narcoticis, quan-  
 tumcunque hæc laudantur a clarissimo Sydenhamo,  
 &c.

Spasmi.

Alvi  
fluxus.

Tussis.

Perip-  
neumo-  
nia.

Ophthal.

Diac.

rhœa.

Art. 245. Efflorescentia jam incæpta, imo eruptio-  
 ne plena existente quandoque suboritur *peripneumo-*  
*nia* cum respiratione anhelosa, strangulatione suffoca-  
 tiva, deglutitione læsa, &c. quo in casu, multo usu  
 fretus omnibus author sum, ut sanguis copiosius e-  
 ducatur; æque ac si æger morbilloso affectu corre-  
 ptus non fuisset. Idem in *ophthalmia* molesta ac pe-  
 riculosa faciendum moneo. Ad *alvi fluxum* in hoc  
 stadio compescendum non minus tutus quam neces-  
 sarius est opiatorum usus. Efflorescentia peracta, si mia.  
 Febris venenatis symptomatis adjuncta remaneat, a-  
 ctum est de ægro. Contra, si crisis fuit perfecta, rheæ.  
 cathartica hydragoga adhibeantur, ad lymphæ colli-  
 qua-



Uti-  
mum  
Adium.  
  
Tussis  
ferina  
super-  
stes.

quatae affectus exitiales impediendos: non tamen præ-  
propere massa sanguinis agitetur, antequam venenum  
fuerit omnino subactum. Quoties æger post morbillos  
*tussi ferina & perpetua*, vexatur; primo in loco ve-  
*næsectio* celebretur, & si opus fuerit, post unum vel  
alternum diem iteretur; & una cum *linctibus & me-*  
*dicamentis lenientibus* (quemadmodum in catarrho e-  
xhibere solemus) *cortex Peruvians* copiose exhibea-  
tur, & *opiatum* hora decubitus pro re nata.

V. S.

Art. 246. *Ad præcavenda dira symptomata in*  
*hoc affectu evenientia*, ab authore nostro enume-  
rata, phlebotomia mature, in morbi initio, cele-  
brata, & vomitorium exhibitum feliciter plerumque  
succeedunt.

Art. 247. *Qui Variolis laborarunt; non sunt adeo*  
*morbillis postea obnoxii, quare ætate grandiores non*  
*ita prompte insciuntur.*

Hoffmanni sententia.

Morbil-  
losæ fe-  
bris de-  
scriptio.

Art. 248. Morbillofa febris est catarrhalis exan-  
thematica, ut plurimum epidemica, qua motu vitali  
cordis, & arteriarum aucto, materia acris causti-  
ca, inflammans, ex interioribus, nervosis maxime  
partibus, sub forma macularum rubrarum ad cutem  
pellitur.

Differt  
a va-  
riolosa

Art. 249. In scholis & scriptis Medicorum plerum-  
que quidem morbilli simul cum variolis pertractantur.  
Nec negandum multum utrisque esse affinitatis. Utra-  
que enim febris exanthematica contagiosa, & epide-  
mica, omnibus hominibus perpetienda; utraque certis  
temporibus magis vel minus benigna, & sequitur quam  
maxime atmosphæræ statum, corporis dispositionem ac  
temperamentum.

Morbil-  
lorum  
chara.  
cteres &  
diffe-  
rentiæ.

Art. 250. Maculæ ut plurimum post tertium diem  
prodeunt, pro varia corporum, succorumque disposi-  
tione diversæ, in aliis latiores, & ampliores, in aliis  
minores, in quibusdam instar morsus pulicum, mo-  
do rubicundi & purpurei, modo pallidioris, & ma-  
gis plumbei aspectus. Maculæ hæ non elewantur in  
pustulas, ut variolæ sed lexiculari aliquali eminen-  
tia



19  
a planam cutis superficiem excedunt Petechias item  
amplitudine, & elevatione tantisper notabiliore supe-  
rant, longe mitioribus etiam symptomatibus stipantur,  
& malignitatis ut plurimum sunt expertes.

Art. 251. Interim Morbilli per se minus pericoli  
habent, & sæpius, potissimum in plebeis sine Medici Prognō-  
pe, debito tantum regimine, iterum discedunt. In-  
terdum tamen ob præcedentem, anomalam, insalubrem,  
hiuturnam, temporum constitutionem, malignam habent  
epidemicam in primis indolem, vel accidentales etiam  
possunt accedere causæ, ægros in discrimen adducen-  
tes. Malignitatem autem prodit virium impen-  
sa pro-  
ratio, extremorum frigus, inquietudo summa, vo-  
mitus, deglutitio difficilis, mentisque alienatio. Ma-  
lum dein quando aliæ maculæ: virulentia non expertes,  
et petechiæ, purpura, vel etiam pustulæ scorbuticæ  
complicantur, vel in fine cum vitæ discrimine super-  
veniunt. Tussis porro continua cum alvi profluvio, &  
inquietudine magna, infaustum præfigere solent even-  
tum. Neque boni ominis sunt sudores largi præsertim  
in profectionibus, qui ob malam diætam; & spirituo-  
rum potum, calidum alunt, & impurum sanguinem;  
ex facili enim admissio levi frigore, maculæ funesto ple-  
rumque eventu recedunt. Finito etiam morbo si tus-  
sica cum raucedine persistit, nisi cito idoneis succur-  
ratur remediis; in phthisim, & hecticam fit transitus.  
Qui autem morbillis occumbunt, maxime ex infantibus  
nono plerumque die suffocantur; in quibusdam superato  
morbo remanet alvi fluxus ad aliquot hebdomadas du-  
rans tabem cum morte demum inducens.

## V A R I O L Æ.

Art. 252. Nihil de Variolis ante medicos Ara-  
bes scriptum invenitur. Hic vero morbus antiquior  
est, quam vulgo creditur. Authores isti existen-  
tiam ejus usque ab initio septimi seculi temporibus  
Muhammedis investigarunt. (Vid. Freind hist.  
med. p. 188. vol. 2.) Variolæ ita appellantur,  
quasi parvi vari, quod cutem varient. Homini o-  
mnino soli. & semel convenit Variolis & morbillis  
affi-

**Chicken Pox.** *affici: in hoc autem censu non supputandæ sunt pustulæ variolosis similes, quas vulgo vocant the Chicken Pox; pueris familiares sunt; Variolis veris quidem similes sunt, quoad magnitudinem & figuram, sed in eo ab iis distinguuntur, quod Variolæ cum rubore & inflammatione insigniori appareant, hæ vero albidiores sunt, & veluti vesiculæ seroso humore repletæ, quæ intra triduum disrumpuntur, & exsiccantur, nullumque afferre solent periculum, & plerumque sine Febre erumpunt. Morbus est adeo benignus, ut nunquam sub curam medicam cadat. Variolæ (inquit Doctus) quoad ortum suum seminarium habent nobiscum connatum, quod aliquamdiu sepultum jacet, donec nata emergendi occasione ex latibulo erumpat, & massæ sanguineæ commixtum symptomata terribilia, & sæpe mortem producat, inter multas hominum myriadas vix unus & alter per totam vitam ab his immunis manet. Ex cadaverum sectionibus patet viscera universa in corporis cavitatibus contenta pustulis variolosis confertim affici, æque ac cutis externa.*

*Sydenhami sententia.*

**Art. 253.** Variolæ sunt *distinctæ* vel *confluentes*: **Variolarum distinctæ seu discretæ** cum rigore ac horrore invadunt; sequitur calor intesus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomituritio, dolor circa scrobiculum cordis, somnolentia, in infantibus præsertim; quandoque etiam paroxysmi epileptici, qui Variolas mox prorupturas, easque futuras esse mites ac benigniores plerumque prælagiunt; quarto ut plurimum die ab invasione erumpunt, & symptomata febrilia evanescent, nisi quod adulti in sudores sint propensi. In facie primo conspiciuntur pustulæ subrubræ, deinde collo, pectore, & universo corpore, quæ magis magisque inflammatur, & in dies elevantur, & subalbidæ fiunt, tute in interstitiis satis floridum colorem exhibente; die undecimo faciei tumor ac inflammatio recedunt, & pustulæ exarescere incipiunt; in hac Variolarum specie (si quando) die 14. vel 15. pereunt.



*Art. 254.* Confluentes cum discretis symptomata communia habent, nisi quod hic atrociora sint omnia, tertio die rumpit hæc species, aliquando citius, raro prius; interdum verò, licet oppido raro, ob gravius quod symptomata, lumbaginem doloremve lateris, &c. prius erumpunt, neque periculo vacant. Febris etiam durat, crescente morbo pustulæ non in spectabilem molem attoluntur, uti in discretis, sed sibi invicem implicitæ vultum omnem contingunt, & illum in tumorem elevant, dein ad instar pelliculæ albæ in cutis, superficie cospiciuntur. Præterlapso die octavo pellicula alba quotidie exasperatur, & ad colorem fuscum vergit, eoque magis quo Variolæ confluerunt. *Magnitudo morbi a facie maxime æstimanda est, potius quam aliquo corpore.* In hoc genere adest in adultis salivatio, infantibus diarrhœa; salivatio nonnunquam sub primum eruptionis tempus se prodit, interdum post diem unum vel alterum, die fere undecimo saliva viscidior facta difficulter excreatur; ægri suffocationem tentans, & circa id temporis ut plerumque cessat, & tunc ejus loco manus intumescere solent, aut debent, diarrhœa non ita mature infantes invadit; sub vesperam exacerbat morbus. Variolis discretis laborantes octavo, confluentibus vero undecimo die maxime intereunt. Interdum accidit pleuritis. interdum coma; interdum maculæ purpuræ (*totidem quasi sphacelis*) pustulis interspersæ (mortis fere semper prænuntiæ; quandoque mictus sanguineus, & aliæ Hæmorrhagiæ, quæ idem onnantur, nonnunquam urinæ suppressio.

*Art. 255.* In confluentium genere æger (ut dixi) maxime periclitatur (a primo insultu computatione facta) die undecimo viz. in maxime vulgari confluentium genere, in crudiori adhuc 14. crudissimo 17. rarissime 21. ego Variolosum ab usu lectuli interdiu semper arceo usque ad sextum diem a prima morbi invasione; quartum ab eruptione, quo tempore omne pustularum ægmen in conspectu est: posthac eundem lectulo committo usque ad morbi finem.

*Art. 256.* In confluentibus (ut recte inquit Doxeus) periculosa plena res est alex, & medicus occasionem habet suas tentandi vires, & ostendendi, *Allen Pars I.*

Regula  
fere  
semper  
obser-  
vanda.

Curatio

quid



*quid in arte medica calleat.* Indicationes curativæ duæ sunt, nempe, 1. ut æquabilis tenor ebullitionis conservetur; 2. ut pustulæ debito modo sustineantur, regimen calidum vitandum est; *gradus caloris earum expulsiōni accommodatissimus naturalis omnino est*; non opus est, ut æger ante diem quartum (255.) lecto ad- dicetur; neque ut ad propellendas variolas ullum re- medium sumat; quarto vero die, si eruptio ex votis haud succedat, exhiberi licet cardiacum aliquod blân- dius. Discretum genus ex sua natura plerumque omni- vacat periculo. In confluentibus æger a sudore, quan- tum fieri potest, prohibendus est, & ptyalismus est in vigore conservandus; promovetur autem assatim biben- do cerevisiam tenuem vel liquorem alium non nimis calefacientem. Adultis propinare soleo *paregoricum cum laudan. liquid. gut. xiv. vel syr. de mecon. ℥j.* hora sexta vel septima vespertina singulis noctibus post ple- nam eruptionem ad morbi usque finem; temporius au- tem *hypnoticum* quam pro recepto more præscribo, quoniam exacerbatio caloris quotidie sub vesperam fe- re reperitur, ex quo non modo incommodi nihil, sed magnum emolumentum, quod frequentius experientia didici. *In hoc genere diarrhœa in infantibus est sa- lutaris, & non temere sistenda, contra in discretis.* De venæsectione die octavo, & de auræ liberaliori exponendo, si quis velit, authorem consulat. p. 153.

Nota  
bene.

&c. Cum saliva admodum viscida evadat, uti soleo gargarismate sequente. ℥j. Cort. ulmi - vi. rad. gly- cyrrhiz ℥ss. passular. enucleat. N. xx. ros. rub. p. ij. coq. in q. s. aq. font. ad ℥ss. colatura dissolv. oxy- mel. simpl. mel. ros. ana ℥ij. m. f. gargarisma. In- terdum emeticum propinandum est. In urinæ suppres- sione æger e lecto debet eximi. Pustularum depressio & diarrhœa in variolis discretis medicamenta cardia- ca postulant. Febris illa, quæ die undecimo, &c. ad- oritur, diversa est ab ista, quæ eruptionem præ- cedit, nihil enim est aliud, quam *Febris putrida proprie dicta hæc Febris secundaria*; ad hanc autem fugandam nihil efficacius præstat, quam copiosa san- guinis educio: non enim nunc cum variolis res est sed *Febre putrida*; mittendus est itaque sanguis ac

§x. vel xij. & anodynum bis in die propinandum; ob immensam alvi constipationem præscribere soleo *elect. lenitiv.* §ij. in aqua lactis solut. Nihilominus anodynum statò tempore continuandum est; si primà vice votis non respondeat, iteretur die proximo: atque hac ratione tam *veniesectio* quam *catharsis* per intervalla repeti possunt; prout Febris mos atque ægri inquietudo postulare videntur; donec tandem res in vado sit. Sched. mon. p. 81. &c. In Variolis confluentibus magna est virtus *spiritus vitrioli* a 5. vel 6. morbi die usque ad finem copiose in cerevisia ten. exhibiti; comoda & incommoda hujus remedii p. 256. & ubertim recensentur.

*Art. 257.* Variolæ anomalæ: *Discretæ* hæ a legitimis discriminabantur, quod erumpébant die 30. illæ 40. pustulæ minores fuerant: sæviebant tamen malis; & ante maturationem frequentius nigrescebant; Ptyalismus (ut in confluentibus aderat) immediate post eruptionem: *Confluentæ* hæ ab aliis discrepabant; quod nunc die secundo; nunc tertio se primum monstrabant tumore subrubro atque uniformi; quibusdam locis; in femoribus præcipue; vesiculæ, ambustorum ad instar; sero limpidò distentæ eminebant; quod rupta pelliculâ copiose affluebat; subjectâ carne nitudine & sphacelo quasi affecta; periculo non vacante diem septimum; in aliis conflentibus dies undecimus (ut plurimum) est criticus. Postremo hæ cæcioris naturæ & magis inflammatoriæ; ideoque temerato regimini indulgendum est. *Hygrogala* ex tertiarie aquæ & lactis unâ simul coctis ægri palato & votis plurimum respondet; & ptyalismum feliciter promouit.

Variolæ  
anomalæ  
discretæ.

Confluentes.

### Mortoni sententiâ.

*Art. 258.* Variolarum quatuor sunt stadia, viz. apparatus, erutio, maturatio & declinatio; in quibus tria occurrunt symptomata, quæ diversam medendi methodum postulant.

Quatuor  
stadia  
variolarum.

*Art. 259.* Primum stadium est a morbi ipsius incipit usque ad eruptionem generalem. In hoc stadio prima tenuis & pallida; præsertim si adsit frequens

Primum  
stadium.



Diarrhœa.

miſturitio, male ominatur; urina rubicunda & contentis ſaturata contrarium indicat (inſolitus aliqualis dolor vehemens, præſertim colicum emulans, eſt peſſimum ſignum.) Diarrhœa in hoc ſtadio non permit- tenda eſt, quin *decocto albo* & repetitis *laudani* doſibus eſt cohibenda, vel aſtringentibus ſiſtenda. Vomitio in hoc ſtadio non ſtatim ſupprimenda eſt, ſed potius (niſi valde enormis fuerit) cum repetitis hauſtibus liquo- ris poſſetici carduati, vel cum pauco ſale Vi- trioli leniter promovenda eſt: Evacuatione autem hac levi peracta, vel ſi vomitio ex morbi ipſius genio modum excedat, illico tumultum ſpirituum compeſcere oportet, eorumque vires conſervare alexipharmaco ali- quo remedio cum opiato commixto, & poſt juſto interval- la repetitio; ſequens eſt formula mihi familiaris. *℞. Aq. card. lact. alexiter. hord. menth. ſtephan. ana ℥ij. ſal ab- ſynth. gr. xij. pulv. rad. ſerpent. virgin. e chel. cancr. comp. lapid. Contrajerv. ana ℥ſſ. ſyr. caryoph. vel men- th. ℥ſſ. m. f. julap. de quo capiat ægrotus coch. ij. iij. vel iv. quarta quaque hora, addendo ſingulis doſi- bus laudan. liquidi guttas aliquot pro re nata.* „San-

Dolores ſpafmo- dici.

„guis (inquit *Liſter*) in Variolis non propriè mit- titur, ſed ex accidente tantum ut ſymptomati ali- cui vehementiori ſuccurratur. In dolore capitis artuum vel lumborum, item in dolore pleuritico ſeu peripneumonico, ut etiam quandoque in colico neceſſaria eſt *venæſectio*, ut ſymptomata iſta averrun- centur; *viſicatoria* etiam & *opiate* hic locum habent præcipue autem in affectibus comatoſis. Ubi vigilæ

Vigiliæ.

in hoc ſtadio pertinaces fuerint, non raro in proxi- mo ſtadio, exanthemata confluunt, quorum eruptione deliria, ſpafmi, cæteraque funeſta ſymptomata ſuper- veniunt, quo nomine hæc ſymptomata venæſectione & opiatibus, ut ut ſpirituum vires inde minuantur, op- portune cohibere par eſt, adhibitis interea viſicatoriis & alexipharmacis. „Inſolitus aliquis dolor vehe- mens ante eruptionem Variolarum, privatim do- lor colicam paſſionem emulans, eſt peſſimum ſi- gnum, & fere ſemper lethale, ut plus ſemel ob- ſervavi præſertim ſi adſuerit etiam *miſturitio*.”

Stadium

*Art. 260.* In ſtadio ſecundo exanthemata parva in- ſtar



star acu puncturatum primo in facie, collo, pectore, &c. erumpunt tumore renitente, & rotundo; die secundo bases suas ampliant, & tertio (ultra quem hoc stadium non excurrit) in summitatibus acuminantur; quo longius est hoc stadium, eo periculosior est eventus; in hoc stadio in benigniori saltem genere, ubi nullum adest funestum symptoma! haud par est ullo remedio naturam laceffere, utpote quæ propriis viribus instructa sine artis suppetiis satis valide suo officio fungi potius est.

*Art. 261.* Triduo eruptionis elapso variolæ; sicut Stadium  
alia quævis tubercula inflammata, concoqui incipiunt; & lymphæ venenata per glandulas cutaneas naturæ lege colata acrimoniâ suâ cuticulam a vera cute separat; unde apices exanthematuum, paucarum horarum spatio, primum albescendo quadantenus intumescunt; dein lymphæ eadem pro morbi indole & naturæ viribus citius vel serius in pus mutata flavescunt, aut saltem colorem cineritium vel subfuscum obtinent, ubi desinit hoc stadium. Durante maturatione variolarum benignarum nulla exsurgit indicatio, sic forsân adhiberi possunt *laudani liquidi* guttæ aliquot ad dolorem leniendum, & somnum conciliandum. Inter maturandas variolas, si tarde procedant, *℞. Lentium crasse contus. ʒj. ficuum ping. par. vj. ras. C. C. ʒjss. coq. in liquore posset. ℞ij. bibatur copiose ad libitum;* & si adsit ptyalismus commode usurpatur gargarisma sequens. *℞. Lentium crasse contus. ʒj. rad. alth. ʒj. ficuum ping. parv. vj. vel vij. hord. mundat. p. j. glycyrrhiz ras. ʒij. coq. in q. s. aq. font. ad ℞ij. collatur. add. mel. ros. ʒjss. m. vel gargarisma variolos.* Fuller. Vitentur acida in gargarismatis, nisi in maxima deglutiendi difficultate; deficiente salivatione, promoveatur urinæ profluvium exhibendo dosim unam vel alteram pulveris *Æthiopici*.

*Art. 262.* Stadium ultimum Variolarum est earum declinatio, in quo exanthemata pure maturo, & laudabili referta primum incrustari, & scabie subflava obduci incipiunt; dein post unum vel alterum diem concrefcente exsiccantur, & in arida tubercula ubique mutantur, quæ sensim emollita sponte evanescent.

Stadium  
ulti-  
mum.

Raro quispiam hoc morbo interimitur, nisi in declinationis stadio, scilicet in variolis benignis; de his etenim ut plurimum hætenus locuti sumus. Declinatio cum *anæsthesia*, & appetitu restituto optime significat. Petechiæ se = vesiculæ ilmiæres in hoc stadio erumpentes funestum eventum denuntiant; deliria, vigilæ, subsultus tendinum, &c. in hoc stadio pejus ominentur, quam in præcedentibus: paucissimi enim vel nulli hoc modo affecti convalescunt; scabies diu pure scatens, atque inde sæpe decidens, & renascens, meliorem sortitur eventum, quam ea, quæ de repente exarescit; variolæ, quæ scabie sessili & adhærenti obducuntur, malæ præfagiunt.

*Art. 263.* Ubi Variolæ fuerint figuræ exactissime rotundæ, discretæ, & margine admodum rubro circumcinctæ, neque petechis, eruptionibus miliaribus, vel quavis alia nota exitiali, interpunctæ, & primo maturationis die in summitate albæ, tumore turgidæ, & die secundo circa basin auctæ, & in summitate acuminatæ, minus pellucidæ, & tertio materia in pus convertatur; eventus, felix duodecimo saltem morbi die insecuturus expectandus est.

*Art. 264.* Quatuor sunt variolarum malignarum gradus, viz. confluentes universaliter, confluentes particulariter, discretæ verum admodum parvæ & coherentes, maxime confertim ubique erumpentes, & denique discretæ cum petechiis & eruptione miliari conjunctæ. Primi gradus sunt, quando cutis universa erysipelatoso tumore (maculis nigris hic illic interspersis) cum æquali superficie quadantenus crassescit; post triduum curis albescit, & pergamenæ speciem inducit; atque hæ sunt variolæ maxime exitiales; ægrum ultra secundum maturationis diem nunquam superstitem novi. Variolæ secundi gradus magis vulgares sunt, quando cutis faciei sola erysipelatosa est, & primo maturationis die pergamenæ speciem refert, dum in artubus & trunco corporis exanthemata fuerint fere discreta non tamen regularia; vix enim oculis distinguuntur ab efflorescentia morbillosa, vix apices tollunt, sæd sæpe livescunt, unde mortem instare certo præfagire licet. Variolæ malignæ tertii gradus, ubi quasi discretæ verum admodum parvæ & coher-



rentes, quæ non acuminantur, sed in acute solummodo conspiciuntur, ac si ab urticæ plaga exasperatæ) donec sub initium maturationis albescentes confluant & speciem pergamenæ exhibeant. Rarius quenkum hac specie affectum, nisi ope Ptyalismus ciutius protracti, ingentis urinæ profluvii, vel intumescentiæ artuum diuturnæ, ad decimum quartum vel decimum quintum morbi diem superstitem novi.

*Art. 265.* Gradus ultimus est, quando Variolæ e- Gradus ultimus  
rumpunt quidem discretæ figura & magnitudine regulares, verum vesiculis aqueis, vulgo *che Whith-hives*, petechiis, vel maculis lividie in interstitiis, præsertim in collo, pectore, & artubus distinctæ; atque hæ non minus sunt exitiales quam confluentes.

*Art. 266.* In Variolis malignis Febris continua mali moris post eruptionem remanet cum lingua arida, pulsu debili, &c. Neque prorsus exulat, ut in benignis solet: materia enim morbosa, vel propter malignitatem, vel morbi magnitudinem, per glandulas cutaneas satis protrudi nequit, unde dira symptomata evenire solent, nimirum hæmorrhagiæ admodum periculosæ, quæ ut plurimum, (maculis purpureis & nigris eodem tempore inspectum venientibus) funestissimæ sunt, & vix aut ne vix arte cohibendæ, nisi forsitan Vitrioli fræno præpotenti (aq. styptic. reg.) obsignari possint; *nihil tamen proficimus, si non una possimus vesicatoriis & alexiteriis generosissimis vires spirituum pene extinctorum denuo resuscitare*, venæsectio mortem eccelerat. Micturitio licet non adeo formidabilis, pessime tamen ominatur; in hoc symptomate sublevando *cineres bufonum* egregias obtinent vires (ut mihi usu compertum est dos. ʒj. cum aliis alexiteriis quarta vel sexta quaque hora. Dolor gutturis & deglutitio impedita est symptoma quandoque maxime affligens & molestum; fauces itaque externæ ab aeris injuriis pannis laneis mollibus duplicatis muniri debent, quæ plus valent, quam croceata, vel alia quæcunque amuleta; & usurpentur gargariis appropriatis, &c. Salivatio copiosa, & diu protensa cum insigni capitis & faciei intumescencia bene significat; ptyalismus vero brevis & de repente suppressus, nisi profluvio urinæ, aut intumescencia extremorum

Curatio symptomatum.

Hæmorrhagiæ.

Micturitio.

Dolor gutturis.

Salivatio.



xcipiatur r malum omen exhibet; salivatio diarrhœa excepta pessime significat.

Post va-  
riola-  
rum de-  
clinati-  
onem  
inappe-  
tentia  
& ca-  
lor he-  
cticus.

Paroti-  
des, &c.

Furun-  
culi &c.

Gangre-  
na & ca-  
ries.

Tumo-  
res œde-  
matosi.

Art. 267. Morbosi quidam affectus quandoque post Variolas suboriri solent, inter quos inappetentia primum locum vendicat, quæ frequenter cum calore hepatico conjuncta est, quod in casu ego multo usu doctus *alexifarmaca* (quod cæteros professores serio monito) ubi calor; fuerit continuos jugiter ministranda duco; *corticem* autem *Peruvianum*, ubi calor statis periodis recurrit, cum felici successu exhibendum impetro; & deinde postea ad alvum subducendam tuto progredior. Parotides nonnunquam sub finem variolarum suboriuntur, quæ diu tanquam strumæ sine calore vel rubore permanent; *discutientibus* non sunt tentandæ, sed potius *fortibus maturationem promoventibus* tractandæ sunt. Eadem via procedendum est in furunculis, scabie saniosa, ulceribus mali moris, impetigine furfuracea, &c. viz. *alexipharmacis* & *febrifugis*, ab evacuationibus religiose abstinendo. Gangræna & caries osium post variolas nullo medicamento cedunt. Tumores œdematosi *frictionibus*, *fortibus lixivialibus* & more hydropicorum curandi sunt. De dolore capitis post variolas.

### Freindii sententia.

Purga-  
tionis  
usus in  
Febre se-  
cunda-  
ria.

Art. 268. Sunt nonnullæ Febres, quæ *purgantia* commode recipiunt, sunt etiam, quæ omnino desiderant (sed de hac re nondum satis accuratæ ab auctoribus traduntur regulæ) ex quibus nullam aliam æque *purgationi* opportunam reperio; ac eam, quæ variolas confluentes, maturitate postularum aut vigente aut jam inclinata; semper excipit; ea quippe Febris uti omnium maxime putrida est, & periculi plena, ita præ cæteris curationem hanc aptius recipit. Atque hanc præ aliis medendi rationem in putridis hisce Febris, quæ variolis superveniunt, suadet Sydenhamus. Mihi quidem sæpius usū venit, ut in Variolarum statu, ubi postulis exarescentibus Febris nihilo fecius invaluerit, ad *purgantia* confugerem, quæ ita periculo vacare, ita commode abhiberi posse expertus sum, ut multorum vitas ab hac maxime medendi via conservatas esse haud absutde dixerim.

*Doctrina de usu phlebotomiæ & catharsi in Variolis confluentibus post imperfectam crisin in literis a peritissimo D. Cade ad eundem datis succincte admodum continetur; en ejusdem summarium.*

*Art. 269.* In Variolis confluentibus, quamdiu faciei tumor & inflammatio manet, & saliva recte fluit, a venesectione & catharsi (pari ratione ac furunculo maturante) prorsus abstinendum esse duco. Scilicet, ne istæ evacuationes, materiæ morbidæ a massa sanguinea, separationem, & per pustulas, tanquam per tot phlegmonas, (cui unico hoc tempore natura incumbit) ejectionem obturbarent. Insuper, procedente morbo, si eo tempore, quo facies detumescere, & ptyalismus decrescere incipit (quod die nono vel decimo ab eruptione accidit) si his, inquam, diebus manus debito modo tumeant, & nulla malæ notæ appareant symptomata, haud omnino (me iudice) vel phlebotomia vel catharsis, adhuc indicatur; sed totum negotium recte committitur naturæ. Interim tamen in hoc morbi statu enemata quotidie injiciendum præscribo, quo alvum facibus exonerare, & Febris furorem coercere curo.

*Art. 270.* Attamen, facie diebus prædicti criticis detumescere, quoties (quod nimis frequenter evenit) pustulæ corporis non turgent maturo pure, nec manus intumescunt: unde (nempe a materia morbida in sanguinis massa remanente eamque inquinante) ardens Febris nascitur; respiratio brevis & frequens oritur, corporis jactatio, & obstinatæ (narcotici incassum exhibitis) vigilæ urgent, quoties equidem diris his symptomatibus vexatur æger, medico incumbit per venesectionem & medicamenta leniter purgantia, sæpiusque debitis intervallis repetita, humorem peccantem detrahere, & eo, quo possit: modo, laboranti, subvenire. In Variolis denique confluentibus, licet facies & manus & pustulæ corporis debito modo, ac tempore, intumuerint, & saliva satis copiose statuto tempore fluxerit; si tamen, Ptyalismo disinente & licet partibus jam subsidentibus, Febris utcumque (quod in hac morbi specie ut plurimum accidit) gravior assidue inhæreat, & symptomata, ex hac natura (utpote anhelosa respiratio, vigilæ, anxietates, tum pallida & diluta urina indefinenter urgeant agra-

Quando  
neque  
venese-  
ctio.  
Neque  
cathar-  
sis con-  
venit

Quando  
utraq-  
ue  
evacu-  
ationes  
sunt  
neces-  
sariæ.



tantem, rebus sic stantibus, necesse habet medicus sanguinis quantitatem *venæsectione* minuere, ( nimirum ut exinde pars reliqua magis placide per vasa fluat ) & materiam morbidam ( quæ per pustulas, jam induratas & crusta obductas amplius transire nequit ) *Catharsi* sæpius repetita evacuare : his enim evacuationibus omissis, semper evenit, ut vel memorata symptomata in dies augeantur, & inter diem duodecimum, & vigesimum quartum lethalia evadant; vel humor putridus in pulmonibus extravasetur, eorumque vesiculas corrumpat; unde ægrotus miseram vitam paulisper trahit, & brevi moritur tabidus.

*Art. 271.* Anhelosæ respirationi, crisi superveniente *phlebotomia* feliciter ac unice occurrit, quæ nisi confestim peragitur, actum erit de ægroto, neque hoc in casu pulsus humilis & angustus me terret; quippe sæpius observari vacuato sanguine arteriam fortius vibrasse: unde constat pulsus obscuritatem non infirmitati virium, sed humoris lædentis oneri, deberi. *Venæsectio* tamen mictum cruentum non modo non cohibet, sed auget, & mortem in procinctu stantem accersit, hoc tamen funestum fati impendentis prænuntium ) *Camphora* bis in die exhibita & acidis larga manu propinatis ) amovi, ægroque brevi morituro ad tempus succurri: sed ut vera fatear, ne unum quidem *Variolis* affectum, cui urina cruenta fluxerit, diem 16. ab eruptione supervixisse notavi, De rationibus, quibus innititur hæc praxis, videatur auctor. *Atque ita purgationis methodum in Febre secundaria tanquam unicam salutarem vendicat* D. Freind & alii apud illum nonnulli magni nominis medici. Ego vero, qui sum tardioris ingenii, rurique dego, de hac re aliquanto dubius adhuc hæreo. Hi viri, ingentia certe artis nostræ lumina, seculique ornamenta, satis ingeniose ratiocinantur, omnesque fere summa eloquentia victos in illorum sententiam facillime descendentes inveniunt: sed sola experientia duce caute admodum progredi debeat. In praxi mea per viginti circiter annos clysmatum injectionis utilitatem deprehendi; sed cathartica nonnisi rarissime propinare ausus sum.

Optan-



Optandum erat, quod viri præfati meritissimi numero-  
siorem historiarum seriem tam morientium quam viven-  
tium protulissent, ut in re adeo ancipiti æquius judi-  
cium ferre potuerimus.

### Farrago sententiarum.

Art. 273. Variolas esse morbum novum satis demon-  
stratur, quod in multis mundi partibus nunquam visæ Variolæ  
fuerunt, ut apud *Indos occidentales* ubi nunqua appa- morbus  
ruerunt nisi postquam Hispani eo pervenere; siquidem novus.  
per contagionem *Æthiopis* cujusdam, illuc delati, ma-  
gnam indorum partem sustulerunt, ut testatur R. a *Fon-*  
*seca*. Helbigius indubitanter affirmat incolas *Indiæ o-*  
*rientalis* Variolas nunquam tentasse ante commercium  
*Hollandieum*.

Art. 273. In Variolis *Alfaharavius* omnes infrigi-Regimon  
dantes medicos nostri seculi multis parasangis anteivit; frigi-  
maxime in primo Variolarum tempore, nempe, in san- dum.  
guinis missione ad syncopem, & frigidæ immensa quan-  
titate, & confertim exhibitæ, potione; eaque sæpius  
repetita, paucis horis; at quantum video, sine suc-  
cessu; his enim non obstantibus, venenum intra ha-  
bitum corporis restitabat.

Art. 274. Illud tantum (inquit *Lister*) curiosius Sanguini-  
animadverti (in Variolato cum maculis purpureis hæ- nis tex-  
morrhagia narium & mictu sanguineo) sanguinem re- tura in  
frigeratum tenerrimum fuisse, & ejus crassamentum Variolis  
rubrum quod molliori pennæ pluma percussum facile malignis.  
dividi potuerit. In aliis autem multis, quibus urina  
incruenta, sanguinem e brachio missum adeo aquatum,  
putridumque esse vidi, ut fluctuaret crassamentum in  
vase, non aliter quam ipsum serum; neque ullum  
servatum memini in tanta pestilentia, (71.) *Va-*  
*riolæ* precedente *crapula* accidentes, ut etiam *lu-*  
*xuria* & *intemperantia* deditis, plerumque gravio-  
res sunt, & pessimi moris; & fere semper lethales. Vires co-

Art. 275. In variolis confluentibus (inquit idem chinel.  
author) hunc in modum præscripsi; ʒj. Croc. ʒj. co- in vario-  
chinel. ʒß. sacchar. tantillum; m. pro chart. viij. ca- lis con-  
piebat ægra unam quarta quaque hora cum coch. j. fluenti-  
bus.  
vel

vel ij. aq. theriacal. per triduum & postea sexta quaque hora; item diacod. ℥j. mane & vesperi; & convaluit; & pro alia fœmina ad eundem fere modum, ℥. Croc. 3℔. cochinel. 3℔ sacchar. cand. .j. m. pro chart. vj. cœpit. unam tertiâ quaque hora.

Rarissimi me ali. quis bis inficitur. signum salutare. Art. 276. Ego (inquit idem) neminem bis infectum nemini, præter unam fœminam, quæ in hac urbe (Eboracensi) me teste intra annum variolis bis decubuit, & convaluit.

Remedia noul- la fin. gularia. Art. 277. Nihil observatione dignius est (inquit Ettmullerus) quam anhelitus & vox in variolis; ubi enim prompte recteque agitur respiratio, vox facile sequitur, neque raucescit. admodum salutare signum est. Stercus equinum in variolis est sordidum quidem. sed egregium remedium, promovet sudorem, præferat guttur, &c. a quibusdam etiam deprædicatur Stergularia, *cus ovinum*. Nec locum infimum obtinet oleum sem. lini, vel amygdalarum dulcium, ut præclicis quibusdam peritis satis notum est. Quodnam sit istud remedium, cui vires supereminentes Vvaldschmidius & Dolæus attribunt, plane nescimus: optandum sane esset, quod tale medicamentum, de quo loquuntur in morbo tam exitiali in rerum natura revera daretur. De hoc remedio hæc habet Vvaldschmidius; utimur alio quodam remedio in forma liquida, quod a primis statim diebus usque ad finem in adultis ad cochleare unum dari potest, quo ipso puto reconvalescentiam, divina adjuvante gratia, certe promitti posse, ut ut gravissima adsint symptomata; præcipue autem hoc remedium est dicatum inflammationi, quo & externe uti possumus. Et alibi: omnibus commendo liquorem contra Variolas a D. D. Dolæo & me millies expertum, quem & nos una invenimus. Multo uberior est Dolæus in hujusce specifici laudibus, ut & videre licet, p. 574.

Art. 277. Variolæ acutæ perforatæ tardius curantur & crustas diutius retinent, unde cicatrices fœdiores relinquuntur; ideoque naturæ satius sunt relinquendæ. Maculas a variolis relictas (observante Barbette) præprimis delet oleum myrrhæ per deliquium ex albuminibus ovorum paratum, ut & oleum.



vitellorum ovorum. Si quis linimentum velit, sequens in usu apud medicos Londinenses est elegans præscriptum; ℞. Ol. amygd. dulc. ℥iſ. cert. alb. sperm. cet. ana ℥j. balsam. Gileaden. ℥ſs. f. s. aliniment. Ulcera corrosiva ( inquit Bonetus ) in facie & alibi optime sanantur cum spiritu vitrioli melle rosaceo ad sufficientem aciditatem permixto; semper respondet voto med-  
Ulcerâ  
corro-  
siva.

Art. 278. Remedia in hoc morbo insigniora, præter jamme morata, sunt, quæ sequuntur: Kermes, gum. tacca, viperina, cinnabaris antimonii, tinctura bezoardica, tinctura corallor., decoctum rubicundum. decoctum variolosum, gargarisma variolosum, be-  
 hoch rubrum, unguentum de hismuth, ad foveas Bat. &c.

Art. 279. Merito admiramur omnium morborum frequentiore quavis Regione tanquam disputationum causam ministrasse, ut nondum de curationis methodo sententiæ convenient. Ut ut verum sit in calidis Climatibus oportere, methodus curativa ab ea differat quæ in frigidis, temperatisque optime cedit, fieri tamen potest ut de generalibus statim adhibendis conveniatur. Sed quovis modo res se habeat ait *Dictionaire Medicinal* Auctor Bruxellensis nunc eam tradam methodum, quæ diversis in Climatibus etiam ad invicem oppositis mihi feliciter experiri licuit, quam etiam quispian ullo absque periculo ubivis locorum adhibere poterit, addendo simul id, quod magis congruere aeri, in quo degit, observaverit.

Art. 280. Vix ac signa perspecta habentur hujus morbi ingruentiæ qualia sunt: Vomitus, Capitis dolor, alvi fluxus, dolor lumborum, sed præcipue dori & ad cordis scrobiculum (quod certius signum est) ægro venam secare necessarium est in brachio semel, iterumve. Si vero somno lethargico æger teneatur, dandus ei tartarus emeticus cum manna in jure car-nium, quia hisce in circumstantiis hoc præstantius nullum vomitorium datur, quod adhiberi. ideo debet, quia genus nervosum concutere, & excitare aptum est; quod si multis cibi assuetus sit æger, vel hesternaluce alimentis confertim indulserit, vel eadem aliquot  
 fu-



supra diebus copiose ingurgitaverit, sequens propinare ei Vomitorium præferimus; ut inde stomachus a cruditatibus infarciendis vindicetur.

*℞. Vini Emetici unc. j. ol. amygdal. dulc. unc. sem. syrúp. violat. unc. j. aq. card. bened. unc. ij. aq. cinamom. hord. ℥ij. m. f. haustus unica dosi pro adultis, cujus dimidium infantibus; & pueris ab ætate v. usque ad x. annor. inservit; quarta pars junioribus, &  $\frac{3}{4}$  partes ab ætate x. annor. usque*

*ad xvi. Hoc vomitorium nisi post binas sultem phlebotomias juberi non debet; nec porrigendum est; nisi ut memorata impedimenta tollantur. Postea sequenti Ptisana æger utatur.*

*℞. Radic. scorzon. Graminis ana man. j. bulliant per hor. quadrant. cum Aq. font. ℞iv., quibus add. in fine ebullitionis Glycyrrizæ concisæ ℥ij. pro potu ordinario. Si autem Elixir Theriacale paratum profuerit, de eodem exhibentur ter vel quater in die gutt. iv. pueris decimum ætatis annum non superantibus; gutt. viij. ab anno x. usque ad xiv. & gutt. ij. ætatem habentibus quarto anno minorem; cum supradictæ Ptisanæ cochleare uno. Loco hujus alexipharmaci exhiberi possunt nonnulla meri cochlearia cum paucis Croco, pulvere C. C. & succini, vel cum prædicta Ptisana gr. vi. xij. pulv. viperin. vel Theriac. mixtim.*

*Art. 281. Quod si Febris symptomata admodum non sint vehementia, opus Naturæ relinquendum absque sanguinis emissionem, purgationem, & vomitu suscipiendis, metu ne a surgente conflictu eadem turbentur; a quo victrix ullo absque auxilio ut plurimum solet emergere. Necesse solummodo est, ægrum in loco decumbere, ubi aer temperatus adest; cavendo ne stragulis nimium obtegatur; tum igne medio-cris cubile calefaciendum; quod idem apertis fenestris circa meridiei horas, si tempus sudum, per unam vel alteram horam ventilabitur; curando tamen diligenter ut; quamdiu fenestræ apertæ manent, velis ductilibus ægri lectum muniatur; quæ clausis deinde fenestris ad ejus pedes contrahi poterunt, ut aerem libentius possit respirare; sic aer quotidie hac regula dili-*

diligenter; & scrupulose observata utiliter renovabitur, quia major ægrorum pars neglectu renovationis aeris magis ac qualibet alia de causa occumbit: Hoc sane regimen tutius est quolibet alio, quod possit adhiberi in variolis; in quibus tamen, & complicatæ sunt, & confluentes, vel purpuratæ ad validiora item confugiendum est auxilia, cujusmodi insigniores Medici præscribunt.

Art. 282. Quando pustulæ albescere incipiunt, abluendæ sunt urina pueri x. vel xii. annis nati; qui sanus simul sit; & robustus, tum sequenti unguine deliniendæ.

℞. Adipis suilli aqua 24. vicibus diluti q. v. stercoris vaccini tantundem, frixentur simul; dein affundantur in sacculum à fumario suspensum. Quod ab eo exstillat pluma albescentibus pustulis illinitur. Hujusmodi inunctio cutem emollit, atque laxat, unde minorem resistentiam cum experiatur subjecta materia, sibi viam aperit; & egreditur, nec tempus invenit carnem erodendi, foveasque ibidem imprimendi. Eadem item quovis alio unguento præstantior est & commodior pro quavis ætate, & quolibet ægro. Ceterum utile ac laudabile est alvum purgare postquam omnes dies critici elapsi sunt, qui ad 21. usque extenduntur; sed hoc ipsum ultra diem trigessimum peragendum consulo.

Art. 283. Febres quæ variolas comitantur, modo benignæ sunt, modo vero malignæ, quædam variolæ adeo parum malignæ dantur; ut sponte sua & nullo pharmaco feliciter decurrant; quemadmodum in rusticis cernimus; quorum pueri hoc morbo detenti hac illaque vagari non cessant. In urbibus autem periculosiores sunt ob delicatulam vivendi rationem, cui pueri adolescendo assuescunt. At adolescentibus ubique gravius periculum impendit quam pueris; quando hoc morbo corripiuntur; quia cum adultiores cutem duriores firmioresque habeant infantibus pustulæ ægrius in illis erumpunt, atque hinc sequitur humorem, potius ac externe putrescat, intus reverti.

Pustulas in morbilis rubescere bonum signum exhibet, malum vero viridescere, aut luteas fieri. Aliquando eadem pustulæ cæruleæ, lividæ, & nigrae ob-

Quid præstant dum circa pustulas.

Observationes.

ser-



servantur: quod pessime ominatur, non minus in morbillis quam in variolis. Satis tamen notum est, hunc morbum illo graviores esse, & periculosiores.

**Remedia** *Art. 284.* Quando variolæ satis copiosæ non erumpunt, frictionem totius corporis laudat Brunerus sequenti unguine instituendam.

*℞. Ol. amygdal. dulc. Chamemel. ana unc. sem. aq. Chamemel. unc. j. coq. simul. ad urgenti consistentiam, ut in præfatum usum facessant.*

Optimo successu sequens remedium adhibuisse Ettmullerus testatur; quando variolæ non prodeunt, ægrumque in præsens periculum conjiciunt.

*℞. Camphor. gr. j. castor. Myrrh. ana gr. iv. fib. diaph. gr. xv. misce. Hoc pulvere gr. xv. vel xx. sæpe eger utatur.*

Addi Forestus se plurimos sequenti remedio sanasse, etiam morbillis & Variolis epidemice grassantibus.

*℞. Cerevisiæ ℥viij. caric. ping. man. j. coqu. simul & colat. sit in potum ordinar.*

**Ad Pustulas** *Art. 285.* Alia item remedia pro pustulis commendantur: quando videlicet ad maturitatem perductæ candescunt, sequenti liniri possunt unguento:

*℞. Ol. amygdal. dulc. recent. expr. q. v. cremor. bord. tantundem. Conquassent. simul ad consist. Ungunt quo sæpe in die pustulæ obliniuntur.*

Frustrulum adipis suilli ad ignem accensi dein extincti pro eodem usu adhiberi potest. Hoc pustulæ illiniuntur. Aliud item laudabile Remedium ab Ephemer M. N. C. excerptum sic paratu.

*℞. Myrrh. q. v. Vini spir. q. s. m. Hoc liquore pustulæ sæpe irrorantur uno, alterove die; dein eadem tepide foventur aq. cum Sacchar. saturni.*

**Quomodo oculi a variolis defendendi.** *Art. 286.* *℞. Aq. Ros. & plantag. quibus addito croco mixtura agatur. Hac vero & pluma palpebræ illiniuntur timore ne pustulæ affatica oculos congerantur. Quidam testatur est ad defendendos oculos a pustulis, numquam remedium omisisse, cujus vim præstantissimam expertus est frequenter. Hoc vero ita se habet.*

*℞. Aq. Ros. plantag. solatr. ana. unc. i. Gran. sumach ʒ. sem. plantag. ʒ s. coq. & colat. a principio morbi in oculos subinde instilletur.*



Ut oculi a variolis tueantur quidam Aquam Plantaginis laudant, in qua sæpe extinctum sit frustulum ad ignem candefactum auri. Hanc guttatim subinde in oculos destillant. Alii etiam oculos sæpe in die forvent mixtura ex Aq. puræ part. vj. Aceti part. j. ad ignem prius calefacta, quod auxilium sæpissime optimum effectum præstitit, modo caveatur, ne facies reliqua ab hac mixtura abluatur, quia ejus virtute variolæ facile recederent, & æger vita periclitaretur; vel materia variolosa in fauces deflueret, quod sane haud minus esset funestum.

Quando variolæ oculos obsident, frustulum carnis vitulinæ recentis, & tepidæ imponatur, nam lymphæ acredinem in se recipere valet. Necessarium est autem singulo quadrihorio hujusmodi frustulum renovare, ejusque usum aliquandiu continuare, Quando interjectis impuritatibus palpebræ conglutinantur, eadem abluere sequenti juvat decoctione.

℥. Semyn. cydon. fœnugræc. lin. ana v. j. aq. font. ℥j. ebull. & colat. servetur usui.

Testatur *Lypsius* ope sequentis decoctionis adolescentulum, ab anno integro visum propter variolas amissum, recuperasse.

℥. Rad. gentian. num. iv. vel v. Aq. font. Vin. opt. an. ℥j. Contuse radices bull. & colat. deinde ter vel quater de die in ægri oculos instilletur.

Ad maculas arcendas, quas aliquando variolæ in oculis relinquunt, *Forestus* jubet guttulam Ol. Mustellæ instillare. Ceterum, cum omnes oculorum morbi ratione visus inter graviores reputentur, nihil moliendum, aut suscipiendum est absque peritioris cujusdam, doctorisque Medici consilio.

Art. 237. Ut etiam nares a variolarum læsionibus tueantur, sequens commendamus remedium.

℥. Ros. damascen. p. iij. camph. gr. viij. m. f. pulv. sæpe naribus sumendus per se vel aceto mixtus. Quando in naribus efformantur escatæ, ut eadem facile decidere possint butyro recenti minime salito inuntuntur. Eodem butyro aqua rosarum sæpe numero abludo, crustis fricatis eadem frictionis vi facile concidunt.

Art. 238. Si variolarum impetus fauces obsideat Deci Allen Pars I. G suffo-

Quomodo præservanda nares.

dentea suffocationis periculum ægris impendit, quod ut evitent  
ad fau- Forestus sequens remedium, laudat.  
ces hu-  
mores.

24. Aq. platang. lactis caprill. ana p. æ. m. pro  
gargairsmate. Aliud item eadem de causa remedium  
laudatur, quod est: ʒ. stercor. caballin. pug. j. aq.  
font. lb. j. s. aq. sempervivi major. cyath. j. infund.  
omnia simul, & colat. sit. ad. usum gargarism.

Pro ma-  
culis in  
facie re-  
solutis.

Art. 289. Quoad maculas faciei discessis variolis  
residuas, ut eædem tolluntur. ʒ. Farin. lupin. fa-  
bar. ana ʒij. urinæ bovis q. s. m. f. cataplasma, quo  
cubitus iturus faciem eger obducatur, & mane aq.  
flor. fabar. abluat. Sed ad cicatrices implendas non-  
nulli unctionem ex anguillarum adipe commendant.

Art. 290. Quando labia a variolis obsidentur, se-  
quens mucilago utiliter in usum ducitur. ʒ. semin.  
cydonior. pug. j. ebull. in. aq. font. lb. j. usque ad  
consumpt. humid. mucilaginem residua obliniantur labia.

Pro la-  
biis tu-  
endis.

Præter remedia ad curationem variolarum opportu-  
na, quorum meminimus, meliora, quæ itidem adhi-  
beri possunt sunt, quæ sequuntur: gran. scalart. gumm.  
laccæ, serpentar. virgin. cinnab. antim. tinctur. be-  
zoard. Fulleri, tinct. corall. Bates, decoct. rubra e-  
jusdem. Decoct. ad variolas Fulleri, gargarisma ad  
variolas ejusdem Auctoris, Lohoch rubr. ejusdem, un-  
guent. bismuthi ejusdem, & similia.

Metho-  
dus cu-  
rativa  
variola-  
rum pro  
infanti-  
bus.

Art. 291. Methodus curandi infantum variolas in  
hoc maxime consistit; ut nempe infans nullo alimen-  
to solido adhibito, jusculis ex carne vitulina, & vo-  
luti prolatilium vel gelatinis similibus tantum victitet, ptisa-  
nam ex hord. mund. & rad. gramin. glycyrrhiz. cum  
passul. minor. in potum usurpet, & in cubiculo tem-  
perato decumbendo, alvum clysteribus apertam refe-  
rat. Si variolæ cum vehementi febre conjungantur  
& difficilis respiratio adsit leves phlebotomias celebra-  
re, & in fine variolarum alvum quodam syrupo pur-  
gare juvabit.

Quomo-  
do cu-  
randæ  
pustulæ.

Art. 292. Statim ac pustulæ in eisdem prodeunt  
ol. amygdal. dulcium, vel lactis cremore, vel buty-  
ro recenti inungantur, ubi candescunt (quod ut plu-  
rimum nono die evenit) perforari debent, ut con-  
tentum pus exomant. Earum exsiccatione invalescent  
ægræ.



ægri facies recenti lactis cremore cum quò bolus alba mixta fuit, illiniatur, atque mane & vespere quotidie usque ad crustarum deciditiam continuetur. Oculi infantum a variolarum læsine incolumes servantur imponendo turundas aqua plantaginis, vel rosatum imbibitas, atque, ut respiratio liberior sit, non solum ægri nares a crustis intus natis subinde liberari debent: sed fauces etiam edulcorari, & refrigerari ptisana aliqua tantillo fyrupi violati medicata.

*Inter legendum.*

*Art. 293.* Variolæ confluentes; æquæ ex genere discretarum, in quibus pustulæ mirum in modum plurimæ accurrunt, semper summum periculum habent, quia symptoma aliquod gravius facile inferunt, & difficilis atque implicata evadit ægri tractatio, cum ii qui earum curationi assident, ancipites ut plurimum hæreant in auxiliis, quæ aptius conveniunt, eligendis. Hoc vero casu sequenti ratione se se gerere prudentius consulit *D. Lobb* in suo tractatu Anglice conscripto de variolis, quem Gallice Anonymus quidam vertit, & Parisiis edidit ann. 1749.

*Art. 294. 1.* Quousque nulla idea constat status morbi, qui vos ancipites, detinet; quoniam remedio impetere eundem debeatis, præstabit nullum jubere; nam tutius erit naturam sui juris relinquere, ac contrarium præbere remedium, quod pro abigendo symptomate, cui intenditur, aliud periculosus invehat.

in Cam.  
tionem.

2. Pulsus conditiones diligenter explore, gradumque caloris in ægro perpendite, ut ad eorum normam consilia dirigere valeatis.

*Art. 295.* Binæ quæ sequuntur regulæ sunt itidem inagni momenti:

1a. Si pulsui celeri ac valido una cum calore corporis insigniter aucto symptomata periculosa superveniant, concludendum, pulsuum illum nimis celerem ac validum fore caloremque itidem nimium, atque adeo eorum imminutioni opus impendendum erit diligenter. Quamobrem ad usum diluentium affatum hauriendorum confugere præstabit, quæ acidiuscula

Regula  
quædam  
aliæ.



reddi poterunt additione succi malorum aurantiorum, vel limonum, vel nonnullis spir. vitrioli guttis. Conveniet etiam serum lactis aceto præparatum interdum exhibere, quod tantillo sacchari edulcorabitur,

2a. Si pulsui celeri, & debili una cum calore corporis aut naturali, aut naturali minore symptomata periculosa accedant, concludendum est pulsum illum caloremque vitalem debiliores magis quam par est, fore; atque adeo opus esse eosdem augere. Quamobrem serum lactis vino canarino præparatum ægro exhibere præstabit, tum ei dandæ erunt panatellæ, avenacea, hordeacea &c. additione cuiusdam aromatis; ut macis, vel nucis moscatæ conditæ, vel etiam merum cum aqua, & saccharo tepide; interdum quoque vini cocti cyathum instar cordialis, advertendo tamen ne aut meri, aut aromatum usus æquo generosior vel parcius, sit, quod ex pulsus debilitate, & caloris naturalis imminutione facile cognoscetur.

*Art. 296.* Ad tutius dirigendum iudicium de statu ægri, & de auxiliis opportune usurpandis consulit præfatus Auctor, ut practici memoriter semper retineant, tum favorabilia, tum quæ periculosa sunt symptomata variolarum, atque adeo ut sæpe perlegant duas, quæ subjungit tabulas, ideo concinnatas, ut utriusque speciei symptomata, quæ frequentius occurrunt, facile innotescant,

*Tabula symptomatum quæ bene ominantur.*

*Art. 297.* Bene in variolis portendunt.

1. Si in status febris capitis, & dorsi dolor, calor, fitisque moderate urgent,
2. Si nulla supervenit vomituriatio, aut stomachi angustia, nec in infimo ventre ullus dolor percipitur.
3. Si variolarum eruptio nisi circa finem tertii diei, aut initium quarti prodit.
4. Si infantibus tertio die epilepticus paroxysmus accedit,
5. Si pustularum eruptio gradatim evenit, earumque incrementum regulariter usque ad majorem gradum

Quibus  
atten-  
dendum  
in va-  
riolar.  
curatio-  
ne.

Bene-  
gni-  
orum  
sympto-  
matum  
recensio.

dum succedit h. e. usque dum convenientem magnitudinem acquisierint.

6. Si suppuratione constanter regulariterque provehente pustulæ, quæ sunt in facie decurrentibus diebus 7.; 8., 9., 10., 11., maturescunt; quæ vero sunt in reliquo corpore diebus 12.; & 13.; cum sensu doloris subcutaneo, vel summa cutis sensibilitate, atque pulsatione in locis ubi pustulæ congeruntur.

7. Si facta eruptione symptomata febrilia evanescent.

8. Si circa octavum palpebræ oculorum inflantur.

9. Si circa nonum caput inflatur usque ad undecimum.

10. Si circa decimum aut undecimum inflantur manus atque digitus.

11. Si rubicundos; & cinnabarinus color durante suppurationis periodo spatia pustulis interjecta tenet.

12. Ubi respiratio libera sit & facilis.

13. Somnus moderatus & vires roborans.

14. Appetitus ciborum bonus.

15. Expositio copiosa materiæ lucidæ, & aquosæ, a sexto ferme morbi die usque ad ejus declinationem perseverans.

16. Si cum pustulæ undecima die exsiccari incæperint, eadem mutantur sensim in crustas cinereas, vel obscure albescentes.

17. Si alvi fluxus duodecimo, vel decimo tertio in confluentius prodit, & hoc tempore in discretis summum obtinuit, maxime non pustulæ etiam internæ obsidant.

18. Si urinæ, dum omnia prava symptomata absunt, colorem referunt vini canariensis, cum nubecula suspensa, vel levi sedimento albescente, & copioso.

### *Tabula symptomatum quæ male ominentur.*

*Art. 298. Periculum in variolis minantur.*

1. Si in statu febris, capitis & dorsi dolor, una cum corporis calore admodum augto vehementer urgent.

2. Et sitis adest inextinguibilis.

Et 3

3. Et

Periculo-  
sum  
symp-  
tomatum  
recensio

3. Et stomachi anxietates atque vomitus.
4. Si vehementes dolores in imo ventre excruciant.
5. Delirium si adest ac vaniloquium.
6. Necnon somnus immodicus.
7. Et insomnia vexantia.
8. Inquietudines, agitationes, revolutionesque frequentes per lectum,
9. Si hæmorrhagiæ ex naribus, per os, & per uterum prodeunt, vel excreatus, urinæque, aut alvi fluxus sanguinei cum pulsu debili, parvoque calore.
10. Si maculæ purpureæ erumpunt.
11. Quando variolarum eruptio primo secundo aut tertio a principio morbi die contingit.
12. Quando pustulæ præcipitanter, & magno numero erumpunt.
13. Quando eædem admodum parvæ sunt, & profundo rubore splendentes.
14. Si post eruptionem febris adhuc absque imminutione perseverat.
15. Si suppuratio repente cessat, aut lentius progreditur.
16. Si tempore maturationis dolor, qui corporis superficiem 6, 7, 8, 9. 10, 11, die morbi exercere debet, abest.
17. Si faucium inflammatio, & deglutiendi difficultas accedit.
18. Et saliva viscida fit, ac densa.
19. Quando Ptyalismus suo tempore non incipit, & quando citius quam par est, aut cessat, aut imminuitur.
20. Quando circa octavum diem, vel nonum caput non inflatur, vel nimis cito subsidet.
21. Si manuum, digitorumque inflatio circa undecimum, vel duodecimum diem non evenit, vel nimis cito desinit.
22. Quando lingua exsicccatur, & nigrescit.
23. Respiratio frequentior, difficilior, & interrupta evadit.
24. Alvi fluxus in aliqua trium periodorum accidit.
25. Et dolores in internis, aut vagi, aut fixi superveniunt.
26. Si pustulæ in centro depressæ quasi insculpta fovea



fovea prodeunt, vel facile evanescentes, vel lividæ, vel, ut ajunt, *crystallinæ*, & *verrucales*.

27. Si symptomata hysterica, horrores, & rigores superveniunt.

28. Urinæque nigræ apparent, vel sponte prodeuntes, vel nullo ægri sensu emanantes.

29. Quando alvus aut involuntario, aut nullo sensu deponit.

30. Quando convulsiones, & tremores accedunt.

31. Vel singultus declinante morbo, vel per os internum ulcuscula.

*Art. 299.* Hæc recensio symptomatum, quæ frequentius accidunt in benignis, periculosisque variolis, inservit cuicum ægri directio incumbit, ut æquius judicium ejus status concipere possit, & aptioribus remediis eidem opem ferre valeat.

Harum  
tabula-  
rum  
utilitas

*Art. 300.* Qui plurimam in revolvedis scriptoribus de variolis agentibus impendere operam, compertum habuere in hujus morbi curatione eosdem ad invicem oppositis sententiis pugnare. quia alii regimen calidum cum alexipharmacis jubent, alii pariter iustando regimen frigidum, & refrigerantia remedia consulunt. Utraque vero methodus ad extrema pertingit. Prior equidem quibusdam in circumstantiis convenit, altera in aliis: sed tutior via inter utraque extrema sæpe consistit.

Neces-  
saria  
obser-  
vatio.

*Art. 301.* Perpendenda diligenter est hac de re sententia *D. Lobb*, ut etiam ejus versificatoris præfatio; tum quoque legennæ observationes quas utrique habent circa phlebotomiæ usum in quadruplici hujus morbi stadio, & circa ejus abusum qui (nescio quo fato) huc usque in Gallia plurimum invaluit. Ibidem quoque modum Lector reperiet narcotica, & purgantia utiliter exhibendi. Quare cum horum omnium recensio nos ab hinc longe evocaret, quemque ad laudati *D. Lobb*. Opus ablegamus, cujus praxis (maxime quoad Phlebotomiæ, & Narcoticorum usum) naturæ regionum aptanda videtur. *Eoudon*.

*Inoculatio variolarum .*

*Proc.* *mium.* *Art. 302.* Medicorum est morbos curare non inferre; dices tamen medicum peritum ac probum, humanarum infirmitatum providum, morborum futurorum occasiones præscindere, vel saltem leviores reddere: æque ac presentes sanare, omni arte decere: Si hoc non concedatur, quomodo venæsectionem imperabimus emetica, & cathartica adhuc sanis, & vegetis prophylaxeos gratiâ propinabimus?

*Nova* *praxis.* *Art. 303.* Inoculatio variolarum est nova praxis à *Constantinopoli* ad nos nuperis annis translata; & mirum est, quanta expectatione recepta quantaque industria exulta statim incredibiliter inclaruerit. In ipsa domo regia, in multorum procerum & optimatum familiis magna ostentatione celebrata fuit; ubi felici eventû & successu eamdẽm exercente ediderunt. Nihilominus sub tantî auspiciis & tam magnis exemplis inter *gentem popularem* minus increbuit, nostrorum hominum genio, & cogitandi modo vix rite quadrare videtur. Quoad fas, & an cum bona conscientia fieri possit multum varieque litigatur; de certitudine, & incertitudine variolas genuinas producendi, itemque an alios etiam morbos, & humorum contaminationes, unâ cum variolis, implantari possent vehementer ac strenue disputatur. Mihi quidem neque otium neque facultates suppetunt tantas componere lites.

*Opera-* *tio.* *Art. 304.* Interim inoculationis operatio ad hunc modum facillimo negotio peragitur. Imprimis in promptu comparandum est exiguum pus (guttæ v. vel vj. puta) ab adolescente variolis discretis decumbente, inter maturandum depromptum, quod parva phiala vel pyxidẽ inclusum loco operationi assignato deportandum est, ubi omnibus præparatis inoculando vulnuscûla duo infligenda sunt, unum in brachio alterum in crurẽ lateris oppositi, & pus prædictum penicillis applicandum; & ligaturis firmandum; non opus est, ut incisiones fiant profundiores quam per cutem, neque grano hordei longiores, penicilli ad finem 24. horarum removendi sunt, & ulcera emplasti.



Diachl. vel foliis brassicæ operiendo, & in futurum semel vel bis in die pro ratione quantitatis puris ibidem scatentis detegenda & medicanda. Hoc facto morbus sensim producet, & symptomata sequentia plerumque exoriri solent.

*Art. 305.* Circa diem octavum post operationem e-rumpere solent pustulæ, iis, quæ in discretarum genere ordinario contingere solent, haud dissimiles, præeunte febricula, & reliquis usitatis symptomatis, sed mitioribus. Quoad loca incisa, 4. die rubescunt, & inflammatur, die 6. ad suppurationem vergunt, & pus ichorosum emittunt. Sub eruptione quidem pustularum invadente Febre ulcuscula paulo minus fluunt; post vero eruptionem, usque ad declinationem variolarum pus in dies augetur; ex quo tempore iterum sensim diminuitur; ita ut spatium quinque hebdomadarum ulcera plerumque penitus claudantur. Quanto major est evacuatio puris per ulcera hæc artificialia durante morbo, tanto mitior erit morbus. In genere observatum fuit variolas per inoculationem inductas discretas esse, periculo ut plurimum vacantes, pustulas perpauca, cuti foveas raro relinquentes. Subsequuntur sæpissime in variis corporis partibus tubercula, & abscessus, nonnulla quidem levioris momenti interdum vero mali moris, & difficilioris curationis.

*Art. 306.* Ad corpus inoculationi præparandum multi multa loquuntur de Venæsectione, de usu emetico-um, & cathartico-um, &c. Sed profecto, si inocuandus sit ætatis juvenilis, boni habitus, & absolute sanus, nihil horum necessarium videtur. Sufficit temperati regiminis ad tempus ante operationem observatio. Operatione peracta inoculatio solitum vivendi modum persequi concessum est, nisi quod fortassis carni-um imis liberalem indulgentiam prohibere prudentis erit. Morbo incæpto idem regimen ac in variolis discretis, modo ordinario contractis, observandum est, & si medicatio-aliquali opus sit, variolæ inoculatione inducæ eandem postulant medendi methodum.

Symp-  
tomata  
super-  
venien-  
tia

Præpa-  
ratio &  
regi-  
men



# FEBRIS PESTILENTIALIS & Pestis.

*Diemerbroekii sententia.*

*Pestis definitio* *Art. 307.* Pestis est morbus peracutissimus, perniciosissimus, & maxime contagiosus, & maligno & occulto spiritibus calorique nativo tota substantia infestissimo inquinamento ortus, a quo omnium viscerum, & imprimis cordis, functiones læduntur.

*Diversum quid a febre.* *Art. 308.* Pestis est diversum quid a Febre, & Febris est tantum ejus symptoma, ut multoties observavimus, ac proinde nonnulli Pestem male per Febrem definiunt, cum Febris non sit de ipsius essentia, ut infra probabitur.

*Art. 309.* Inter signa Pestem præcedentia & præsagentia sequens *Noviomagi* observatum fuit, nimirum, maxima & incredibilis insectorum copia, qualis vix unquam visa fuit, ut culicum, papilionum, scarabæorum, crabronum, cicadarum, omniumque maxime muscarum, quarum utroque anno stupenda ubique copia reperiēbatur, ut ædium interiorum parietes undique muscis consiti viderentur, & foris ipse aer multis in locis quasi muscarum nubibus obfuscaretur.

*Signum Pestem præsignans.* *Art. 310.* De causis Pestis maxime ardua inter medicos quæstio movetur. In eo conveniunt omnes, illam excitari a cæca quedam pernicie, & inexplicabili aeris labe; sed unde labes illa emerferit, quomodo aer tantum vitium contraxerit, quid hoc elementum inquinaverit, de eo dubitant, & in eo inveniendo laborant omnes. Prima & primaria causa est *jussissima summi Dei ira propter hominum peccata*; ab hac causa promanat illud *αἰὲρ τοῦ Θεοῦ*, quod pesti inesse animadvertitur, cujus etiam Hippocrates sæpe mentionem facit; & hoc omni ævo creditum fuit tam apud Gentiles, quam apud Judæos, & Christianos; idem quoque sacræ literæ passim plus satis confirmant. Nos arbitramur Hippocratem per τὸ θεῖον intellexisse causam quandam morbificam, præter naturæ

turæ ordinem ac potentiam, a diis e sublimi immis-  
sam, vel in & ex aere de novo ab ipsis suscitatum, cujus  
essentia nec in certa elementorum mixtione, nec in mani-  
festarum qualitatuum intemperie, nec in magna aliqua pu-  
tredine, consistit, sed in novo quodam veneno, præter-  
naturaliter a diis in hoc sublunari mundo suscitato, Quomo-  
do in-

*Art. 311.* Cum aer a venenoso inquinamento in-  
cipit alterari, pollui, ac ad venenositatem disponi, cipere  
incipit simul etiam rebus sublunaribus valde intensus solet.  
& noxius esse, interdum armentorum magnas strages  
edere, interdum segetes & terræ fructus corrumpere,  
inter genus humanum Febres malignas & Pestilentia-  
les generare, & mox ipsam Pestem.

*Art. 312.* Contagium est communicatio inquina-  
menti ab uno corpore in aliud, sive illa actio com-  
municationis fiat per immediatum contactum, sive per  
medium; requiritur autem apta dispositio ad hujus-  
modi seminarium recipiendum, alias non communica-  
bitur. Pestilens venenum cum vestibus, aliisque re-  
bus ad alias civitates & regiones deferri videmus.  
*Inexplicabilis quidem est hominum dispositio, quoad*  
*contagium recipiendum, vel non; in aliis talis est,*  
*ut a Pestilenti veneno statim afficiantur, in aliis ta-*  
*lis, ut difficulter ab eo lædantur, in aliis talis. ut*  
*eidem sine ulla noxa resistere possint.* Conta-  
gii com-  
muni-  
catio.

*Art. 313.* Febris Pestilens, Pestis comes, non ori-  
tur a veneno Pestilenti, sed mediante putredine, id  
est, non generatur propterea, quod humores a vene-  
no Pestilenti inquinantur, sed quod cor Pestilenti  
veneno irretitum, obrutum, plurimumque debilita-  
tum, inquinatos humores debito modo neque coque-  
re, ac dilatare, neque regere, & satis dispellere pos-  
sit; qui; hac de causa putrescunt, caloremque præter-  
naturam concipiunt, sicque Febrem excitant; quæ ob  
dictam causam ordine posteriorem necessario est di-  
versa ac separabilis a Peste, ejusque symptoma.  
Hoc ipsum confirmant dogmata & auctoritas tam ve-  
terum quam neotericorum, nec minus quotidiana pra-  
xis, & obvia exempla. Febris  
pesti-  
lens  
nuda.

*Art. 314.* Multa symptomata horrenda & gravia  
Pestem comitantur, quorum nonnulla sunt ei magis  
pro- Pestis  
symp.  
tomata.



propria, ut bubo, anthrax, & exanthemata; alia autem aliis morbis communia, quorum primaria hæc sunt; capitis dolor, phrenitis; sopor, vigiliæ, anxietas; debilitas seu magna virium prostratio, visus turbulentus, cordis palpitatio, linguæ siccitas, vomitus; singultus; lumbrici, fluxus alvis, hæmorrhagia narium, menstruorum profluvium, sanguinis mictus, sputum cruentum, dolores, lateris, hepatis; renum, aliarumque partium.

**Bubo.** *Art. 315.* Bubones & carbunculi sunt; a veneno Pestilenti, quod cor ex sese per arterias ad alias partes expellit. Bubo est tumor dolorosus earum glandularum; quæ sitæ sunt retro aures, & in collo, sub axillis, & in inguinibus. Carbunculus a pustula plerumque ortum ducit; & est partis alicujus gangrena; dum est in fieri; & sphacelus; dum est in facto; nulla vi naturæ aut artis edomari; & in pus converti potest, sed integer a vicinis partibus separatur. Carbunculi non habent certa determinata loca; in quibus exoriantur; sicut bubones; sed in quacunque corporis parte excitari possunt: modo enim conspiciuntur in thorace, vel collo; modo in abdomine, vel dorso; modo in brachiis; vel cruribus; modo in manuum pedumve digitis; modo unus aut alter; modo plures simul; vel in una vel in diversis partibus: imo sæpe etiam in partibus internis oboriuntur, ut in pulmonibus; ventriculo; renibus; &c.

**Carbunculus.**

**Exanthemata.** *Art. 316.* Exanthemata Pestilentialia sunt maculæ purpureæ vel rubræ; vel nigræ; vel violaceæ; ut plurimum rotundæ, aliquando latæ, oblongæ aliusve formæ; in summa cute efflorescentes.

**Signa prognostica.** *Art. 317.* Acutorum morborum (inquit Hippocrates) incertæ admodum ac fallaces sunt prædictiones. In Peste Noviomagensi observavimus sextæ diei crises semper certo lethales fuisse. Quicumque circa novilunium aut plenilunium Peste corripiebantur, ii maxime de vita periclitabantur. Prostratio virium in morbi principio, animi deliquia, & cordis palpitationes plerumque lethalia signa erant; pulsus intermittens semper lethalis; sopores, sternutationes; motus tremuli, delirium, dolor in gutture, & raucedo, anhelitus foetens, male ominentur; Pleuritides semper



per lethales; suppressio alvi bonum signum, spem salutis exhibens; alvi fluxus contrarium, cum hoc vix centesimus æger evadebat; sanguinis per sedes vel urinas signum lethale, ut & menstruorum fluxus. Quocitius bubones prodibant, tanto meliores, si sine Febre, vel ante Febrem, prodirent, salutis magnam spem habant, & contra; si in emunctoriis loco bubonum emergerent carbunculi, gravissimum periculum indicatur. Si carbunculi tardius prodirent, malum, & si valde multi, pessimum; in locis carnosis, meliores, in nervosis, periculosiores; maculæ purpureæ, nigræ, virescentes, violaceæ, quocumque tempore apparentes semper lethales; cum rubris nonnulli evadebant, etsi paucissimi.

Art. 318. Præstantissimum & certissimum prophylacticum a Peste est *fuga cum timore Domini copulata*; recessus circumstantiæ in sequenti versiculo continentur;

*Hæc tria tabificam tollunt adverbia Pestem,  
Mox, longe, tarde, cede, recede, redi.*

Nullum melius Pestilentis aeris correctorium iuvenum natura datur quam ignis, ut multiplex experientia comprobavit. Hippocrates famosam illam Pestem, quæ ex Ætiopia Græcos invaserat, olim per ignes edomuit, & extinxit; jusserrat enim per totam civitatem accendi ignes luculentos nocturnis præcipue temporibus, ut aeris inquinamenta purgarentur. Ignis ligno uniperino vel fraxineo nutritus ad venenatas aeris corruptiones emendandas multum valere creditur. Accensio *Sulphuris pyrii* aerem purificat, & ejus corruptionem auget; idem facit crematio *succini*, *picis navalis* &c. Item suffumigium *aceti* cum ferro candente vel ignitis lateribus excitatum. Quoad diætam consultum est Pestilenti constitutione temperantiam colere, quæ magnopere ad sanitatis conservationem prodest; omnia vero repentina mutatio periculosa est, quapropter a consuetâ victus ratione subito discedere maxime periculosum esset. Malum est vigente Peste jejuno stomacho in publicum exire. Carnes porcinae maxime damna-

mnosæ censentur. Omnia dulcia vitanda sunt, Vinum temperate usurpatum prodest; sed ejusdem abusus est valde periculosus: Mercurialis testatur Patavii & Venetiis. se vidisse bibaces, plurimos, extinctos esse, qui existimabant vinis generosis se propulsaturos esse Pestem. Vestes laneæ & crassiores inquinamentum contrahunt, & conservant; præferendæ sunt itaque vestes ex serico tenuiore vel satino, aliove simili. *Phlebotomia*, quamvis a multis veteribus, & neotericis medicis summe laudatam, nos tamquam valde periculosam, & damnosissimam, plane rejecimus; experientia enim constabat Pestis invasionem brevi post venæsectionem iis, qui præservationis gratia adhibuerunt, insecutam esse, quapropter omnibus prohibuimus. Cauteria seu potius fonticulos plurimi insignes medici summopere commendant, & eorundem insignem utilitatem nos quoque multoties vidimus. Prophylaxeos gratia in corporibus sanis & firmis sat erat, ut alvus servaretur libera, non fluida; in cacochymicis vero paulatim ac clementer alvum subducere, necessarium duximus, & præ reliquis, cum Pil. Ruffi, utpote quæ tot sæculorum experientiis ad Pestilentem malignitatem comprobatae sunt. Usu sulphuris communis Hippocrates Pestem illam famosam Græcia abegit: suffitus ejus pro aeris emendatione, & pro potus medicatione perquam laudatur, uti quasvis corruptiones & alterationes, ita sanguinis putredinalem alterationem præcavit. In graviore malignitate indusium, & vestimenta imprægnari possunt fumo sulphuris. Ettmüller.

Art. 319. Quoad antidotos; inter simplices imprimis duas commendavimus; prima erat *tabacum*, nempe illius fumus per tubulum seu fistulam ore attractus, & post paucam retentionem inde rursus dimissus, quemadmodum ordinarie a fumi fuctoribus fumi solet; illius usum in hac peste tam in meipso, quam in plurimis aliis insigniter profuisse observavimus. Altera erat *radix Helenii*, vel sicca masticata, vel in pulvere sumpta, vel saccharo condita; de antidotis aliis compositis, consulatur auctor Cap. x. Pauperibus consulimus, ut quotidie mane duo vel tria cochlearia aceti vini optimi biberent, atque illud in hac Peste animadvertimus

fuisse.



fuisse unum ex optimis præservativis ; quamplurimis etiam spongiam *aceto theriacali* ebriam naribus frequenter admovendam dedimus.

*Art. 320.* Quod ad meipsum attinet, mirabantur quidem multi, quod ego, qui quaslibet ædes infectas indiscriminatim invisebam a tanta contagii violentia non læderer; imprimis, nec terrori, nec iræ, nec uncærori, locum concedebam; si forte meipsum aliquo modo contristatum perciperem, tum tribus quatuorve vini haustibus assumptis cor exhilarabam, atque ita tristitiam fugabam. In victu utebar cibus eucharystis; potus mihi erat cerevisia communis, ut & vinum album tenue vel mediocre, quo interdum usque ad hilaritatem, nunquam ad ebrietatem, utebar. Mane inter horam & quintam ægros invisurus nihil omnino cibi aut potus aut medicamenti assumere potui, sed oblatis Deo precibus solummodo aliquot grana Cardamomi minoris masticando jejunus primos ægros invisebam usque ad horam sextam: vel *theriacæ* vel *diascordii* pauxillum, vel *corticem aurant. conditum*, vel aut plurimum *radicum helenii* conditarum tria quatuorve frustula comedebam; circa horam septimam vel octavam frustum panis cum butyro, & caseo ovillo viridi jenticulabam, superbiendo haustum cerevisiæ; quandoque haustum *vini absinthii* bibebam; circa decimam, si per otium liceret, fistulam unam *tabaci* exsugebam, & post prandium duas tresve, nec pauciores post cœnam; sæpe etiam intermediis horis post meridiem duas tresve fistulas sumebam: Si autem ab ægrotorum foetore me vel tantillum alteratum sentirem, statim postpositis omnibus negotiis, qualicunque diei hora foret ad *tabaci* usum fugiebam: nam, ut verum fateat, *tabacum* pro primario præservativo semper habui, & revera tale esse, non sola ratione doctus sed experientia edoctus comperi, neque aliud melius pro ordinario usu hactenus inventum fuisse existimo; sed observatu dignum est, quod non nisi insuetis auxiliabitur fumisuctio; quapropter ego solo *tabaco* contentus nullis aliis suffumigiis utebar, & postea ejus usum rursus dereliqui.

Autho-  
ris vi-  
vendi  
modus.

*Art. 321.* Circa Pestis curationem semper plurimum



Curatio. mum hallucinati fuerunt omnes medici, dubii causarum dubii remediorum. Causa enim morbi adhuc latet, neque ullum hactenus remedium proprium inventum est par tanto malo. In Peste actu laborantibus a *venesectione* religiose abstinendum est; *purgantia* quoque & *vomitoria* maxime fugienda sunt; alvi constipatio non est metuenda, etiamsi in longum protrahatur, utpote quam nullis nocuisse animadvertimus. In ipso morbi principio statim ad *antidota* & *sudorifera* confugiendum est: hæc autem remedia *alexipharmaca* dicta multa sunt ac varia, quæ variis modis miscentur, & componuntur pro morbi ipsius genio & reliquis circumstantiis; quarum decisio ex medici iudicio dependet, neque certis regulis determinari potest. Simplicia primaria sunt quæ sequuntur: *radix petasitidis*, *aristolochiæ*, *belenii*, *histort. zedoar. gentian. angel. ering. scorzonæ. serpent. virg. fol. scordii, rutæ, card. ben. absynt. rorismarin. flores croc. calendul. sambuci, fructus berber. poma cydonia, citrea, aurant. limon. eorumque cortices, acetum simplex, sambucinum & calendulatum; aromata, myrrha, camphora, succinum, vipera, &c.* Compositiones sunt fere infinitæ, quamplurimarum formulæ apud authorem videri possunt. Author suspectum habet *crocum*, quoniam cerebrum petere solet; *camphora* a quamplurimis valde laudatur, item *flores sulphuris*, & *sal absynthii*; commendatur etiam *oleum vitrioli* & *oleum sulphur. per campan.*

Simpli-  
cia.

Methodus  
medendi.

Art. 322. Curationem sequenti methodo institui-  
mus; imprimis cubicula nitida servari, & ter quaterve de die aerem suffumigiis alterari iussimus, & statim ægris ( morbi primo, secundo, vel tertio die ) *potiunculam sudoriferam* exhibuimus, iisque bene stragulis contextis, sudores copiosos per duas tres pluresve horas ( habita semper virium ratione ) promovimus; qui, si difficiliter prodirent, arenam calefactam siccam lineis saccis infusam pedibus, axillis & inguinibus apposuimus. Si a primo sudore non levarentur ægri, post paucas horas sudoriferum de novo repetendæ est: si post secundum sudorem Febris cum aliis symptomatibus adhuc incresceret, nec

quid-

quidquam levarentur ægri, pessimum erat indicium: post decem vel duodecim horas & sequentibus diebus adhuc quater vel quinquies ( prout necessitas exigere videbatur ) *sudorifera* reiteravimus. Intermediis autem horis varia *antidota* ad veneni violentiam extinguendam, ut & *condita corroborantia*, ac *putredini resistentia*, vel *apozemata convenientia*, aliaque quæ malignitatem a centro ad peripheriam pellebant, nec non cibos quosdam liquidior facilis digestionis, & antidotali condimentorum qualitate alteratos, exhibuimus. Symptomatum quoque morbo conjunctorum diligentem rationem habuimus, de quibus proximo loco dicemus.

*Art. 323.* Inter symptomata, quæ Pestem comitantur communissimum est Febris maligna pestilens, quæ ut plurimum gravis, & periculosa existit. Hanc nos, durante hac constitutione, eodem fere modo, sicut ipsam Pestem, tractavimus, & *sudorifera* atque *antidota* ad illius curationem maxime profuisse observavimus, dummodo abstinere a calidioribus; vel, si iisdem uti placeret, *alia*, *frigida*, ut *acetum*, *succum citri*, &c. admisceremus. Vigiliæ in Peste non inagignopere metuendas esse docuit experientia; sed sopor in principio maxime damnosus, & mali ominis erat; si ad somnum nimis proclives essent ( quod admodum familiare erat ) illos primo die a somno studiosissime prohibuimus; usque dum alexipharmaco assumpto prius bene sudassent. Ad anxietatem, virium debilitatem, & vomitum, miraculose profuerunt remedia pauca sequentia: primum erat hæc mixtura; ℞. *Conserv. rosar. rub. ʒi ss. diascord. .iij. vel iv. aq. nostr. theriacal. inf. descript. ʒiv. succ. limon. recent. ac cinam. ana ʒi ss. m. stent per horam unam aut alteram; deinde per linteum colentur, colaturæ add. confect. de hyacinth. sine mosco ʒj. m. Secundum erat hoc linimentum: ℞. *Ol. unc. moscat. express. ol. scorpion. vel laurin. theriac. androm. ana -j. ol. junip. ʒi ss. succin. ʒj. caryoph. vel cinnam. gutt. iij. m. t. linimentum pro scorbic. cordis, & ventriculi regione inungendis, bis terve de die superponendo hanc pastam ad ignem calefactam; ℞. Rad. calam. arom. muc. moscat. ana -j. caryoph. benzoin. ana ʒi ss. fol. menth.**

Cutatio  
symp-  
tomatum  
Febris.

Vigiliæ.

Sopor.

Anxietas, virium debilitas & vomitus.



*Cicita menth. ʒij. pulverizatis add. mic. panis secalin. iij. linguæ. vel iv. acet. rosac. q. s. f. pasta.* Ad linguæ ariditatem post varias alias collutiones tentatas solam aquam simplicem plus profuisse animadvertimus. Nihil perniciosius quam hæmorrhagia narium, & menstruorum, & sputa cruenta; quæ citissime omni arte sistendæ sunt, secus actum erit de egris. Illud sæpissime observavimus, si alvi fluxus in principio non sistetur, postea, plane incurabilem in omnibus fuisse.

*Art. 324.* Bubonum curationem per suppurationem omnino tentavimus: quamprimum igitur ægri, sive in ipso morbi principio, sive in processu duritiem aliquam cum dolore sentirent pone aures, in collo, sub axillis, vel in inguinibus, huic plerumque ac citiorem tumoris provocationem, & maligni ichoris extractionem, *vesicatorium* in inferiore ejusdem parte applicavimus, ita ut *vesicatorium* ipsam duritiem attingeret, ut hoc modo ulcere facto locus apertus teneatur, & damnosi ichores melius effluant (*cucurbitulas* minus approbamus), secunda die ut noxia materia ad bubones attrahi, ibique, digeri, ac suppurari posset, toti tumori *cataplasmata attrahentia & emollientia*, ac *suppurantia* imposuimus, quibus præter alia etiam *cæpæ*, *stercus columbinum*, *fermentum panis acidum* & similia admista erant; nonnullis etiam *solas cæpæ sub cineribus aliquantum assatas*, & deinde contusas, pauco *theriacæ & butyræ insulsi* admixtò cataplasmatibus forma biduo vel triduo imposuimus; cum autem tumorem jam satis magnum esse, atque ad maturationem tendere videremus tunc attrahentia amplius non addidimus, sed *soli maturantibus* usi sumus, ut tumores citius ad suppurationem perducii possent. Sæpe ab ipso principio usque ad perfectam suppurationem hoc solum emplastrum imposuimus, quod omnibus intentionibus satisfaciebat, eoque solo tumores ad integram sanationem non raro perveniebant: *ʒl. Gum. galbanæ acet. dissolut. empl. oxy. croc. diachyl cum gummi ana ʒj. misceantur.* Notandum tamen nos quibuslibet tumoribus non imposuisse *fortiora attrahentia*, sed tantummodo iis, qui sub axillis, & in inguinibus oriebantur; tumoribus autem, qui prope aures ve-



in collo prodibant, talia non conveniebant; nam tali-  
 um usu eisdem, cum maximo suffocationis pericu-  
 lo, imo cum multorum exitio; sæpe paucis horis  
 enormiter increvisse observavimus; quapropter *sola*  
*emollientia, vel leviter tantum attrahentia* his im-  
 penebantur; aliquando necesse fuit, cum tardius pro-  
 cedebant, tumores scalpello incidere, sed hoc ante-  
 quam sere ad perfectam maturationem pervenissent,  
 non est faciendum; sequenti digestivo usi sumus:  
 4. Scord. subtilissime pulv. .ij. vitel. unius ovi,  
 terebinth. Venet. mel. unguent. Apostolorum ana ℥ss.  
 m. Caveri debet ne ulcera nimis cito occluderentur.  
 Videatur in annotationibus methodus experientissimi  
 Pauli Barbette de curandis bubonibus per *emplastrum*  
*magneticum arsenicale*.

Art. 323. In carbunculis tractandis sæpe prima &  
 secunda die imposuimus *folia brassicæ rubre oleo ra-* Carbunc  
*parum inundata*, quod apud vulgares in frequentissi- culorum  
 mo usu erat. Postea statim; imo ut plurimum abcuratio  
 ipso principio, frequentem pulticulam applicuimus,  
 qua nihil invenimus, cum quo carbunculorum sepa-  
 ratio, & curatio citius ac melius peragerentur; 4.  
 rad. consolid. maj. sicc. herb. scord. ana ℥ij. rad. al-  
 b. farin. sem. lini, tritic. ana ℥ss. coq. in q. s. aq.  
 mont. ad pulticulum, deinde add. mel. terebinth. un-  
 guent. apostolor. ana ℥iij. pic. liquid. ung. Basil. ana  
 ℥ij. vitel. unius ovi croc. ℥j. m. interdum etiam ad-  
 debantur theriac. ℥ij. Apud vulgus in usu erat *pix*  
*naturalis cum equali parte picis liquidæ*, cum qua  
 sola sæpius vidimus anthraces citissime separatos, &  
 colores optime sedatos. Quo mitius tractarentur,  
 eo melius & citius curatos fuisse millies observavi- Exan-  
 mus. Exanthemata morti instantis præsagia erant, themata  
 neque curationi tempus dabant, quam si admisissent, ta.  
 per *sudorifera & alexipharmaca* curari debuissent.

### Sidenhami sententiâ.

Art. 326. Acuti morbi ut plurimum Deum habent  
 authorem, sicut chronici nos ipsos. Pestis vix Bri- Proce-  
 nicam frequentius quam post annorum circiter qua- mium  
 aginta revolutionem devastat; jam vero ex pe-

*culiari Dei elementia plujquam quinquaginta annos immunes viximus.*

**Pestis de.** *Art. 327.* Pestis primo insultu rigorem ac horro-  
**scriptio.** rem quemadmodum & Februm intermittentium acces-  
 siones, fere perpetuum habet comitem; mox vomit-  
 us enormes, dolor circa cordis regionem, ( ac si  
 torculari premerentur ) Febris ardens ægros indefi-  
 nente divexant, donec aut mors aut benigna bubo-  
 nis vel parotidis eruptio, quæ materiam morbificam  
 foras ablegat, eos a luctuosissimo discrimine liberet.  
 Rarius quidem accipit; ut citra ullam Febris præ-  
 sentionem ingruat, ac homines de improvviso e me-  
 dio tollat, maculis purpureis præsentanei interitus  
 nuntiis, etiam dum in foro versantur erumpentibus,  
 quod tamen nisi in Pestis admodum funestæ exordio  
 vix contingit; sit etiam nonnunquam, ut tumores  
 prorumpant, nec Febre nec graviore aliquo sympto-  
 mate prægresso.

**Aeris**  
**diathe-**  
**sis.**

*Art. 328.* Aeris dispositio quantumvis *λογικόν* Pe-  
 sti excitandæ per se impar videtur; nec Pestis epide-  
 mica erit, nisi accedente idonea aeris diathesi.

**Curan-**  
**di me-**  
**thodus.**

*Art. 329.* Vel per *sanguinis missionem* vel per *su-*  
*dores* Pestis expugnanda videtur; posterior methodus  
 sæpe funesta fuit: *venesectio* vero larga manu & re-  
 petitis vicibus celebrata, nullo tumore protuberante,  
 nemini adhuc, ( quod scimus ) unquam funesta; tu-  
 more vero conspicuo instituta, semper damnosa, ra-  
 tio in propatulo est, nempe quoniam motui natura  
 adversatur. Plures & gravissimi scriptores *venesectio-*  
*nem* probant, præcipue Botallus, sed tam largam  
*venesectionem* paucissimi admittunt. Alia est itaque  
 methodus therapeutica, nempe, mittatur sanguis i-  
 lecto, & statim æger stragulis quamplurimis obruen-  
 dus est, & caput obtegendum ad sudores ciendos e-  
 tegumentorum pondere, & cum sudor promanare in-  
 cipiet, alvi profluvium, & vomitiones ultro sedan-  
 buntur, & tuncumat æger bolum sequentem cum  
 Julap. cardiac. sexta quaque hora, sudorique indu-  
 geat; *℥. iberiac. andron. ℥ss. elect. de ovo D*  
*pulv. grascon. gr. xij. cochinel. gr. viij. croc. gr. i*  
*syrup. kerm. q. s. m. f. bolus*: omnique arte cont-  
 nuandus est sudor ad viginti quatuor horas, nec prius  
 indu-

indusium mutandum est utcumque madidum, quod si sudatio citius abrumpatur, illico symptomatum sævitia recrudescit, & omnia in pejus ruunt. In sequenti luce commune *catharticum* exhibere soleo; atque hac medendi ratione, anno a peste proximo quamplurimis Febre pestilentiali correptis sanitatem restitui, adeo ut nec unus quidem ex eo morbo mihi desideratus sit, postquam eandem exercere inceperam. Vinum liberalius ingurgitatum, aliaque fortiora præservativa statis horis dierum assumpta, complures, qui alias salvi intactique verisimiliter permansissent, in hunc effectum conjecerunt. *Temperantem sobriamque Socratem gravissima Pests Atheniensium non attigit; neque ullo fere ævo eidem similes attinget.*

*Vvillisi sententia.*

*Art. 330.* Pro castigandis hominum sceleribus Pestem primitus a Deo immissam ipsi agnoverunt ethnici; indeoque pro extirpatione ejus, precibus & piamentis, æquæ ac medicamentis insistebatur. Pestis causa prima.

*Art. 331.* Ad prophylaxin recordandum est Hippocratis præceptum; labor, cibus, potus, somnus, æventus, omnia sint mediocriter. Pluris novi, qui (Helmontii verbis) vino & confidentia fortificando Archeum, nec aliis antidotis usi inter infectos sine contagii roxa versabantur. Prophy. laxis.

*Art. 332.* Dr. Hen. Sayer in praxi medicus felix, plerisque aliis hanc spartam renuentibus, peste laborantes audaciter invisebat. Londini anno 1640. ut seipsum a contagio muniret, antequam domos infectas adiret, solummodo vini generosi haustum pleniorum ingerere, deinde perambulatione sua peracta, eodem antidoto repetere solebat, tandem ad castrum Vvallingfordiæ occubuit cum duce quodam in eodem lecto discumbens. Alius medendi methodus sic se habuit; si, priusquam exanthemata aut bubones exterius apparerent, vocaretur, ut plurimum vomitoria exhibuit ex infusione, croci metallorum cum vitriolo interdum Romano; vomitione finita; diaphoreticis statim exhibitis in sudorem conjiciebat ægros; &



deinceps intervallis quibusdam pro refectioe virium concessis, usque ad morbi declinationem *diaphoresin* continuabat: sin post stimigata apparentia accerseretur, vomitione posthabita tantum *subdorificis* insistebat.

*Joannis Langii sententia .*

*Art. 333.* Ex Epist. 19. lib. 1. Jam tu probe nostis, me multos, de quibus etiam conclamatum erat, in hac pestifera lue hac methodo curasse, Primam si alvus, aliquot dies ante morbi initium, parum; vel nihil excreverat, tum glande imposita, aut levi enemate eam exoneravi. Postea alexipharmacum sudoriferum exhibui, quod pro ratione ætatis ac virium; sudorem duas vel tres, aut plures horas promoveret. Cordi epithema applicui. A sudore hora sexta, vel septima (refectis tamen aliquo jusculo viribus) venam opportunam secui, ac mox ab alexipharmaco aliis singulis diebus mane, & vesperti propinato alterantia, quæ una qualitate, & substantia veneno resisterent, exhibui, & cor quoque confortarent, qualia sunt quæ ex succo citri, limonum, aurantiorum, acetosæ & jugulæ cum momento aceti, & saccharo decocta conficiuntur. In morbi declinatione si appetitus edendi languebat ad reliquias morbi extirpandas, medicamentum ex rhabarbaro, agarico, cassia, aut rore Syriaco, sive manna, & tamarindis Indorum exhibui. Postremo Chirurgis, ne ulceris aut carbunculi consolidationem præcipitarent; coquis vero ut præscripto tempore commoda esculenta, & potulenta ægro suppeditarent, edixi. Quæ curationis ratione ingens ægrorum numerus, Deo optimo auspice, convaluit. — Bubonibus vero, & carbunculis si circa emundatoria, juxta, aures parotis, sub axillis abscessus, in inguinum adenibus bubo, virtute expulsante erupit, aut interim carbunculus in brachiis aut carnibus effloruerit, tum festinanter veluti in vulneribus virulentis medicamenta quæ venenum extrahunt ad locum explicato, vel cucurbitulas aut emplastrum ex fermento, theriaca, farina, sinapi, & cepa sub cineribus cocta conficito, additis opo-

poppanacis, & galbani gummis, acerrimo aceto solutis, imposito, & abscessum ante maturationem scarifica, aut aperi, vel cauterio adurito. Si vero patiens ignem veretur, cauterium potentiale ex cantharidibus, & fermento confectum, aut contusam ex oleo flammulæ radicem applicato, quæ sua virtute calorifica, & ardente non modo noxios humores attrahunt, sed & non raro factas ex his collectiones aperiant.

*Friderici Hoffmanni sententia.*

*Art. 334.* Neque tamen in peste unius ejusdemque <sup>subjecta</sup> indolis semper sunt symptomata, sed multum utique febri secundum temperamenta, & constitutiones corporum pestilenti variant. Quam diversitatem probe cognoscere, & scrutari oportet Medicum. Id vero omnes qui de pestilentiali morbo scripserunt unanimi suffragio confirmant, corpora quæ spongiosioris, rari, & porosioris, nec non obesi sunt habitus, temperamento sanguineos, & phlegmatico sanguineos, sexu fœminas, ætate juniores ac infantes, animo timidos, & abjectos, vitæ genere pauperes, insalubrem diætam colentes, crapulis deditos, & comestationibus in seram noctem indulgentes, longe celerius corripitur, & gravius decumbere hoc morbo, quam qui animo fortes ac intrepidi, corpore macilenti, nervosi, & amplioribus vasis dotati, viri, senes, fluxu hæmorrhoidali obnoxii, item qui fonticulos, & ulcera gestant aperta. Neque minus per observationes compertum, nihil ad suscipiendum. & deleteriam miasmatis virtutem intendendam aptius esse metu, timore mortis, animique consternatione, adeo ut etiam quosdam solo terrore peste affectus, & extinctos esse constat. Nam hi animi affectus sunt inter omnes præcipui, qui vitalem cordis & arteriarum motum cum sanguinis circulo minuunt, destruunt, & vires tam vitales, quam naturales, & animales dejiciunt, quum tamen motuum beneficio venenum conceptum sit exterminandum.

*Art. 335.* Cujus autem porro indolis ac specificæ naturæ sit venenum, quod pestem excitat, a priori <sup>Miasmatis.</sup> accu- <sup>natura.</sup>

accurate determinare admodum difficile; quia sensibus minus obvium. Quantum tamen ratione assequi; & a posteriori judicare licet, duplicis esse videtur, partim sulphureæ putridæ multiplicativæ, instar fermenti, partim subtilis valde acris; & causticæ plus tamen alcalinæ, quam acidæ naturæ. Putrida enim valde, & peregrina sulphurea indoles ex eo patet, quod omnes malignis ejusmodi morbi præcipue suam originem ab exhalationibus putridis, quæ ex cadaveribus inhumatis, aquis stagnantibus, putrescentibus, & aliis foetidis excrementitiis sordibus trahant, & quod ipsum hoc miasma illico contaminet nervorum fluidum, motum solidorum systalticum sistat, & corruptionem sphacelosam succis inducat. Causticanti autem subtilem acrimoniam inesse miasmati ex eo concludendum, tum quod contagiosorum morborum ingressum ut plurimum antecedit copia insectorum sale caustico prædictorum, & ex putredine genitorum; tum etiam quod nerveas fibrillas vellicando, & rodendo dolorem, ardorem, tumorem, & inflammationem causetur conspicuam satis in bubonibus atque anthracibus.

Solvuu.  
tur cria-  
rice per  
tumo-  
res.

*Art. 336.* Pestilentielle hoc intus susceptum venenum, illico, ut supra diximus, omnes omnino in corpore functiones turbat atque pervertit, ac nisi cito ab internis ad externas partes propellatur, certissime necem infert. Neque tamen hoc ut in aliis malignis fit per largos sudores, neque per alvi, aut urinæ fluxum, neque per hæmorrhoidum aut mensium profluvium, neque etiam per narium stillicidium spontaneum æque ac arte procuratum, ut potius tales præsertim effusiores excretiones minentur exitium. Sed salutaris, & critica; qua perfecte solvitur pestilentialis morbus, excretio, obsolvitur per tumores in externo corporis ambitu prodeuntes; ita quidem, ut non secus ac in erysipellate, intra tertium, & quartum diem eadem contingat, & quo citius ac melius eo magis morbi inde mitescat atrocitas. Formale enim venenum his humoribus contineri, atque excerni, vel ex eo patescit, quod si Chirurgus lancetta qua eisdem aperivit venam sani hominis incidat, is illico etiam corripiatur peste.

*Art.*



*Art. 337.* Quibus autem lethali est pestilentialis morbus, ex his nonnulli primo statim vel secundo die syncope pereunt; procul dubio ex Panico quo perculsi sunt timore. Sed plurimi quand venenum vel non expellitur; vel expulsum subito relabitur, & nervosis tunicis nobilium partium pleuræ, œsophagi, ventriculi, & intestinorum; nec non meningibus inhærens, inducit sphacelum, qui ocyus ad omnia viscera ipsumque sanguinem serpit, quo fit ut cadavera illico mire fœteant, intumescant, & citissime putrescant. Quandoque etiam quando nimia tumorum pestilentialium copia prodit, ob inflammationem, dolorem, & ardorem intolerabilem, ex febre symptomata, non secus ac in variolis fieri solet, occumbunt.

Sphace-  
lo nec-  
rat.

*Art. 338.* Quoad remediorum usum nihil perniciosius esse, ait, quam radices sic dictas alexiphar-  
macas, oleo volatili calido turgidas, carlinæ, angelicæ, petasitidis, zedoariæ, serpentariæ Virginianæ, imperatoriæ, vincetoxici, pimpinellæ, nasturtii, & ex his præparatas essentias, elixiria, theriacam quoque & Mithridatum, ceu genuinam antidotum, liberaliter offerre. Multo vero magis detestandi adhuc illi ta ntoperelaudati spiritus volatiles, urinosi, & oleosi; ut cornu cervi, viperarum, fuliginis, item falia volatilia, nec non balsmum sulphuris. Tantum enim abest, ut iisdem noxium expellatur, ut potius intus detineatur, & partibus nervosis altius infigetur. Perpetua quippe hæc lex, secretionem quæ antecedit excretionem recrementorum in corpore, melius sub liberiori, & moderatiori ad emunctoria appulsu succedere, quam ubi humores impetuose ac celeriter commoventur.

Alexi-  
phar-  
maca  
sola noc-  
cent.

*Art. 339.* Neque tamen penitus radicum, & herbarum sic dictarum alexiphar-  
macarum usus damnandus. Tunc enim non nocent, quando miscentur cum iis quæ vim earum commoventem nimis, & calefacientem ci-  
curant, & quasi ad temperamentum reducunt, uti sunt maxime acida cum nitro.

Sed ac-  
cidis  
nupta  
pro-  
sunt.

*Art. 340.* Inter ea vero, quæ præsentissimæ in pestilentiali morbo efficaciz communi omnium suffragio, sunt maxime acida & tetrea. Fracastorius lib. III.

Optima  
accidet  
a be-  
zoardi-  
ca fixa.

pag. 246. de morb. contag. tam ad præservtionem , quam ad curationem commendat hoc ℥. succ. aceto fell. unc. ij. citri unc. j. discord. Fracast. ℥j. Specier. cordial. ℥ij. Aceti unc. j. Mindererus *de pest. cap. XV.* disertis scribit verbis : *nulla est putredo , nulla infectio , nulla humorum depravatio , quæ per acida non superetur . Sane ut liberrimè loquar , si mihi vitriolicorum remediorum usus vel interdicatur ego ad curationem pestis numquam , vel certe inermis accederem .* — Ex terreis vero , & bezoardicis fixioribus singulari virtute pollent antimonium diaphoreticum , bezoardicum minerale , lapides cancrorum , cornu cervi ustum , & philosophice præparatum , succinum , terra sigillata , bolus Armena , & cinnabaris . Ex quibus varie concinnari , eademque vel sola , vel acidis nupta in usum vocari possunt .

*Art. 341.* Deinde inter remedia plurimum in pestilentia conducibilia præcipuum fere locum tenentur analeptica . Vires enim in atroci hoc morbo , tam propter gravem animi metum , & consternationem , quam ob ingentem malignitatem summopere sunt prostratæ ; hinc Medico maxime enitendum , ut removeat ex rebus moralibus , & non naturalibus omnia , quæ easdem offendere possunt , & in medicatione fugiat anodyna , & valde vaporosa , graveolentia . Ad reficiendas autem vires præstabit aqua confortans nostra methodo sic paranda . ℥. Meliss. Turcic. man. iv. rosat. cum sale contus. flor. lil. convall. ana man. i. corticum citri recent. unc. js. cinnamomi acuti unc. j. macis unc. semis , affund. Vin. Rhenan. mensur. j. Aq. commun. mens. iij. & leni igne abstrahe mens. ij. f.

*Art. 342.* Nec minus proficua sunt emetica . Nam *item emetica.* prima & præcipua in medicatione indicatio est ; ut venenum susceptum ocyus e corpore pellatur . Jam vero miasma contagiosum primo omnium salivali sese immiscet latici , cum hoc ad ventriculum descendit , & inde ad sanguinem transfertur . Hinc optimum utique consilium , ut venenum brevissima , qua subiit via , iterum exturberur , simulatque cruditates primæ regionis , quæ deleteriam ejus virtutem mirifice intendunt , per stomachicos everrantur . Sed opus est



ut cito id fiat; simul ac quis se infectum, & languorem cum cardialgia sentit. Sic subjuncto congruo sudorifero prima quasi in herba jugulari posse morbum, multiplici constat experientia.

*Art. 343.* De venæsectionis utilitate non æque inter omnes convenit, sed sunt qui laudant, sunt qui damnant. Optime præcipit Celsus lib. III. cap. 4. desiderat, inquit, propriam animadversionem in febribus pestilentialibus casus. In hac minime utilis est, fame aut medicamenti uti, aut alvum ducere. Si vero vires sinunt, sanguinem mittere optimum, præcipue si cum dolore febris est. Neque minus fidem facit Riverius in opp. tit. Pestis. —

Nos quid de ea censeamus supra jam exposuimus. Omnia autem huc redeunt: nunquam in principio post invasionem statim, ubi terrore, & metu æger jactatur, habet locum, sed secundo vel tertio die, si urget plethora, & vires sinunt, admittenda moderata.

*Art. 342.* Sic etiam de nitri usu ambigunt medentem. Qui rejiciunt, putant illud nimium refrigerare, & expulsionem veneni ob id resistere, pestis etiam venenum jam tum esse stupefactivum, putredinosum, ac diarrhœas inde metuendas ferre lethales. Qui probant illud non secus ac in aliis exanthematicis inflammatoriis, & malignis, febribus diaphoreticis nuptum egregie prodesse contendunt. Sed lis facile dirimenda. Spectanda sunt individua, eorumque natura, & temperamenta, & expectanda morbi symptomata. — Semper tamen tutius est, si nitrum sociatur camphoræ, quo connubio camphoræ vaporosa, & nitri refrigerans indoles optime cicuratur, & medicina emergit non modo alexipharmaca, sed & inflammationi efficaciter resistens.

*Art. 345.* Exterior in bubonibus si tardius prodeunt, attrahentia imponere jubent, cucurbitulas, quin vescicatoria. Si protuberant, suppuratio promovenda cataplasmate ex ficibus, radice liliorum alborum, cepis sub cineribus coctis cum farina lini, melle, & croco. Vel imponenda suppuratio simul atque discutientia, emplastrum diachylon tam simplex, quam cum gummatibus, de mucilaginis, nec non

De vo-  
nase-  
atione  
quid.

Quid de  
nitro

Bubon.  
& an-  
thr. tra-  
ctatio.



non de meliloto. Ubi suppurarunt aperiendi, & balsamo *Arcei* nonnunquam unguento basiliconis remixto mundandi, & consolidandi, ita tamen ut non nimis cito coeant, sed aliquandiu materiæ saniosæ concedatur effluxus. Anthracibus, quia humor jam corruptioni obnoxius, non admovenda suppurantia, sed curandum, ut crusta decidat, quem in finem *Loimiatri* confinia digestivo inungere, & acre emplastrum superponere jubent. Crusta delapsa ungento *Ægyptiaco*, vel fusco *Vurzii* cum melle rosato tractandi. Quod si autem corruptio sphacelosa adest, & latius serpere videtur, prohibendum hoc sufficiens scarificatione, & applicatione liquoris, qui potenter inflammationi ac putredini resistit, expertæ sæpius a me virtutis, parandi ex sp. vin. rectific. unc. iv. camphor. ʒij. croci ʒj. nitri artificialis tantundem hoc est ʒj. quod cx. spir. sal. armoniac. urinoso & spir. nitr. conficitur. ac a vini spiritu perfecte dissolvitur.

Regi.  
men.

*Art. 346.* Demum quoad regimen in genere adhuc tenedum, quod sicuti in omnibus acutis exanthematicis morbis, nimius lecti, & conclavis calor omnino studio, ceu summopere noxius, vitandus, ita multo magis ipsa in pestilentia. Vicissim vero arcendum etiam frigus, ne tumorum eruptio, & difflatio subtilioris venenosæ materiæ per cutis poros ullo modo intercipiatur. Temperata potius sint omnia, uti jam in antecedentibus passim monuimus, iterumque monemus.

### *Farrago sententiarum.*

Præser-  
vativa.

*Art. 347.* Si quis, ( inquit *Bonetus* ) cum ægris conversatur, qualicunque morbo affectis, nunquam, quamdiu intra sphæram vicinitatis talium moratur, salivam degluriat, sed semper eandem expuit, sic ab omni infectione, Deo & natura juvantibus, erit immunis. Observatum fuit scabiosos & lue veneræ laborantes peste minus tentari. Frustulum myrrhæ in ore detentum in locis contagiosis versantibus optimum præservativum censetur. Quidam medicus, seviante peste, sibi ipsi & quibusdam aliis seracum

in utroque inguine comparavit ; unde morbo intacti tuto evaserunt , Observarunt Forestus , Diemerbroeck , Galli , Angli , Germani omnes Smegmatopolas ; Lotrices & omnes qui ex officio sapone utebantur , immo qui saltem indusia sapone elotagerebant in peste illico mori . Boerhaave .

Art. 348. Peritissimi ( inquit Piso ) nonnulli Indiæ medicaltri plus præsidii in limonibus ponunt , quam in lapide Bezoar , aut theriaca contra malignos morbos , & pestilentes Febres , atque ipsa venena . Ego autem sine jactantia affirmo me ex nullo aliquo remedio simplici tot felices effectus in tota praxi mea observasse , quam ex limonibus .

Communis Turcarum praxis ( inquit D. Harris in tractatu de morbis infantum p. 88. ) in curanda Peste fit per succum limonum in omne jusculum liberius instillatum per frusta limonum saccharata ore frequenter masticata , & per potum apud nos vulgatissimum dictum Sherbett , hoc est , per ipsum regimen frigidissimum : utpote quibus alexipharmaca nostra calidissima bonis auspiciis sunt plane incognita , aut in nullo numero saltem habentur .

Art. 349. Ex regno vegetabili supereminet camphora , quæ ab omnibus practicis extollitur ( inquit Ettmullerus ) unde nobile expertissimum oleum pestilentiale Heinsii , medici Veronensis , qui cum hoc mira præstitit , adeo ut ipsi post mortem Veronæ statua fuerit erecta ; Compositum est ex o. camphoræ succini & cort. citr. ana p. æ. quæ oleo invicem bene juncta constituunt hoc mirabile remedium : pro præservatione dos. gut. 5. vel 6. pro curatione a gut. vj. ad xv. in viculo idoneo expectando sudorem , Sal viperarum & Rob. Sambuc. laudantur .

Art. 350. In usu etiam sunt quamplurima alia remedia composita ad præcavendum & curandum gravissimum hunc morbum , ut

#### Aqua prophylactica .

℞ Rad. angel. zedoar. ana ℥j. petasitid. ʒij. sol. rut. m. iv. meliss. scabios. flor. calend. ana m. ij. nuc. jugland. immatur. concis. ℥ij. succ. pom. citr. ( vel aurant. acid. ) ℥j. acet. vin. ros. ℥xij. digere

Vires  
limon-  
um .

Vires  
cam-  
phoræ .

gere per noctem & distilla lento igne ad siccitatem.  
Optimum alexiterium habetur.

### Acetum Pestilentielle, Bat.

℞. Rad. angel. zedoar ana ℥j. bacc. junip. ℥ij. rut. m. iij. acet. opt. ℥ij. macera, ac cola. Pro suffitu, & oris collutione grassante Peste.

### Aqua theriacalis. Diemer.

℞. Rad. nasturtii, petastid. angel. carlin. valerian. ana ℥ij. enul. campan. cort. aurant. sicc. ana ℥ij. herb. scord. absynth. ana ij. card. ben. ℥ij. flor. ros. rub. ℥j. stæchad. iij. bacc. junip. iij. cardamom. min. ℥v. cinamm. ℥j. vin. Rhenan. vel Gallic. tem. ℞xij. aqu. ros. ℥ij. vase bene obturato stent. in infusione dies. x. deinde add. fol. rut. m. vj. tanacet. m. iv. rorismarin. pimpinell. ana m. i. maneat simul in infusione adhuc per octo vel decem dies, quotidie baculo commovendo, postea affunde succ. citr. ℥ij. stent. adhuc per 3. 4. dies, postea super ignem leviter ebulliant, & colentur, ac in torculari fortissime exprimantur; collatura destilletur in b. m. & serveatur ad usum.

### Cataplasma Pestilentielle. Bat.

℞. Stercor. columb. ℥iv. eroc. ℥ss. Mithridat. theriac. Lond. sem. sinap. ana ℥j. tereb. q. s. m. Pro bubonibus rumpendis invenienda.

Item Spiritus theriacalis camphoratus, tindura bezoardica Batean. Et alii innumera apud scriptores medicos.

Officia & præcautiones Magistratum.  
Art. 351. Morientium numerus, quo loca tali miserie infecta horrescunt, & cadaverum multitudo in sepulchretis congesta, cum oculos animumque terrore conficiant; merito quisque alibi quærit asylum, ubi a tam contagioso malo tutus ac immunis vivere possit, cujus tam subita & periculosa est communicatio, ut homines halitu sibi ad invicem morbi semina dicto citius aliquando transfundant.

Art. 352. A Magistratibus locorum, in quibus morbus grassatur, tentoria citra tormentorum bellitorum jactum imperanda sunt, in quæ transvecti ægri  
me-



methodo infra tradenda curari debeat. Ex publico aere lignorum viridescantium, & sæni strues parandæ, ut diu & jugiter vel ardeant vel effument, etenim per media tentoria, & per urbem tali modo aeris communicatio intercipitur. Si circumpositum solum herbis aromaticis & balsamicis ditescat, eadem evulsæ super ardentes strues cremari debent, ut earum fumo infectus aer corrigatur. Tales quidem ignes per plateas, & latiores vias multiplicare præstat, eum ab eis tutior præservatio, quæ expectari possit, comparetur: sic Hippocratem factam testam insulam Coos a Peste crebris & magnis ignibus passim accensis præstitisse accipimus. Præterea Magistratibus ab initio usque incumbit, ut sordes, impuraque, & foetida alijunde transferri jubeant, quippe quæ virus pestilientiale & fovere possunt, & abditum diu conservare; fimum aliasque impuritates a plateis atque magis frequentatis viis longe arcere; extra templa cadavera, sepulcris procul ab Urbe dissitis recondita vel calce absumi, cætus omnes & publicos conventus; atque adeo commercium & societatem cum urbibus, in quibus morbus viget, & quæ suspectæ sunt, interrumpi; nulla prava alimenta inferri, sed tantum quæ laudabilem nutritionem, & succum ministrant, atque demum statim ac morbus primo erumpit, cito sanos ab ægris discriminari.

*Art. 353.* Sequentibus autem signis pestis se se manifestat. Corripit primo ægros rigore, & horrore, qui paulo post internum ardorem validumque percipiunt. Quamvis vehementer hunc ardorem percipiant, ut plurimum tamen minime alterati apparent; subinde levi febricula tenentur; & siti tantum inconsumpta. Major aut minor sit febris, interdum lingua sicca atque fusca apparet; urinæ subinde a naturali statu non recedentes, quæ in nonnullis tamen rubicundæ ac flammæ prodeunt, in aliis limpidæ atque crudæ, in quibusdam demum turbidæ & sedimentosæ; & identidem eodem die sæpe mutantur, nam modo sanorum urinis similes, modo sanguinæ videntur. Quandoque ægrum profundo somno detentum vel etiam delirio, sæpe atroci capitis dolore, vigiliis sociato, oculis ardentibus, & cordis angustia oppressum offendes.

Signa &  
symptoma  
Pestis.

des . Pulsus ejus interdum validus ut in statu naturali apparet, interdum vero debilis, parvus, & frequens, modo æqualis, modo inæqualis; & in quibusdam etiam intermittens. Continuis agitationibus ægri exercentur, qui timore quasi perculsi toti concremescunt, nam & tendinum subsultos eos vexant, & convulsivi tremitus per artus, visum item obfuscatum habent, atque de tinnitu & aurium susurro conqueruntur. Quidam reperiuntur a principio usque viribus fracti, alii contra quorum vires usque ad obitum valentes satis persistunt. In nonnullis alvi fluxus quibuscumque remediis pertinaces observantur, in quibus egestionibus crudæ interdum sunt, & frequentes, ut plurimum tamen aquam impuram referunt, in aliis etiam vermes, Hæmorrhagiæ per nares diffusilimæ vel per oculos, aut aures, aut virgam, aut uterum in quibusdam occurrunt, in aliis etiam continui vomitus. Sunt qui nauseas, anorexias, cardialgias, & singultus patiuntur, & qui maculas in cute rubra, purpureas, violaceas, nigras modo majori modo minori numero referunt, quarum figura subrotunda, magnitudo vel major vel minor, situsque vel in una aut altera parte, vel per corpus universum. Plurimi item dantur ægroti, in quibus bubones retro aures, ad mentum, vel collum, sub axillis, & ad inguina prorumpunt, vel in quibus carbunculi exoriuntur a diversis corporis partibus, quæ ubi apparent signum certissimum grassantis pestis exhibent, maxime si febrem comitem ducunt, aut eidem superveniunt.

Definitio Pestis.

Art. 354. Ex his omnibus liquidum est definiri posse pestem, *morbum esse epidemicum, contagiosum, acutissimum a veneno subtili productum, quod per aerem diffusum corpora nostra subit, bubones, carbunculos, maculas vel exanthemata aliaque graviora symptomata producendo.* Hic sane morbus insigni, miraque corruptione sociatus, in qua itidem ejus naturam atque essentiam consistere affirmamus.

Generis et observationes circa remedia antipestilentia.

Art. 354. Quantum ad remedia huic flagello propria, notum est, ea de quibus olim utiles experientie captæ fuerunt, in aliis occasionibus reperta fuisse inutilia. Nam miasmate venenoso eodem jugiter non existente mirum non est, si ad nova experimenta con-

fuge.



fugere necessarium existimetur; tum etiam si in contagiosis morbis, ut in variolis, purpura &c. in quibus aer minimam partem habet, ratione habita ad causas intus operantes, remedia specificè efficacia uno anno reperta, subsequente vel inutilia, vel nocua deprehenduntur. Quid, amabo, concludendum erit, de *Analeptis*, *Alexipharmacis*, *Cordialibus*, aliisque remediis feliciter adhibitis, & summa laude adversus flagellum hoc usurpatis, maxime ubi perpenditur huius fomitem plus in atmosphæra aeris quam in corporibus eandem inspirantibus latere? Præstantius quod hac in re consilium commendari potest, est profecto illud, quod omnia remedia, quæ hisce in occasionibus utiliter adhiberi possunt in usum trahantur, eadem plurimis, diversisque ægrotantibus porrigendo, indeque productis effectibus diligenter attendendo. Ceterum quæ deinceps præscribemus, vel jam experientia comprobata, vel saltem consentanea sunt principiis omnium consensu admissis, atque adeo digna videntur, ut tentamini subjiciantur.

*Art. 356.* Inter tutiora præservativa compositio *Acetum quatuor latronum* dicta, primas equidem obtinet, ideo conveniens erit ut tempore, quo Pestis grassatur, Magistratus jubeant, insignem ejus quantitatem singulis maxime pauperibus gratis erogari, unde unusquisque secum fere possit præservativum ori & naribus subinde admovendum, cujus compositio habito respectu proportionis partium, si quantitas augeatur, hujusmodi est.

Quædam præservativa medicamenta.

*℞. Acet. alb. ℥iij. ꝑ. allii concis. unc. iv. Ass. fœtid. unc. j. radic. gentian. unc. ij. mithrid. unc. j. hacc. junip. man. j. infund. super. cin. calid. vel ad solis calor. per hor. 24. in vase claus. dein facta percolat. & express. servet. usui. Singulo mane stomacho jejuno cochleare deglutiatur. Sed huius aceti compositio secundum Pharmacop. Paris. ultim. edit. ita se habet. ℞. summit. recent. absynth. maj. & min. rorismar. salv. menth. rutæ ana unc. j. sem. flor. lavendul. unc. ij. allii ℥ij. calam. aromatic. cinamon. caryophyl. nuc. mosc. ana ℥ij. acet. opt. lib. viij. infund. & macer. per dies xij. ad solis calor, vel ad ign. aren. in vase vitr. optime clauso, dein liquore*



*decantato, & forti express. resid. filtr. demum add. campb. in vin. sp. solut. unc. sem.*

Adversus aeris corruptiones eximas virtutes habet acetum hoc, cujus inventio quibusdam tribuitur furibus, qui specie auxilium ferendi ægrotantibus in Peste Massiliensi magnas opes furtum congesse. Historia narrat, ex iis quempiam in carcerem conjectum, & suspensioni damnatum, vitam oblato arcano remedio sibi redemisse. Hinc hujusmodi acetum sæpenumero servata vita per naturalia mortis pericula, etiam a furca nequam hominem vindicavit. Ceterum ad valetudinis tutelam præstat in ipso cubili, ubi morari datur, juniperum, roremmarinum, lavedulam, & hyssopum vel alios aromaticos frutices accendere non solum vespere dum cubitum itur; sed mane etiam dum surgitur, Post hæc duo alia præservativa hic insuper sistimus.

*Infusum antipe. Stilentiale. Aliud præservativum.* ℞. Summit. genistr. caulic. rub. pug. ij. contund. par. & infund. in vin. alb. per dies ij. huius infusionis singulo mane ante egressum duo tresve digiti transversi e cyatho hauriuntur.

℞. Salv. maj. rutæ fol. sambuc. rubi ana man. j. ginger. unc. j. vin. alb. ℥iij. infund. per hor. viij. deinde ebull. per horæ quadrant. & colat. servatur usui, cui add. ginger. pulv. unc. sem. Dosis duor. vel trium digit. in cyath. sing. mane per novem dies continuanda.

*Art. 357.* Si pestilenti morbo laboratur, theriacæ drachma cum cyatho dimidio aquæ buglossi assumenda est, indeque bis in die remedium supra descriptum hauriatur, & si carbunculus vel bubo proruperit, eidem imponenda sunt folia sambuci, & rubi cum semine synapeos contusa.

*Art. 358.* Perraro admodum purganda est alvus, quod si opus, nisi lenioribus præservationis gratia subduci debet, nam validior purgatio omnes corporis humores commovet, eosdemque suscipiendo viro pestilenti idoneos reddit.

*Art. 359.* Corrumpi potest aer, non solum ignibus, & flammis: ut superius meminimus; sed etiam suffugiis ex sulphure, & nitro simul mixtis, quare pulveris pyrius optimi correctivi vices præstat; sed juniperus.

perus, thus, pix nigra, & camphora veluti validiora præservativa ad suffumigia paranda commendantur. Ad abigendum igitur malum aerem, quod sequitur; suffumigium valde præstat.

24. Vitriol. ij. ruſſæ man. j. acet. deſtill. unc. xiv. mæcerent. ſimul per hor. 24. additoque vitrioli pulver. verſatur liquôr ſuper lateres ad ignem candefactos, atque fumus inde exhalans malum aerem corrigit.

Art. 360. Nec e domo quifque egrediatur jejunos; & ut à peſte immunis abire poſſit, panis fruſtulum ex cyatho vini abſynthiti quotidie devoret.

Vel: 24. Fruſtulum camphoræ magnitudinem piſce æquans, quem ad flammam accenſum in cyathum vini plenum deſice; ſi in caſu exſtinguitur, toties idem accende, quouſque totum abſumitur. Hoc vini cyathum antequam e domo egrediaris propinato.

Tamquam validum præſervativum habetur quoque ſpongia aceto imbuta, & naribus adnota. Præſervationis gratia ſequens item valet remedium.

24. Rad. angelic. cortic. citr. q. v. macerentur in aceto per hor. 24. Huiusmodi radicis vel corticis fruſtulum ſæpe ore detineto, & maſſicato.

Art. 361. Ad curandam peſtem ſudoriferis, alia ſiſtimus remedia, quæ magni æſtimantur; maxime vero, quod ſequitur Opiatum.

24. Croci, rad. cyperi; tormentill. ſemin. ſynap. ana unc. j. hiſce radicibus, & ſeminib. ſeorſim pulveratis miſceantur; & cum mithridat. unc. iij. atque acet. optimi tantundem diu agitentur in mortar. mar- mor. opiatum hoc in vaſe probe claſſo conſervatur, ne evaporet.

Remedia  
cura-  
tiva  
Peſtis.  
Opiatum  
antipe-  
ſtilen-  
tiale.

Statim ac quis percipit ſe à morbo correptum hu- jus opiatum unam cum cyatho dimidio vini albi tepentis ſolutam propinor; & per biborium inceſſum abeat, poſtea in lecto cubet calefacto, & ſtragulis optime coopertus ſudet, ſudorque ejus pannis lineis calefactis identidem abſtergatur; & corpus fricetur. Tempore quinque vel ſex dierum vino ſe abſtineat, & ptifana tantum utatur ex rad. ſcorzoner. graminis cum hordeo. Sed aquam antipeſtilentialem itidem ad- dimus.

Aqua

4. *Herb. sclareæ vel chelid. maj. man. ij. salu.*antipe-  
stilen-  
cialis.

*minor. artemis. centaur. min. ana man. j. rad. cy-  
per. scabios. cann. montan. petersil. fœnicul. ana man.  
j. concis. infund. in acet. fortiss. lib. x. per hor. 24.  
dein alambic. destillantur, cujus aquæ destillatæ duo  
vel tres digiti transversî in cyatho ei exhibentur, qui  
sefe a morbo correptum percipit; quique postea diu  
ambulabit donec plurimum incalêscat, atque inde de-  
cumbendo sudabit, & sudorem calide a se abstergere  
jubebit. Aliud item remedium contra pestem est.*

Pulvis

antipe-  
stilen-  
cialis.

4. *Rad. cyperi, fol. & rad. scabios. rasur. in-  
terior. cort. nucum avellandar. ana man. j. rad. flor.  
& sem. cardui benved. man. iij. infund. in acet. opt.  
per 24. hor. Postea decantet. acet. exsiccata species  
pulverentur, pulvisque per densum setaceum trahia-  
tur, cujus cochleare, plenum dabitur ægro cum vini  
rubri parvo cyatho, cubitum iturq.*

*Art. 362. In curatione Pestis per sudorifera ca-  
vendum, ne æger fluente sudore dormiat, quia som-  
nus salubres evacuationes inhibet. Quodsi vigilæ  
urgeant, & timor adsit, ne delirium instet, nonnul-  
lis placet duo saltem grana laudani sudoriferis ad-  
dere, quibus delirium conpescatur, & finitis sudori-  
bus æger somnum capiat. Habenda autem est ratio  
virium ægri, dum sudor promovetur, idcirco satis  
est, una vel altera hora post sumptum remedium su-  
dare.*

*Art. 363. Incipiente Pestis invasione utilia admo-  
dum sunt Emetica; sed cavendum est, ne vomito-  
rium æger assumat, quin ejus Buboni unguentum sup-  
purativum applicatum sit metu ne vi vomitionis ma-  
teria noxia retrocebat. In hujus morbi regimine nec  
phlebotomia, nec purgatio, nec clysmata temere sunt  
præscribenda, & præservationis gratia balsamum apo-  
plecticum quisque secum fere potest, 4. *Sp. volat.  
sal. armoniac. aq. reginæ hung. vel malum citreum  
caryophyll. conditum, aut simile aliquod aroma, qui-  
bus auxiliis non tam olfactus recreatur, quam eri-  
guntur spiritus atque roborantur.**

*In cura Pestis quæ Londini grassata est, sequens  
Alius. pulvis egregia præstitit beneficia,*

4. *Ranam marem seu bufonem, quem exentera-  
tum*



tum exsiccabis cum jecore, indeque pulverabis. Hujus pulveris drachmam cum meri cyatho exhibeto.

Art. 364. Inter remedia quæ utiliter bubonibus applicari possunt commendanda sunt Emplast. Diachylon. com gumm. Vel emplast. divin. tum cataplasma. ex Cera, rad. lil. alb. & osalid. sub cinereb. coctis additis ung. basilico, & fermento. Aliud item quod plurimum laudatur remedium est.

Remedia pro Bubonibus.

℞. Cerae magnæ num. j. remotis exterius involucribus cum adnexis foliis nucleis projiciatur, pro quo ingerantur fol. plantag. rutæ, salu. min. menth. nigr. ana p. æ. cum mithridat. ad eandem quantitatē. Singule herbe contusæ, clausæque intra ceræ involucra humida circumducta tela sub cineres calidos coquantur. Cum satis coctas deprehendes in cyathum vini demerges, ubi etiam comprimes, & liquorem per filtrum exprimendo trajicies, si quod exhibet propinabi, & reliquum applicabis tepidum tumori, ubi aderit: sub axillis, ad collum, aut alibi, imposito desuper plantaginis folio. Hoc præstito decumbat æger calide, & probe fudet. Ubi sudor eruperit, linis calidis abstergatur.

Licet etiam pestilentialibus tumoribus sequens admoveat cataplasma; quod inter attrahentia excellit.

℞. Cerae magn. num. j. caput allii sem. synap. cochlearia ij. contund. simul in mortario; & Buboni admoveantur.

Ad bubones cataplasma.

Ad eundem obtinendum effectum aliud Cataplasma.

℞. Bacc. herb. a Paris dictæ, fol. scrophul. ferment. ana man. j. m. & f. cataplasma. bubonib. applicandum. Aliud.

Plurimum etiam celebratur sterco humanum forma cataplasmatum tumoribus imponendum.

Art. 365. Suppuratis tali pacto bubonibus ulcus exsurgens abstergendum est, atque consolidandum. Hinc scopo quod sequitur remedium facere potest.

℞. Rad. consolid. maj. man. j. conteretur & ulcери imponatur donec solidescat.

## SUDOR ANGLICUS.

*Voiliffi sententia.*

*Art. 193.* Sudor anglicus cœpit anno 1585. circa initium mensis Augusti, duravitque usque ad finem Octobris; & quamvis Sennertus dicat, hoc malum deinceps 40. annos regioni huic familiare & perpetuum fuisse, tamen nostrates, & medici, & historici, qui tunc aut prope ea tempora vixerunt, eum perfecta & magna intervalla habuisse observabant; cumque 66. annorum spatio solummodo quater redierit, viz. anno 1506. 1517. 1528. 1551. vix unquam supra sex menses defervisse, & nonnunquam spatio trimestri terminatum fuisse, eumque tempestatem valde humidam semper præcedaneam habuisse. At vero singulis quibus increbuit annis, maximas ubique edidit mortalium strages; ut ab unoquoque ejus regni quibusdam in locis tertia pars hominum brevi desideraretur. Tanta fuit ejus malignitas, ut quamprimum urbem aliquam invaderet, singulis diebus quingentos aut sexcentos occuparet, & ex ægris primo vix centesimus evaderet.

Morbi  
typus:

*Art. 367.* Morbi typum a Sennerto compendiose & methodice descriptum, etiam nostris authoribus consonum, hinc inferere visum est. Morbo hoc correpti statim sine bubone, carbunculo, exanthematibus, languores dissolvebantur, & animo deficiebant cum summo virium languore, inquietudine *noisroyr*, capitis dolore, pulsû crebro, celeri, inæquali, cordisque palpitatione maximâ; sudore vero disfluebant perpetuo & copioso, qui non finiebatur, antequam morbus solveretur, quod intra 24. horas contingebat; nam qui *sudorem* non proliciebant, neque *cardiacis* utebantur, & qui impatientius calorem ferebant, auramque frigidam captabant, ii omnes subito intra 24. horas moriebantur. Postea ubi morbi hujus ratio innotuit, ut ægri *sudores* elicerent, ac *cardiacis* se munirent, pauciores moriebantur.

Curatio  
describitur.

*Art. 368.* Circa curationem paulo accuratius scribit *Polydorus Virgilius*: post ægrotantium plurima experi-



perimenta & observationes, a juvantibus, & lædenti-  
bus factas, ita usuvenit; ut remedium unicuique  
promptissimum inventum sit, quod hujusmodi est.  
Si quis interdiu sudore corripitur, cum vestitu pro-  
tinus cubatum eat; si nocte, tum quiescat, nec se a  
loco moveat usque ad 24. horas exactas; interim ita  
se stragulis onoret, ut non provocetur Sudor, sed sua  
sponte molliter stillet, cibi nihil capiat, si tam diu  
tamen tolerare possit; neque plus potionis consuetae,  
ac calefactae hauriat, quam modice satis sit ad fi-  
tim extinguendam; inter hanc curationem imprimis  
caveat, ne manum quidem aut pedem suum refrige-  
randi, recreandique causa extra stragula proferat,  
quod facere lethale est. Addunt alii toto isto nycti-  
hemeri spatio a somno prorsus abstinendum fuisse. A  
sudatione hac Pestilenti recuperati postquam aliquam  
diu sani perstitissent, quandoque in eam rursus, imo  
interdum vice tertia, incidebant.

*Cajus apud D. Freind. Hist. Med. p. 335.*

Vol. II.

*Art. 369.* Sudor Anglicus fuit morbus tempora-  
rius, *magne Britanniae* indigena. Cœpit primo anno Sudor  
1483. in exercitu regis *Henrici* septimi quum ad por- Angli-  
tum *Milfordiensem* appulisset; *Londini* sæviebat a 21. cus.  
Septemb. ad finem Octobris. Et exinde quinque aliis  
vicibus in insula nostra comparuit, idque semper æ-  
stivo tempore primo in 1485. deinde in 1505. &  
tunc tertia vice in 1517. ubi tanto impetu æstuebat,  
ut in instanti quasi, tribus nempe horis, mortem in-  
ferret; inter optimates multi, & populares plurimi  
moriebantur; in quibusdam oppidis incolarum dimi-  
diam partem abstulit. Tum demum in 1528. quarto  
redibat, quando ægri inter sex horas perierunt; vita  
ipsius regis *Henrici* octavi valde periclitabatur; pluri-  
mi inter *Aulicos* interibant. Anno sequenti, viz.  
1529. semel tantum *Belgium* & *Germaniam* infesta-  
bat, apud quos multi occubuerunt. Postremo anno  
1551. *Angliam* ultimo invasit; *Westmonasterii* cen-  
tum ac viginti in dies moriebantur. *Salopie* specia-  
tim, ubi *Cajus* author noster commemoratus est, ingen-  
ti hominum clade invaluit, & tanquam *Pestis Athenis*  
tremenda est ejusdem descriptio, hoc oppido per se-



ptem menses deflagravit, quo tempore mille hominum trucidavit. Maxima proprietate ab illo vocatur *Febris Pestilentialis contagiosa anius diei*.

Sympto. *Art. 370.* Modus invasionis sic se habuit. Impri-  
mata. mis singularem aliquam partem affecit; symptomata concomitantia fuerunt calor internus & ardor; siti inexplibilis, anxietas, ægritudo ventriculi ac præcordiorum ( raro tamen vomitus ) cephalalgia, delirium, deinde languor & somnolentia gravis, pulsus celer & vehemens, respiratio cita & laboriosa. Infantes, pauperes, & senes cæteris huic morbo minus obnoxii reperti sunt: reliquorum autem pauci a contagione liberi, & inter correptos paucissimi convaluerunt. Exules patriæ in *Galliam*; aut *Flandriam* prophylaxeos causa fuga minus hospitali freti pariter eodem fato cum conterraneis suis obierunt. Et insuper, quod dictu adhuc mirabilius est peregrini tunc temporis in *Anglia* hospitantes contagio immunes extite-

Metho. runt, cum *Angli* peregre exsistentes morbo correpti sint.  
dus me- *Art. 371.* Medici hujus novi morbi adeo exitialis  
dendi, aspectu terrifico percussi primo obstupuerunt, nec quid faciendum esse bene norunt: Experientia vero a iuvantibus, & lædentibus petita paulo maturius docti eundem debito regimini & medicamentis temperare didicerunt. Indicatio curativa primaria, ac præcipua fuit *sudorem liberum promovere & diutius sustentare*: Sudor enim quoquomodo imminutus, abruptus, vel suppressus mortem accelerabat, quo circa ægroti omnia opera a frigore muniendi fuerunt & si sudores sponte sua haud satis copiosi fluxerunt, medicamentis diaphoreticis, & stragulorum plurimum inpositione provocandi fuerunt, & vires cum cardiacis, & vino sustentandæ. Morbus hic acutissimus quindecim horis ad *acmē* exsurgebat, sed non ante hor. 24. res in vado fuit. In quibusdam necesse fuit sudationem repetere, immo in robustioribus quandoque ad duodecimam vicem. Nonnulli, qui sudoribus haud sufficienter indulserunt, in *Fibres mali moris* inciderunt. Primis quinque horis potus omnino prohibendus erat; hora 7. morbus increvit, qua delirium superveniebat; somnus per totum morbi decursum sedulo excutiendus erat, & carnes non concedendæ.

## C A P U T II.

*Sive Fasciculus Morborum secundus.*

## I N F L A M M A T I O.

*Art. 372.* Inflammatio in genere est tumor renitens Inflam-  
matio  
in ge-  
nere.  
ad tactum cum rubore, ardore, dolore  
tendente, tensivo, pulsatili, punctorio, & gravativo,  
quibus semper accedit Febris plus minus acuta. Tumor  
vel resolvitur, vel suppuratur, vel in scirrhum abit,  
vel gangrænescit, & mortem infert.

## A N G I N A.

*Hippocrætis sententia.*

*Art. 373.* Anginæ non una sed tres sunt species. I. Spe-  
cies An-  
cipitis, & maxillæ intumescunt & sputum æger dif-  
ficulter deglutit, expuit autem & salivas duras, &  
paucas, & infra in facibus stertit, & si apprehensa  
lingua infpexeris, gurgulio non magnus est sed mol-  
lis, fauces autem intrinsecus salivâ viscosa plenæ  
sunt, & non potest excreare, & decumbere non su-  
stinet, verum si decumbat suffocatur, & oculi affecti  
sunt, & prominet velut in strangulatis, & intente  
per ipsos videt, & ipsos commovere non potest &  
anxius est, & exilit frequenter, & facies ac fauces  
ardent, imo etiam collum. At videntibus nihil mali  
habere videtur, & videt ac audit obtusius, & præ suf-  
focatione non intelligit, nec quid dicat, neque quid  
audiat, aut faciat, verum hians decumbit salivam fun-  
dens. Qui ita se habet quinta aut septima aut nona  
die moritur.

*Art. 374.* In secunda specie febris, & dolor adest II. Spe-  
cies.  
& fauces inflammantur, itemque maxillæ, & salivam  
deglutire non potest æger, spuit autem crassam, & mul-  
tam, & difficulter loquitur,

*Art. 375.* In tertia specie linguæ posterior pars III. Spe-  
cies.  
in-

inflammatur itemque locus sub tonsillis ad guttur, & neque salivam neque quicquam aliud deglutire potest æger, si vero coactus fuerit per nares ipsi effluit.

Obser-  
vatio-  
nes:

*Art. 376.* Dux humorum species Anginam faciunt, altera nempe a glutinosa, & frigida fluxione facta est, altera ab acri & calida. Prior fluxio in latiores decumbit venas, secunda in tenuiores; Prior quæ pituitosa est hyeme vel vere defluit, secunda Autumno & vere. Fiunt & Anginæ in pluviarum multitudine, & quadam constitutione vigente; in liberis raræ erant, & mitissimæ; in servis vero exuberabant, quibus vehementissimæ contingebant, & ab eis celerime peribant.

Pregno-  
sis An-  
ginæ.

*Art. 377.* Ab angina habito si tumor fiat in collo bonum, aut tumor, & rubor in pectore superveniat bonum est. Anginæ quæ neque in collo neque in faucibus quicquam conspicuum faciunt, verum suffocationem vehementem, ac spirandi difficultatem inducunt, eadem diè, & tertia occidunt, quæ vero tumores, & ruborem in collo accipiunt, & in cæteris quidem consimiles sunt, verum diuturniores; quibuscumque vero & fauces, & cervix, & pectus simul rubuerint diuturniores sunt: at ex ipsis maxime servantur si non recurrerint rubores; si vero dissipentur neque tuberculo foras converso, ac collecto, neque pure leviter ac sine dolore excreato, neque in diebus judicatoriis perniciosæ sunt; num etiam suppurati fiunt? Securissimum enim est ruborem, & abscessum quam maxime foras verti. Erysipelas vero foris quidem accedere commodum est, intro autem converti lethale. Convertitur autem intro, quum disparente rubore pectus gravatur, & difficilem spirationem habet. Quibus vero anginæ ad pulmonem vertuntur partim in septem diebus moriuntur, partim evadentes suppurati fiunt, sieductio pituitosa sursum ipsis non fiat. Quibus per pulsationis venarum vehementiam sterqus de repente alvum secedit lethale est. In angina sputa gracilium subarida malum, anginosi in lingua tumores citra signa disparentes perniciosi. Et dolores disparentes citra manifestam causam perniciosi sunt in anginis. Qui non brevi concocta expuunt perniciose habent. In angina dolores ad crura citra



notas cum febre perniciosi. Ex anginis citra indicationem præcordii dolor cum impotentia, ac torpore oriens occidit occulte, etiam si mansuete se habere putent. Ex anginosis citra notas attenuatis dolor ad pectus, & ad alvum progressus concitatus, pus egere facit; alias autem ejus qui exsolvitur tale est. In anginis omnia perniciofa sunt, quæ non manifestum dolorem faciunt, sed & ad crura dolores diurni procedunt, & difficulter suppurantur. Ex angina sputa viscosa, crassa, valde albæ, quæ violenter educuntur mala sunt, & omnis ejusdem maturatio mala. Ex angina subarida frequentia sputa cum tussi, lateris dolorem inducentia perniciofa; itemque ea quæ inter potandum per tussim submerguntur; sed deglutitio in anginis violenta mala est.

*Art. 378.* Si angina aut aliquis alius lateris in rebus ægrum divexarit medicamentis, quæ delinguntur repurgato; sin vero detracto copioso sanguine æger debilior videatur, infusum alvi per clysterem tertio quoque die exhibebis, donec in tuto æger fuerit, & fame opus habeat. Quamobrem sanguinem ex brachiis detrahes, mox venas quæ sub lingua sunt secabis, sed in prima, & altera specie cucurbitulas ad verticulum in collo primum affigito; deinde in capite præraso, & juxta aurem ad utramque partem apponito, & ubi cucurbitas affixeris ad multum tempus eas adærere finito, deinde calida exhibebis gargarismata, caput abrades, ceteraque tum capiti tum collo circumpones, lanisque circumvoves, mollique spongia ex calida aqua expressa fovebis. Bibat autem aquam, & mulsam non frigidam, cremoremque assumat.

Angina  
Cura.  
tio.

### *Aretæi sententia.*

*Art. 379.* Duæ Anginæ species reperiuntur, altera cum caliditate, & magna tonsillarum inflammatione, & extrorsum versus tumefactione, quin etiam lingua, gurgulio, & omnes adjacentes particulæ in tumorem efferuntur; altera iisdem locis collapsis, & submissis efficitur, sed interim compressio majore strangulatu discutiat, ut interna inflammatio ad cor usque

Duplex  
Angi  
næ spe  
cies.

usque pertingere videatur. Huic vero celestrime occurrendum est, nam & hac celerrime ægroti rapiuntur.

*Quæ clysteribus sunt;* eodem die clysterem imperatō, isque duorum generum sit, alter usitator, quo stercore educantur; alter ejusmodi, ut aliquas a tonsillis pectoreque humilitatem evellere possit; neque tamen in cæteris efficacior meraciorque esto, sed centaurii, & hyssopi decocta infundenda sunt; hæc enim etiam pituitam educere solent.

*Quæ phlebotomia;* *Art. 381.* Si tenuis autem victus præcesserit; scindere cubiti venam expediet, & latior sectio facienda est, ut majori cum impetu copiosior sanguinis emanet. --- Haud ignobile quoque adjumentum præstat, si ad animæ usque defectum ægrum perduxeris, usque eo tamen ne anima deficiat.

*Quæ cathartici.* *Art. 382.* At si deglutiendi via expeditissima sit elaterium, & cum mulla, & cum sero lactis, quantum ad purgandum hominem satis est præbeatur, aliis enim purgatoriis elaterium in his ægrotis præstantius est. Conferunt etiam thymelea & synapi, siquidem hæc ambo ventrem repurgant.

*Quando* *Art. 383.* In quibus vero inflatione deglutationem impediunt, lingua ad palatum reflexa ipsius venas (h. secundæ e. raninas) rescindito, quod si prompte multum sanguinis defluat inter alia remedia magis proderit.

*Gargarismata.* *Art. 384.* Irrigationes utique seu gargarismata locis inflammationis, primum quidem adstringentes ut retrorsum materiæ labantur; conveniunt, quamobrem lanæ fordidæ hyssoppi vino madentes, aut oleo ex immaturis olivis expresso accipiantur. Quia etiam cataplasmata irrigationibus similia funto ex. g. palmulæ vino madefactæ, & cum rosarum foliis contusæ, & si viscidum ac molle cataplasma desideretur etiam hordei farina admisceatur aut lini semen, & mel & oleum, quorum omnium mixtura fiat.

*In suppuratone Anginæ.* *Art. 385.* Quod si tumor ad suppurationem veniat, calida admovenda sunt: quibus & in altera anginæ specie utendum est. Adesto igitur scenigræci farina, & manna, & resina, quæ liquari possunt, & polioma inspergatur, nec non & fomentum calidum adhibeatur spongiis in decocto lauri baccarum hyssopique

made ntibus . Ad movendum pus autem efficacissimus est columbinus simus tenuiter per lineum facculum instar pulveris transmissus ac super inspersus ; idem & caninus eodem modo præstat .

*Art. 386.* Ex mulsâ vero cum lentis , aut hyssopi , aut rosarum , aut palmularum , aut simul omnium decocto collutiones fiant . Illinendum præterea totum os est ut & ad fauces mororum , aut malorum punicorum aqua maceratorum succo , aut palmularum decocto , vel etiam compositis medicamentis ut Diamoro aut eo quod ex ruta sylvestri , & succo rhei componitur , aut Diachelidonio , idest ex hyrundinibus confecto medicamento .

Ad reprimendam inflammationem .

*Art. 387.* Sin ulcera crustosa sint , collutiones , & gargarismata fiant ex hyssopi in mulsâ , aut pinguium ascorum in aqua decocto : præter hæc amyllum percolatum in mulsâ , aut in ptisanæ tragive cremore ,

Ad faucium ulcera .

*Art. 388.* Si Angina cum concidentia , quæ erat altera species , occupet , ab interioribus extrorsum omnia vocanda sunt --- proinde calidæ irrigationes funto cum ruta , & anetho nitro insperso , & cum his superius memorata cataplasmata . Proficit etiam ceratum ex nitro , & synapi ad calorem excitandum superdare , calor autem exterior hujusmodi vitium tollit . Tumor enim foras in sublimè elevatus a pulmonis inflammatione liberat , intus vero abditus anginam periculosam facit .

Alteram Anginae species .

*Art. 389.* Quicunque strangulationem ab angina venientes , quo laxius spiritus duceretur , asperam arteriam fecuerunt , experimento sane rem comprobasse non videntur , nam vulneris ora in unum coalescere nequeunt quia ambæ cartilagine inter se inglutinabiles sunt . Id vero nostra ætate post plurima habita experimenta nullam facit difficultatem , instituta enim laryngotomia vulnus optime glutinatur .

Laryngotomia .

### Cæli Aureliani sententia .

*Art. 390.* INflammatio faucium , *synanche* dicta , est difficultas respirandi ( cum suffocationis periculo ) ob vehementiam tumoris faucium , in morbo nascenti adest querela sine ratione , atque difficilis motus

Anginae defectio .



motus colli, & gutturis, item saliva plurima, subdolens & faucium sensus cum asperitate sensibili; difficultas deglutitionis salivæ, tum respirationis, velut impedimentum tanquam obstantis crassioris humoris. Crescente malo partes affectæ rubent & tumunt; ut tonsillæ; & summitas gutturis fere ad suffocationem dehinc intumescit collum atque vultus; humores evadunt crassiores; oculi prominent sanguinolenti; demum lingua ultra dentes ad exteriora prolabitur; siccescunt fauces; gelidis torpor articulos invadit; pulsus est celer & densus; locutio cum summo dolore, neque articulata, postremo amputata; livor vultus; recursus potu liquoris per nares, gutturis atque pectoris stridor; & quibusdam quasi sonitus caninus, pulsus defectio, quibusdam oris spumatio; mors.

Curatio.

*Art. 391.* Lanis mundis ac mollibus; & non infectis dulci atque calido oleo infusis protegendum est collum cum thorace; adhibenda est plebotomia intra biduum. Aqua calida pro potu ordinario præbenda est.

### Boerhaavii sententia.

Angina  
sine tu-  
more  
fere sem-  
per le-  
thalis.

*Art. 392.* Angina duplex est: Species prima sine ullo tumoris externi internive signo, altera cum tumore aliquo; prior in fine morborum diuturnorum, maxime post ingentes & repetitas evacuationes; contingit; pallorem faucium & siccitatem, & tenuitatem comites habet; quare nervos & musculos resolutos pleurumque habet, fere semper est signum imminuentis mortis. *Anginæ gravissimæ sunt* (inquit Hippocrate prognost.) *& celerrime interimunt; quæ neque faucibus; neque in cervice quicquam conspicuum faciunt, plurimum vero doloris & orthopniæ inducunt.* Remedia vasa vacua bono succo vitali replentia, calefacientia & corroborantia indicantur; se raro curatur. Quandoque etiam oritur subito sine signis manifestis prægressis ullius morbi; vix capit medelam: & fere semper post mortem suppuratum pulmonem demonstrat.

Anginæ  
cum tu-  
more,

*Art. 393.* Angina cum tumore accidens varias occupat partes, uti linguam, ejusque musculos, palatum tonsillam, uvulam, pharyngem, laryngemque earumque

que musculos, ossis hyoidis musculos; fistulam pulmonalem, œsophagum ejusque muscunum; &c. quo plures harum partium inflammantur, eo sævior est morbus, & periculosior; decurrit enim consuetum inflammationis generalis iter, easdemque facit ac patitur mutationes in resolutionem; pus; gangrænam; scirrhum.

Art. 394. In specie hac inflammatoria omni arte tentanda est resolutio; 1. *Venæsectione larga*; & si opus fuerit, aliquoties repetita. 2. *Purgantibus ore haustis*; vel *clysmatibus*. 3. *Victu potuque tenuissimo*. 4. *Nitrosis subacidisque medicamentis*. 5. *Vapore tepido assidue hausto*. 6. *Acet. sambuc. rosat. calendul. ana ℥j. aqu. stillat. sambuc. .vj. misce*. Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces. Fomentis, epithematis; epispasticis; &c. His successu carentibus, prænuntiata prius ærba prognosi, celebranda erit *bronchotomia*; de qua operatione consulatur auctor, ut etiam de *Angina œdematosa, catarrhosa, schirrhosa, suppuratoria, gangrænosa*, singulatim.

Art. 395. In illa Anginæ specie, quæ Cynanche appellatur; ægro suffocanti Laryngotomia institui potest. Morbus ipse periculosior est, quam hæc operatio, quæ hoc tempore magis ad praxin esset revocanda. Circumspectione nihilominus hic summa opus est; ne; si aliæ quoque partes pulmo scilicet, pleura, gula, &c. inflammatae, aut jam pure repletae sint; irritus sit labor, & calumniandi ansam præbeat. Omnibus igitur bene consideratis operatio hoc modo est aggredienda: reclinetur aliquantum caput; quosque in conspectu magis prodeat trachea; annulique ejus cartilaginei a se invicem magis recedant. Incidatur deinde cutis secundum longitudinem laryngis usque ad foveam. Hæc utrinque ministri digitis deducatur, quo oculis chirurgi occurrant muscoli duo longi sternohyodei; cultro ligneo vel osseo a se invicem parum removendi; mox, larynge sese exhibente; sectio in ea fiat ope phlebotomi; loco inter anulum cartilagineum tertium; & quartum medio; sedulo cavendo ne cartilagineæ ipsæ lædantur. Flatu prodeunte cuthellum aufer; vulnerique fistulam argentæam insigito, bene prospiciendo, ne; longior iusto, posticam tracheæ partem

Indicationes  
curati-  
væ.

Laryngotomia.



atingat, unde tussis continua. Suffocationis periculo cessante, quod die tertio aut quarto plerumque contingit, vel saltem contingere oportet, fistula ablata vulnus ordinario modo secundum artem curetur, nam ab aliis non differt. Chirurg. Barbet. p. 498.

Ettnulleri sententia.

Angina  
divisio.  
Tonsil-  
larum  
inflam-  
matio.

Art. 396. Angina est faucium & colli inflammatio; dividitur in *synanchen*, quando interni faucium seu pharyngis musculi inflammantur; *parasyanchen*, quando dictæ externi afficiuntur; in *cinanchen*, quando internæ laryngis partes sunt inflammatae; *paracynanchen*, quando dictæ externæ patiuntur. In *cynanche* pulmone quoque sæpius afficiuntur, unde insignis respirandi difficultas, tanquam in *peripneumonia*, adeo ut ægri canum more ore hiant respirant. Tonsillarum inflammatio ex lymphæ vitio Febrem habet conjunctam, sed magis lentam, & omnia symptomata sunt remissiora, quam in *Angina*, fauces rubent: & tonsillæ tumidæ insigniter prominent. Periculosus est Anginæ in *Pleuritidem* transitus, Anginosi spuma circa os apparens est lethale signum.

Art. 397. In cura omnia ea conveniunt, quæ *pleuritis* in usu esse solent, speciatim animalium stercore, ut equinum, caninum, &c. quæ morbum in Prima herba detruncant; externe conducit cataplasma ex nido hirund. ʒ. nid. hirund. N. j. cep. sub cineribus assat. N. iij. stor. sambuc. p. ij. coq. in lact. & trahice per cribr. deinde add. alb. græc. ℥. ol. cham. stillat. ʒ. lilior. alb. q. s. m. Venæsectio aliquoties repeti debet pro ratione circumstantiarum; omittenda est tamen in *angina maligna*, in qua sudorifera & specifica sunt usurpanda: & ipse medicus caveat sibi ab halitu ægrotantium: Convenit vomitorium in principio anginæ malignæ, modo mature administretur. Purgantia locum non habent in angina, sed enemata & vesicatoria: Inter gargarismata urina propria valde commendatur, item succus sedi majoris, cum spiritu vini & sal. armoniac. & stercore canino. Præ reliquis convenit gargarisma ex decocto raparum cum pauco sal. armoniac. Ad rumpendum abscessum convenit gargarisma ex sem. sinap. in hydromel. coct.

Art.



*Art. 398.* In angina notha, alias alba dicta, non opus est *venæsectione* nisi in plethoricis, conducunt potius in principio *sudorifera*; & post hæc *purgantia leniora cum externis resolutivis*, gargarisma ex decoct. origani, rad. pyrethri, sen. sinap. cum aceto, &c. & postea succ. sempervivi cum syr. e moris.

Anginae  
notæ  
curatio.

### Barberyaci sententia.

*Art. 399.* Angina affectio est gutturis vicinarumque partium respirationem, vel deglutitionem impediens, modo solidorum, modo liquorum, ulla sine labe asperæ arteriæ vel pectoris.

Anginae  
defini-  
tio.

*Art. 400.* Dividitur in *spuriam*, & *veram*. Angina *spuria* quæ ordinario sine febre ingruit evenit: quando materia quædam pituitosa ad Pharyngem, vel ad glandulas laryngi circumpositas descendit, vel quando colli vertebra quædam luxatur, adeo ut ab ejus pressione, nec per trachæam libere respirare, nec per œsophagum alimenta deglutire liceat.

Eadem  
in ve-  
ram &  
spuri-  
am di-  
viditur.

*Art. 401.* Angina vero ea est quæ ex insigni inflammatione musculorum Laryngis vel Pharyngis carniūque vicinarum oritur; & cum vehementi febre sociatur. Hæc vero in quatuor itidem subdividitur species habito respectu partium, quas impetit; nam si interiores tantum Laryngis musculi inflammantur, dicitur *Cynanche*, si musculi externi *Paracynanche*; si vero inflammentur musculi interni Pharyngis *Synanche* vocatur; si externi *Parasynanche*.

Vetæ  
anginae  
subdi-  
visio.

*Art. 402.* Harum quatuor speciem interior causa eadem quidem est, ac quæ aliarum omnium inflammationum quamlibet corporis partem corripientium, videlicet sanguinis effervescencia, qui a carotidibus vehementer, & ingenti copia refluus mirifice has ipsas partes distendit, & nonnullis dilaniatis fibrillis extravasatur impedimentum facit subsequenti, ne per easdem venas ad cor pervenire possit; quare noviter superveniente ibidem loci sanguine, partes ille in tumorem crescere coguntur, donec extravasatus dissipetur, vel a præterfluente in vasa iterum rapiatur, vel fermentando putrescat, quod ubi contigerit tumore disrupto pus efluens, per os emanat vel in aspersam arteriam descendit, ni reclinato capite cito expuatur.

Anginae  
veræ  
causa  
interi-  
or.

*Causa* *Art. 403.* Inter externas causas recensentur: aeris  
*ejusdem* summum frigus, præsertim corpori valde calefacto su-  
*exter-* perveniens, potus algidi, prava constitutio aeris,  
*ne.* tempestatum anomalix; videlicet: ut quando modo calor,  
 modo frigus eadem die se se alternative exci-  
 piunt; insolatio cum capite nudato, ingentes vocis  
 conatus cum exclamatione, similiaque.

Quoad spurix Anginæ causas; jam satis memini-  
 mus ubi partitione hujus morbi in spurium & verum  
 dedimus, quare necessarium nobis non videtur, eadem  
 in re diutius immorari.

*Anginæ* *Art. 404.* Symptomata, quæ prosequuntur Angi-  
*Diagnos.* nam, adeo eam copertam reddunt, ut irritè tempus  
 absumeremus fusius clariusque ejus diagnosin perscri-  
 bendi: *Vera* autem a *spuria* discernitur, quia illa sem-  
 per cum febre conjungitur, in qua etiam major de-  
 glutiendi, aut respirandi difficultas adest, dolor lo-  
 cum affectum exercet, & rubor denique interdum fo-  
 ris apparet. Quæ a cujusdam vertebræ luxatione pro-  
 ducitur facilius ceteris cognoscitur. Si inflammatio par-  
 tes externas Pharyngis, vel Laryngis occupat, degluti-  
 tionis respirationisque difficultas major est, acubi in-  
 ternas partes tenet; hoc itidem casu dolor profundior  
 est, & inflammatio non raro ad externas usque par-  
 tes circa collum se se manifestat.

*Prognosis.* *Art. 405.* Inevitabilis necessitas respirationis, & ali-  
 mentorum satis evincit Anginam ex periculosis-  
 morbis esse, quia vetando, ne utrumque præstari pos-  
 sit, necessario sequitur ex defectu respirationis sangui-  
 nis circulationem inhiberi, unde eodem in pulmonibus  
 accumulatio suffocatio imminet; vel ex alimentorum  
 defectu, quibus corporis partes nutriantur, & spiri-  
 tum animalium jugis absumptio reparètur, mortem  
 fores pulsare; quin possibile sit ut aliò modo vitari  
 possit. Angina ex vertebrarum luxatione ferme sem-  
 per lethalis est; aliæ vero ejus species plus minusve  
 periculosæ ratione magnitudinis & gravitatis sym-  
 ptomatum, quibus sociantur.

*Curatio.* *Art. 406.* Curatur hic morbus eadem omnino ratio-  
 ne, qua reliquæ omnes inflammationes: videlicet re-  
 vellendo, & derivando sanguinem in faucium aliarum-  
 que vicinarum partium muscoli accumulatum; quod  
 ope

ope reiteratæ phlebotomiæ ad brachia, pedes, imo ad ipsas jugulares institutæ obtineri potest. Quia vero periculum imminet, ne æger repente suffocetur: maxime ubi inflammatio laticr est, & vehementior; ideo sanguinis effusio timenda nequaquam est, sed affatim jubenda; adeo ut tempore 24. horarum quinque vel sex vices usque venam secare liceat. Insistente morbo hyrundines utiliter hinc inde circa colum applicari possunt, maxime vero in ejus parte anteriore, cujus effectus quandoque mirabilia prestat, ut etiam cucurbitæ ad cervicem; & infra mentum scarificatæ. Venarum *Raninarum* seu *Ranularum* sub lingua apertior tanti non videtur momenti; ideo præteriri potest. Neque hyrundinas aut cucurbitæ scarificatæ usurpandæ sunt quin prius vena brachii; vel pedis; vel jugularis quater vel quinquies secetur. Post singulam Phlebotomiam clyster injicietur valide purgans; ut inde mobilior pars noxiæ materiæ ad inferiora sollicitetur; cujus sequenti rationem concinuatæ poterunt formulæ.

℞. Fol. Malv. mercurial. Betæ. Parietar. ana man. Clysters  
j. Sem. Anis. Fœnicul. ana ℥ij. Hordei, Furfur; ana  
man. sem. flor. Camomill. Melilot. an. pag. j. senn.  
oriental: semin. Cartham. Polypod. Querein: ana unc.  
sem. coq. in suf. aq. quantitate per aliquot hor. Co-  
lat. lib. j. dissol. Diaphœnic. Diaprun. solut. ana ℥vj.  
Mellis mercurial. unc. ij. f. Clyster una hora a phle-  
botomia injiciendus, & eadem die, vel postridie si  
opus repetendus.

Ceterum a primis usque morbi diebus exhibentur ægro emulsiões; ut inde sanguinis ardor temperetur; ejusque vehementior motus cohibeatur, quibus utiliter adduntur narcotica ad dolores, & defluxiones inhibendas.

... Amygdal. dulc. excorticat. & mundat. N. xii. Emul.  
4. Sem. maj. unc. j. Sermin. pap. alb. Lactuc. ana flo.  
2j. Contund. in mortar. marmor. sensim assumenda  
Aq. Ros. pap. rub. ana unc. iiij. & colatur adde Sy-  
rup. Capill. vener. vel Violar. vel Nenuhar. unc.  
sem. Syrup. pap. alb. ℥iiij. vel laudan. gr. j. & f.  
Emulsio vespere exhibenda.

Gargarismata, quæ hac occasione usurpari solent, ultimum quidem emolumenti non præstant, quibus ve-



ro eorum usus arridet, sequentem formulam ex melioribus, & usitatoribus adjungimus.

**Gargarisma.** ʒ℥. Rad. Glycyrrhiz. Cortic. Granat. ana ʒij. Flo. Balaust. pup. j. Uvar. exsicc. ʒvj. Caricar. ping. num. vj. vel vij. Aq. Hord. q. s. ebull. simul, & colatur lib. j. dissolv. Mellis Rosat. Syrup. Capill. verner. unc. j. & sit ad usum gargarismatis,

Vel sequens etiam usurpari potest.

**Aliud.** ʒ℥. Rad. Mal. Alth. ana unc. ij. Semin. Lini Fœnugræc. ana ij. Uvar. exsicc. man. sem. Flor. Camomill. Melilot. ana pug. j. Aq. Hord. q. s. eoq. simul, & in colat. lib. j. dissolve Syrup. Ros. exsicc. unc. j.

**Loboch.** Ad temperandam humorum acredinem partes inflammatas irritantium, sequens Loboch utiliter usurpatur.

ʒ℥. Mucilag. semin. Psill. Cydonior. Aq. rosar. contract. unc. iv. Syrup. Violat. unc. ij. m. f. Looch cojus nonnulla cochlearia subinde ægro porrigantur, ut intra os detineat; liquefactum sensim deglutiat.

Evacuatis sufficiant per crebras phlebotomias vasisbus purgandus æger est pharmaco sequenti.

**Potio purgans.** ʒ℥. Sennæ unc. sem. Pulp. Cass. unc. ij. Cryst. minner. ʒij. Ros. pallid. pug. sem. infund. frigid. in Aq. font. tribus cyath. per noctem, mane sequent. colat. ciathus dabitur hauriendus hora sexta, alter cyathus dabitur hora octava, tertius demum hora undecima: sed in primo cyatho tantum dissolvetur Syrup. de cichor. cum Rhabarb. unc. j.

**Regimen.** Insistente morbi gravitate etiam post reiteratas phlebotomias, quibus non obstantibus inflammatio æque valida perennet, & suffocationis periculum impendeat, purgantia omni dubitatione procul fortiora reddi debent, atque etiam D. RIVIERE exemplo emeticum propinari. quod tamen nisi præmissa consultatione discerni nequit.

**Art. 407.** Quoniam in hoc morbo febris vehemens ut plurimum occurrit, ideo jure carniū tantummodo solidis quibuslibet interdictis alimentis nutriendus est ægar, maxime vero ubi deglutiendi difficultate laboret. Quod si inflammatio ita oesophagum teneat, ut nec liquida alimenta descendere possint opitulandus est æger; immissa per eos cannula recurva ultra locum inflammatum sensim intrusa, per quam syringa nutrien-

trientes liquores in oesophagum injici debent. Hoc itidem casu commode nutrientes clysteres usurpantur, quorum ad exemplum sequentem tradimus formulam.

℞. *Juris carn.* ℥v. *sem. vitel. ovor.* num. ij. *sacchar. unc.* j. *m. f. clyster* si opus bis terve per diem reiterandus.

Clyster  
nutri-  
ens.

Art. 408. Omnia quæ hucusque proposuimus remedia deliniendæ inflammationi inserviunt, dissolvendoque tumori; verumtamen sit morbus adeo pervicax est, ut necesse sit ad suppurationem devenire, promovenda eadem erit cataplasmate emolliente aliquo, cujusmodi.

Quid  
præstan-  
dum?

ubi in-  
flamma.

tio ad  
supura-

tionem  
vergat.

Cata-

plasma  
emol-  
liens.

℞. *Fol. jusquiam. vel semperviv. q. s. coq. sub ciner. cald. intra chartam humentem revoluta.* Post coctionem pulpa educatur; *icem* ℞. *Rad. bryon. lil. alb. ana unc. sem. fol. pariet. man. j. flor. camomel. man. sem. coq. & contund. quibus per setaceum trajectis pulpa itidem educatur.* Mixtis utriusque pulpis adde *farin. semin. lini, fœnugrec. ana unc. ij. butyr. ol. camomill. parum.* F. cataplasm. quod collo applicabis, & quotidie bis renovabis.

Art. 409. Iisdem adhibitis vegetabilibus, cum additione folior. malvæ, & althææ juvabit collum tepide fovere, antequam cataplasma applicetur.

Quid  
suppu-  
rato tu.

more  
præstan-  
dum.

Absoluta suppuratione tumor aperiendus est, vel compressu digitorum, vel phlebotomo, vel cingula, vel demum *Pharyngotomo* quod instrumentum est, noviter inventum instar cannulæ phlebotomum occultantis, cujus cuspis occulti elateris ope, usque ad certam mensuram vibratur. Hujus instrumenti ope periculum abest alias partes simul rescindendi, sed tumor tantum impetitur. Si vero nudo phlebotomo operatio instituitur, acies ejus tandiu digitis occultanda donec ad gulam perventum est. Hic eadem parum produta tumor vulneratur, simulque ægri caput reclinando datur opera, ut effluens materia in os, non vero in fauces descendat. Quod si tumor adeo profunde in gulam lateat ut, nec videri; nec digitis tangi possit, ad instrumentum confugiendum est quod *speculum oris* vocatur. Hujus ope dilatato ore, & lingua depressa cultri acies parum recurva ingeri debet quæ capulo ligneo adeo longo munienda est, ut ad locum usque

tumoris pertingat, eademque demum tumor vulneratur.

Aperto inde tumore, atque pure emanante, decoctione quadam deterfiva, atque adstringente ulcus abluatur; cui scopo non contemnendam opem sequens exhibet.

Garga.  
risma  
abster-  
gens.

℞. *Hord. integ. man. j. rad. glycyrrhiz. unc. sem. uvar. exsiccat. ros. rubr. ana man. sem. aq. font. lib. j. coq. ad consumpt. quartæ part. in colat. dissolv. m℥. rosat. unc. sem. pro gargarism.*

Si ulcus sponte sua pedetentim non consolidatur, collyrio *Lanfranchi* subinde tangendum.

Interea perficitur curatio ægrum subinde purgando aut ejus alvum clysteribus laxam detinendo, in primis autem cavendo, ne solidis succosisque alimentis utatur, metu ne eadem materiam augendæ defluxioni aptam ministrent.

Ceterum antequam finem faciam monendum est fieri non posse. secus ac veteribus visum est, ut pus ab aperto anginoso tumore dimanans pectoris empyema generet, cum in ejus cavitatem descendere nequeat, quod sene necessarium esset ad empyema producendum. Nam omne quod evenire potest illud est, ut per asperam arteriam ad pulmones abeat, in quibus sensim depluendo, ulcus faceret vel affatim descendendo suffocationis periculum induceret. Ut plurimum tamen neutrum evenire observatur, quia si aliquid puris descendit id nisi per œsophagum sit, atque inde in stomachum, ubi nullum quidem, vel saltem non adeo insigne periculum impendit.

### *Farrago sententiarum.*

Syden-  
hami  
metho-  
dus.

*Art. 410.* Angina temperamento sanguineo præditos, & *rufos* præ reliquis invadit; *venesectio* copiosa in brachio celebranda est, mox in ranula; deinde tangantur partes inflammatae *melle rosaceo spiritui sulphur.* ad summum acorem permisto, & *vesicatorium* nuchæ admoveatur. Si morbus sit diuturnior, *venesectio* repeti debet & *enemata* injici, item *catharticum* propinari &c. *Sydenham.*

*Remedia Art. 411.* ℞. *ol. amygdal. dulc. flor. sulphur. ana 3i. chry-*



℞. *chrystall. tartar. sacchar. cand. ana* ℥ij. *ol. n. m.* ad saliv.  
*gut. iv. syr. de alb. ℥iij. m. f. linctus.* Atque hunc vain  
 præ aliis omnibus laudat Dr. Harris in observ. morb. moven-  
 grav. Ad salivam copiosissime educendam nihil pulv. dam.  
 sequent. (inquit author) præstantius efficaciusve no-  
 vi. 4. *chrystal. mineral. sacchar. chrystal. ana p. æ.*  
*misce,* teneatur in ore ℥j. donec saliva abundaverit,  
 tunc expuatur; horæ post quadrantem vel dimidium  
 repetatur, mirum quantum hinc salivæ, &c. *Musgra-*  
*ve. Succus corticis viridis nucum cum melle depu-*  
*ratus commendatur a Galeno.*

Art. 412. *Venesectionem in ranula omnes fere ex-*  
*tollunt, quidam in vena jugulari; phlebotomia vero* Rene-  
*in pede alterutris præferri debet ob majorem revul-* diu va-  
*sionem. Angina nulla tuta est, quanto minus tumo-* ria.  
*ris, tanto magis periculi; securissima est, si rubor ma-*  
*xime foras vertatur. Interne antipleuritica fere omnia*  
*profunt, privatim oleum lini nunquam satis laudan-*  
*dum, Externe gargarisma anginosum, gargarisma ad*  
*pituitam, cataplasma anginosum, vapor ad anginam,*  
*&c. Fullerii. Item gargarisma sequens in angina no-*  
*tha, 4. auric. judaic. ℥iss. rad. pyreth. -ij. herb.*  
*hyssop. p. ij. ficuum ping. scis. N. iv. coq. in aq. fort.*  
*q. f. ad. ℥j. sub finem addendo mellis ℥iv. colatur.*  
*add. pulv. subtiliss. alb. græc. -ij. sp. vin. rectificat.*  
*℥ij. sp. cochlear. ℥ss. misce.*

Art. 413. Angina vero ut plurimum a sola inflam-  
 matione musculorum pharyngis vel laryngis non gene-  
 ratur, sed sæpissime exoriri videtur a tumefactione,  
 & inflammatione glandularum, circa ædem organa ja-  
 centium quæque musculis insternuntur.

Quando plane confirmatus morbus est, & tumor una  
 cum inflammatione interius magis ac exterius promi-  
 net, nec non respiratio difficillima vel deglutitio ad-  
 modum impedita videtur, topicis remediis tantum non  
 est immorandum, sed frequentes, & copiosæ sangui-  
 nis emissiones jubendæ statim, quæ si nihil proficiant,  
 confugiendum est ad operationem *Bronchotomiam* vel  
*Laryngotomiam* dictam, quæ, utut periculosa vulgo re-  
 putetur, morbo ipso tamen minus habet discriminis.  
 Atque revera si pauci inveniuntur Chirurghi, qui ea -  
 dem calleant, multoque minus qui prospere perfolvisse

Veræ  
 anginæ  
 causa  
 frequen-  
 tiora.

affirmant, tota hujus operationis inefficacia ab hoc uno proficisci videtur, quod nimis sero, & circa extrema versante ægro suscipitur, atque per consequens tempore quo temerarium est, ac satis imprudens eam usurpare. Contra si pulmones nondum inflammati sint ægrumque facile operationem hanc perferre posse judicetur, tuto jubebitur, maxime quia innumera experimenta evincunt trachæ vulnera nec insanabilia esse nec lethalia.

*Bron-*  
*choto-*  
*miz de-*  
*scriptio.* *Art. 414.* Ad Bronchotomiam igitur ordinatim, & recte instituendam, lecto vel scamno æger assideat, posterius capite reclinato ad pectus famuli, ejus manur cum corpore possidentis. Sic locato ægro chirurgus situm commodiorem minusque periculosum ad perolvendam operationem eligat: videlicet ad pollicem infra Laryngem intra tertium, & quartum trachæ anulum cavendo, ne eos annulos lædat. His omnibus rite prænotatis integumenta primo transversim digitis comprehenduntur; tum secundum longitudinem secantur, & scalpello dexterius quo fieri potest muscoli Sterno-Tyrodei, & Sterno Hyoidei separari debent.

Detecta aspera arteria carnea membrana cartilagineos annulos conjungens lanceola transversim iuciditur, vitatis nervis recurrentibus necessarios spiritus ad munera organi vocis vehentibus, quæ iisdem nervis resectis desineret. Cavendum item est, ne profunde nimis adigatur instrumentum, metu oppositum latus trachæ vulnerandi.

Post incisionem non educitur lanceola, quin stylus immittatur ad parandam viam introductioni cannulæ, quæ brevis, recurva, & habendæ incisioni proportionalis antea comparatur. Eadem brevis adhibetur ne immissa oppositum trachæ latus attingat, indeque tussim continuam faciat, & duobus foraminulis instruitur, ut trajecto filo firmata in situ suo circa collum adligari possit. Quidam consulunt ad modificandum aeris per hanc cannulam ingressum, ut eadem gossypio vel velo obtegantur, alii contra irritas has præcautiones habent, & nihil omnino adjiciunt. *Cl. Boudon* autem cum *D. de Garrengéot* consentit relinquendam parumper esse cannulam omnino detectam, habita antea cautione cubiculi fenestras clausas detinendi, &

aerem igne admissō tapefacendi, postea vero eandem simplici velo obtegere satis habent, ut aer libere ingredi ac egredi possit. Velum emplastro perforato desuper imposito, & turanda ejusdem figuræ firmatur, atque hæc omnia abductis fasciis, quin cannulæ apertura nunquam obtegatur, in situ suo detinentur, ne ad capitis, & colli motum laxentur, aut decendant. Triduo ferme elapso cum aer per consuetas vias sibi transitum expedierit, atque respiratione satis libere cedente, totus apparatus cum cannula adimitur, curationisque intentio ad consolidandum trachæ vulnus convertitur, quod ex lege artis, eo ipso modo expeditur, quo reliqua vulnera tractantur, & sanescunt.

## PLEURITIS & PERIPNEUMONIA

vera & notha.

### *Æginetæ sententia.*

*Art. 415.* Dolor latericius, quem Græce *pleuritim* pleuritis quid sit? dicunt, proprie membranæ costas succingentis inflammationis est. Comitatur hunc anhelitus difficultas, tussis, febris continua, dolor ad claviculam usque, & præcordia pertingens: discerni autem pleuritis ab inflammatione jecinoris, in qua omnes hæc notæ apparent, hisce indiciis potest.

*Art. 416.* Pleuriticus quidem dolor punctilis infest, & tussis quandoque arida, quod morbum crudum portendit: quandoque cum sputi reiectione, quod humorem, qui morbum erat, innuit. Rubrum etenim & sanguinolentum excreatur, sanguine naturæ modum exuperante. Flavum verò & in pallorem languescens, cum flava bilis superat. Quemadmodum rursus albicans, & spumosum si pituita. In melancholico vero humore nigrius rejicitur. Pulsus durus ac ferræ modo denticulatus subest.

*Art. 417.* In jeceraia vero inflammatione, nullus Ejus di- dolor compungens neque durus adeo pulsus sentitur, stinatio sed arida tussis, qua nihil expuitur, usque molesta, ab he- facies pallidior apparet. parytide.

*Art. 418.* Quæ verò laterum compunctiones ex musculorum externorum inflammatione oriuntur, hæc quidem Pluritis nomen



thæ seu dem nothæ pleuritides appellantur, in quibus absque  
 spuræ. tiffi, absque excreationibus, cum molliore pulsu, locus affectus manu attrectatus dolore afficitur, & nisi suppuratus tumor discutitur, post coctionem ad exteriora prorumpit; quum pleuritis ex inflammatione membranulæ costas succingentis creata eo non feratur, illa vero nisi vel foras, vel intus a purulenta colluvie expurgetur, multo citius in vomicam peripneumiam transit.

Curatio  
 pleuri-  
 tidis.

*Art. 419.* Si igitur ad claviculam usque dolor protenditur, vena incidenda est; sin vero ad præcordia usque perveniat, purgandum. Reclamantibus autem viribus imbecilis neutrum faciendum; sed clysteribus acrioribus utendum. Quod si dolor mediocris assuerit, pro clysteribus aqua mulsa, & ptisanæ aut chondri cremor propinentur. Si dolores vehementer affligunt post evacuationem demulcendi sunt lanæ calentis vel sulphuratæ impositu, aut fomentis ex millio, & furfuribus in sacculo adhibitis, aut calida aqua, seu oleo vescicula excepto. Circa quartum diem forbitionibus ægrum nutrito adjecto melle perexiguo. Septem autem diebus elapsis, linctus ex amygdalis, semineque urticæ melle contritis offeretur, aut eclegma ex butyro melleque decoctum. Injiciendum insuper eo morbo oppressis per inferna medicamentum ex butyro & terebinthina. Sed efficacior linctus est, qui ex fructu piceæ: item ex amygdali amari, seminis lini, nuclei pinei, & amyli equilibrio cum melle conficitur. Quos autem vigilæ torquent, eos medicamentum e papaverum capitibus delingere competit. Post decimum vero & quartum diem si malum non cessaverit cucurbitulæ ipsis imponendæ, ægri in extenuatoria victus ratione servandi. Deinde ubi morbus remittitur in lavacrum ducendi, frigidum vitandum. Victus solidior adhibendus.

### *Aretæi sententia.*

Signo  
 pleuri-  
 tidis.

*Art. 420.* Hunc affectum comitatur dolor acutus ad jugula ascendens, ignis acer. Decubitus in latus inflammatum facilis est: in sua enim ipsius sede col-  
 loca-

locatur: in oppositam vero partem decubitus dolorem concitata; a pondere enim & phlegmone, & suspensio-  
ne in omnes membranæ continuas partes ad humeros  
usque, jugula, quibusdam & in terga, & in dorsi sca-  
pulas dolor protenditur. Pleuritida veteres Græci ap-  
pellarunt, Latini morbum lateris vel costarum.

Eam vero sequitur difficilis, spiritus, vigilia cibo-  
rum fastidium, malarum rubor hilaris, tussis arida,  
sputa ægre exeuntia pituitosa, aut biliosa, aut abun-  
de cruenta, aut subflava, & hæc ordinem non ser-  
vantia, sed alias alia advenientia, & recedentia. Ex  
omnibus vero pejus est si cruentum sputum desit.  
Delirant aurem & nunquam comate occupantur:  
atque in soporem gravem declinantes mentis alienatio-  
nes patiuntur.

*Art. 421.* Itaque si in malum vertatur morbus o-  
mnibus in pejus vergentibus intra septimum isti in syn-  
copem lapsi consumuntur. At si in secunda hebdoma-  
da educi sputa incipiant, & mala augecant, decimo-  
quarto die pereunt. Nonnumquam sane intra huius  
temporis spatium omnium in pulmonem transitus est.  
Trahit enim in se ipsum pulmo rarus, & calidus, &  
ad proxima trahenda sese commovens; tuncque mor-  
bi transpositione homo repente strangulatur. Ceterum  
si diem hunc ægrotus transierit; atque intra vicesimum  
non moriatur in empyema: hoc est pectore suppura-  
tus evadit. Hæc profecto si morbus ad perniciem ten-  
dat, eveniunt.

*Art. 422.* At si in melius vergat sanguinis e nari-  
bus larga profusio cum impetu succedit; tuncque re-  
pente morbus discutitur, quandoquidem & somnus o-  
ratur, & pituitæ rejectio advenit, postea biliosorum  
tenuium, deinde multo tenuiorum, rursus vero cruen-  
torum, crassorum, carnis formam referentium. Quod  
si post cruenta iterum exeat bilis, post ipsam pitui-  
ta, secuta est hæc in pristinum restitutio. Hæc si ter-  
tio die incipiunt, & facile extussunt, lævia, æqualia,  
humida, rotunda, septimo die liberantur, quando &  
venter biliosa exturbat, spiratio conquiescit, mens ad  
se redit, febres decrescunt, ciborum appetentes sunt:  
Si secunda vero hebdomada hæc inchoantur, decimo  
quarto die sanantur: sin minus in empyema h. e. pe-  
ctoris

Progn.  
sis 1836  
la.

Pro-  
gnosis  
bona.

toris suppuratione morbus vertitur. Id vero rigores indicant, doloresque punctorii: sedere cupiunt, spiritus deterius ducitur, tunc metus major est, ne pulmo pus multum subito attrahens hominem suffocet, qui prima & majora mala evaserat.

Verum enim vero si inter costas morbus irrepsit, easque disjunxerit; & phlegmonis fastidium extrorsum deprompserit, aut versus intestina eruperit plerumque homo ad sanitatem redit.

*Art. 423.* Inter anni tempora hyems maxime hujus morbi ferax est: secundo autumnus, ver minus, nisi interdem interdum frigidum sit; æstas vero minime.

Quantum ad ætates attinet in primis senes pleuritidi sunt obnoxii, qui etiam sæpius quam alii liberantur, neque enim magnus phlegmon in arido corpore excicari potest, neque in pulmonem transitus facilis est, quippe qui est in senectâ, quam in alia ætate frigidior. Juvenes autem, & viri haud ita frequenter in hunc morbum incidunt, verum neque admodum frequenter evadunt, nam neque ab exigua causa, neque ob exiguum phlegmonem ægrotant. In magnis autem majus inest periculum, & pueri minime pleuritide corripiuntur, minusque ab ea percitantur.

*Art. 424.* Si pulmo male habet pusillam quidem ob causam difficulter spirat, male vitam agit, mors tardissime advenit, si quis medelam adhibet. Si vitium insigne fuerit quale est phlegmon, strangulatus sequitur, vocis spiritusque sublatio, subitanea perniciēs imminet. Hæc est ægritudo ea quam Græci Peripneumoniam, Latini Pulmoniam dicunt: vomica scilicet pulmonis. Eam febris acuta comitatur, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur. At si quæpiam ex membranis eum ambientibus, & ad pectus deligantibus inflammatur, adest tunc dolor, spiritus est depravatus, calidus: sedere volunt laborantes ad spiritum facilius ducendum, rubescit facies, sed mala præcipue, oculorum album nitidissimum ac pingue est: summæ nares scimæ sunt, venæ temporum, vel etiam colli elatæ apparent, cibos averfantur: calor in exterioribus membris modicus, humectusque est in interioribus ingens, aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, linguæ siccitas, frigidi aeris aviditas; mentis



mentis ambignitas supervenit: tussis adest plerumque sicca, sin aliquod sputum movet perinde est ac in pleuritide sed cruentum, flore colore perfusum est, & aliis perniciosius est.

*Art. 425.* Quodsi mortifera magis ægritudo redditur, vigilæ augescunt, somnus paucus, torpidus, haud absimilis sopori, qui a Græcis *Coma* nominatur: cogitationes vanæ insurgunt: mens alienatur, non raro ecstasi corripuntur: præsentia mala ignorant, nam eos si de morbo interrogas, nihil periculi instare respondent, eorum algent extrema: livescunt ungues, curvanturque, motus arteriarum parvi, frequentissimique sunt, & deficientes, quando ipsis proxima mors est; nam septimo die plerumque moriuntur.

*Art. 426.* Porro si nonnumquam morbus subsistit, & aliquantulum in melius vergit, vehemens de naris sanguinis erputio consequitur; aut per alvum cum perturbatione multorum biliosorum, & spumantium succorum dejectio multa liquidior, & facilis; nonnumquam vero, & per urinarias semitas evocantur. Ceterum quibuscumque hæc simul eveniunt, hi quamprimum ægritudine sublevantur.

*Art. 427.* Quidam utique sunt, quibus magna vis puris in pulmone procreatur; aut ex pleuritide fit permutatio; si majus bonum suboritur. Quodsi ad intestina aut vesicam ex lateris morbo sanis derivata sit; tunc quidem continuo a pulmonis vomica liberantur; sed diuturnum ulcus, quod demum sanescit, in latere patiuntur. Quibus vero in pulmonem pus irumpit, nonnulli ob subitaneam, & copiosam effusionem, & rejiciendi infirmitatem suffocantur; At quicumque suffocationis periculum subterfugiant, ii longo tempore pulmonis ulcere cruciantur, & in phthisin prolabuntur.

*Art. 428.* Pulmonariæ seu peripneumonix curatio a sectione venæ in cubito incipienda est, sive utrinque a dextra videlicet ac leva manu, non tamen usque ad animi deliquium. Si paulum respiraverit æger, tunc suppressendus sanguis est, ac denuo post mittendus. Opus est autem humores. & flatus post venæ sectionem deorsum versus trahere nitro, melle, ruta, resina terebinthi liquidam sedem obtinendo: sed missionis

Prognosis  
la.

Prognosis  
sis bo.  
na.

Suppuratione  
accidente.

Curatio.

tionis sanguinis loco, si quod majus impedimentum sit, acrem succum per clysterem in sedem immittito: puta saltem cum nitro; aut terebinthi resinam cum melle. Item cucurbitæ sylvestris carnes interiores in aqua excoctæ conveniunt. Præterea inanes cucurbitulæ ægre gie faciunt, si ægri dorso præcordiisque ubique adhibeantur; nam si ad quamcunque partem corporis humores distrahantur, & spiritus ad extima evocentur, quibus pulmo opprimitur aliquod mali solamen invenies. Ejusmodi item medicamenta præbeantur, quæ humores ad transpirandum attenuent lubricos fluxilescque ad extrudendum efficiant. Propinquetur quidem celeriter juvandi causa nitrum cum hyssopi decocto; aut muria cum aceto, & melle, aut sinapi humidum cum melle: singulis autem iridis radicem, & piper inspergere auso bene cedit: item hæc aridia cribrato, & cum melle exhibeto. Thorax autem lanis oleo imbutis cum nitro, aut sale contegatur. Optima inunctio est ea quæ ex adarce fit. Sinapi etiam aridum, & cum cerato humido prodest. Atque in summa humores, & calor, & spiritus foras educendi sunt. Huic rei opitulantur acrium olfactus atque illitio, & extremorum deligatio. Hæc facienti nisi morbus cedat de humoris valetudine actum est.

*Cælii Aureliani sententia.*

Perip.  
neumo.  
nia ve-  
ra de-  
scrip-  
tio.

*Art. 429.* Peripneumoniam (uti plerisque alios morbos) optime descripsit *Cælius Aurelianus*. Adest, inquit, febris acuta, grævedo, thoracis; & sensus laborantium quadam difficultate laterum atque mediarum mammarum, decubitus supinus atque paulo erectior, supra latus jacendi difficultas, vultus rubor tanquam florens, oculorum splendor; sequitur anhelitus celeritas, tussicula sanguinolenta ac biliosa vel fumosa jactans sputa, pleuriticorum fulviora, vel spumosiore, spiratio difficilis, desiderium frigidi atque plurima aeris haustu rapiendi, frigidi potus appetitio, os siccum, lingua aspera, ac primum subalbida, deinceps rubra, pulsus vehemens & celer, & anxietas, jactatio, vigiliæ iuges, ingemens atque turbulentus somnus; aucto morbo spiritus difficillime trahitur cum sibilatu: sequi-

quitur colli ac vultus inflatio, oculorum immobilitas, visus nubilosus, mentis alienatio, articularum frigus torpor cum livore, lingua crassior, sudor superiorum partium, pulsus latens aut formicans; postremo pectoris resonans stridor. (En accurata morbi descriptio erubescant moderni.) In Peripneumonia hæc ad-

Hippo-  
cratis  
descri-  
ptio  
perip-  
neumo-  
niæ.

Art. 430. Adhibenda est phlebotomia; potui ordinatio danda est aqua calida, item cibus sordibilis & tenuis; conducunt eclogmata ex lini semine, fenug. nuculis & melle decoct. & ovorum vitellis confect.

Curatio

### Sydenhami sententia.

Art. 431. Temperamento sanguineo præditos præ reliquis Pleuritis aggreditur cum rigore, horrore, deinde calore, siti, &c. Elapsis paucis horis (licet aliquando multo serius) æger vehementi dolore punctio in latere circa costas corripitur, qui nunc versus omoplatas, nunc versus spinam, nunc ex adverso versus anteriora pectori se propagat, tussi etiam crebra affligitur: in initio materia pauca, & tenuis ejicitur sanguineis intermixta particulis, postea copiosior & magis concocta sanguine etiam permixta; aliquandopad expectorationem copiosorem non pervenit; febris pari assu incidit cum tussi, sputo sanguinis, dolore; & pro ratione liberioris expectorationis sensum imminuitur; alvus nunc nimis adstricta, nunc soluta.

Pleuritis  
descri-  
ptio.

Art. 432. Est ubi venesectione omissa æger ne tussire quidem valeat, sed immani dyspnœa laborans suffocatur; interdum ad apostemia res redit, quod empyema dicitur; per accidens (viz. ex usu medicamentorum calidorum) aliis febribus Pleuritis interdum supervenit ex precipitatione materiæ febrilis in Pleuram. Venesectio repetenda est ad 3. 4. vicem, si sit indicatio; in adultis vix sanatur minori quam 40. circiter unciarum sanguinis impensa. Æger e lecto quotidie.

Medendi  
methodus.



tidie eximatur ad horas aliquot, prout vires suaferint, quod multum confert ad curationem.

Perip-  
neumo-  
nia notæ  
descrip-  
tio. *Art. 423.* Peripneumoniæ nothæ insultu primo nunc incalescit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculique, tussis, & inter tussendum admodum dolet caput, ad vomitum proclivis est, urina turbida est, & intense rubet, sanguis pleuriticorum similis; adest anhelatio, & dolor totius thoracis, & pulmonum coarctatio. Ab *asthmate sicco* plane distinguitur, quod in isto nusquam comparent febris indicia, in hac manifesto se produnt, licet minora longe & magis obscura, quam in *Peripneumonia vera*.

Cura. *Art. 334.* Curatio *venesectione, remediis pectoralibus & dieta refrigerante* perficitur. Mistura expectorans Fulleri, vel syr. e Peto Batean. hic quandoque locum habere potest.

### Boerhaavii sententia.

Diffe-  
rentia  
inter ve-  
ram &  
spuriam  
Pleuri-  
tim.  
Pleuri-  
tidis ve-  
ræ cu-  
ratio. *Art. 435.* Pleuritis aggreditur nullam non partem integumentorum interni thoracis, pleuræ, scilicet vel mediastini; ideoque dolor punctorius in quamlibet partem thoracis incidere potest, sed frequentius latera obfidere solet, atque hæc febre conjuncta *veram* efficit *pleuritim*; si vero altius intercostales muscoli & his superiora laborant, *spuria* appellatur.

*Art. 436.* In Pleuritide vera sanguis mitti debet copiose quam mature per magnum vulnus, repetique debet pro ratione symptomatum urgentium; crusta alba absens *sanguinem mittendi finem* definit. Externe conveniunt *fotus, linimenta, &c.* Interne *diluentia, resolventia, refrigerantia, dolorem lenientia*; omnia calide & magna copia sorbenda sunt. Interdum locus inflammatus ad *suppurationem* vergit, quod scitur ex pertinacia doloris, febris, &c. ultra quartum diem; *abscessum* jam fieri cognoscitur ex horrore sæpe recurrente, remissione doloris, anhelatione, decubitu in unum tantum (i. e. in affectu) latus tolerabili. Rupto abscessu pus stillat in cava pectoris, & incrementum capit ex ulcere depluente, unde *Empyema*, de quo postea. Interdum vero locus affectus evadit

*scir-*

*scirrrosus* cum pulmonis & pluræ adhæſione, unde *aſthma* & *tufficula ſicca*, malum immedicabile, niſi quod forſan aliquid levaminis a labore & equitatione multa poſſit recipere. Interdum loca inflammata *gangræneſcunt*, unde mors cita ſubſequitur; *gangrænam* incoëptam eſſe ſcitur ex delirio, livido thoracis colore, ſputo ſubbiliſo, doloris ſine ratione remiſſione, &c.

*Art. 437.* Peripneumonia eſt inflammatio pulmonis totius vel unius lobi; prior immedicabilis merito cenſetur ob magnitudinem morbi, altera medelam quandoque admittit; eodem modo ac iſdem remediis tractanda eſt *Pleuritis*, eundemque ut plurimum habet eventum. Si non reſolvatur, *abſceſſum vomicae* format intra quatuordecim dies, quod fieri oſtenditur ex horripilationibus; doloris remiſſione, pulſus debilitate manentibus adhuc dyſpnœa, ſiti, febricula vespertina, &c. Exinde ſequitur interdum ſuffocatio ex ſubita eruptione puris in aſperam arteriam; interdum evacuatur ingenti ſputo purulento; vel in thoracis cavitatem delabitur, unde *empyema*, *phthiſis*, &c. poſtremo materies purulenta interdum intra pulmonales venulas reſorbetur, & cruori miſcetur, & in loca quædam alia deponitur, in hepar, lienem, cerebrum, &c. hinc fiunt *abſceſſus peripneumonici* ad aures, crura, vel hypochondria, ubi ſi cito evaneſcant, redeunte peripneumonia, caſus eſt lethalis.

Peripneumonia & purus & cura.

*Art. 438.* Peripneumonia notha oriri ſolet ex pituita lenta in toto ſanguine nata, & ſenſim pulmones inſiciente, donec in hunc morbum eat; ſenes, pituitoſi, frigidi, catarrhoſi, & gravedine laborantes huic morbo ſunt obnoxores: primo fallaci lenitate opprimunt inopinantes, quippe levi fatigatione, debilitate, proſtrato fere omni animi motu, anhelitu, oppreſſione pectoris incipiens, adeo leves motus excitat, ut vix caloris, febrisve indicia moneant periculi: mox vagæ horripilationes, leviusculi febris inſultus adſunt; unde ſubito crescente anhelitu, & debilitate, mors, cujus in urina & pulſu vix ullum adſuit præſagium.

Peripneumonia notha typus.

*Art. 439.* Curatur ſanguinis miſſione, *clyſmatibus*, *viſtu tenui*, *diluentibus*, *abſtergentibus*, & *leniſſime aperientibus* aſſiduo propinatis. Breviter & raptim hæc pauca decerpi, ſed de his affectibus præ omnibus

Curatio.

bus quotcūque scriptoribus consulendus est auctor præclarissimus, & ad illius mentem consequendam uixice incumbendum est, & summa impendenda est opera.

### Ettmuleri sextentie.

**Pleuri-  
tis.** *Art. 440.* Observatum semper fuit in *Pleuritide* correptis, quod non solum Pleura, sed pulmonis medietas simul in eodẽ latere inflammata fuerit. Interdum quoque cum pulmone inflammatur mediastinum, duplicatura nempe Pleuræ sub sterno; quæ nomine caret.

**Pleuri-  
tis no-  
tha.** *Art. 441.* Pleuritidis notha est dolor lateris punctorius, sed sine febre aut tussi; ægri ut plurimum in latus oppositum potius quam morbosum decumbere, queant; contrarium observatur in *Pleuritide vera*.

**Prognos-  
is.** *Art. 442.* Si statim intra triduum sputum cruentum appareat brevem morbum indicat, sin vero serius longum portendit. *Pleuritici* intra 14. dies superne non repurgati *Empyici* fiunt (inquit Hippocrates) & tales, si in 40. diebus repurgentur a diæ rptionis, liberantur, alioquin in tabem incidunt; in his affectibus sputorum potius habenda est ratio, quam urinæ; Pleuritis in principio leviter apparens & usque ad 5. diem sic procedens, 6. vero diæ exacerbata pleurumque est lethalis.

**Curatio.** *Art. 443.* In *Pleuritide benigna venesectio* si non juvat, non nocet, in *maligna* tamen vix locum habet, sed semper erit nociva. Ex omnibus auxiliis sudorifera primarium obtinent locum, & præ reliquis antimonium diaphoret. Antimonium diaphoreticum summe commendatur in *Pleuritide* tum vera tum spuria: egregie discutit humores congestos, acorem absorbet, dolores demulcet, expectorationem promovet, indicationibus fere omnibus satisfacit. Vvèdelius. Antimonium diaphoreticum aeri aliquandiu expositum vim emeticam acquirere nemo non novit, ideoque usus tempore lavari jubeo. Nobilissimum pectorale habemus in liquiritia & passulis saccharata non conveniunt; papaver Rhæas ejusque flores, seu optimum specificum, in toto morbi decursu locum



locum habent; omnia calide sunt bibenda; succus taraxaci seu dentis leonis vel decoctum ejus, ut & eryngii, landantur, item cheræfol. Succus raphani recens expressi. expectorationem mirabiliter promovet. Ad dolorem lateris externe commendatur stercus gallinæ cum ol. cham. ut & sequens cataplasma, alb. porri in sartagine cum q. s. ol. cham. frixi & ii. fursur. frument. m. j. læcum vin. alb. & iii. vel q. s. m. convenit. Aliam infus. seq. intus sum. p. m. Stercor. equi non castrat. vi. vin. alb. & iss. aq. flor. spin. alb. & ss. infund. clausæ & calide per hor. dimid. deinde coletur cum expressione forti, colatura cum alb. ovor. f. a. clarificetur, & add. aq. theriacal. stillat. ℥iv. syr. balsam. ℥ij. m.

## Baglivii sententia.

Art. 444. Durities pulsus est signum fere infallibile omnium Pleuritidum, quævis reliqua signa non adsint; durus enim pulsus omnium inflammationum partes nerveas vel membranas obsoletum est comes indivissus. Pleuritis vera (inquit Chyneau) cognoscenda est imprimis a pulsu duro. Nonnulli affirmant pulsum esse serratilem; sed ingenue fateor me nunquam serratilitatem illam deprehendere potuisse; ideoque parvi pendo tanquam rem fictitiam & imaginariam, contentus duritie pulsus, quæ sufficit ad Pleuritidem cognoscendam. Pleuritides frequenter sunt occultæ; quia indolentes, unde quandoque errores in praxi; hæc itaque ægrum in dextrum vel sinistrum latus decumbat, decumbenti impera, ut fortiter respiceret, & tussiat, & tunc pete ab illo, an dolorem aut gravedinem perferat, quod si affirmet, res manifesta est; hoc modo plures Pleuritides deteximus magno ægotantium commodo.

Art. 445. Omnis prognosis a bona vel mala respirazione maxime petenda est. Perperam agitur cum Pleuriticis, qui nihil expaunt, nisi copiose effluant urinae. Omnes Pleuriticos sanatos vidimus, quibus in interiora auris dolor & exinde suppuratio superveniant. Crusta alba non apparens in superficie missi sanguinis.

Signum  
parho-  
gnomo-  
nicum  
Pleuriti-  
dus;

Pleuri-  
tides  
occulta  
æ.

Prognosis.

guinis est pessimum signum. *Pleuritides recidivantes* omnes fere sunt lethales ( *ex Hippocrate.* )

Regulæ  
ue ve-  
næsectio  
ne, &c,  
Art. 446. Quando in Pleuritide viget indicatio dissolvendi, *camphora* præ reliquis opus absolvit, ( præsertim in *Pleuritide epidemica & maligna.* ) Si sputum antea suppressum superveniat, & sit flavorubescens nunquam imperato *venæsectionem*; nam post *venæsectionem* sputum denuo supprimitur & æger morietur. Quocunque die, secundo scilicet, aut 4. 5. 7. &c. ante vel post missionem sanguinis spirandi difficultas, & difficultas pariter excreandi sputi pleuritico superveniant, statim duo *vesicantia* tibiis admoventur, iuxta illud *Hippocratis*; in *pulmonicis quicunque tumores sunt ad crura optimi sunt*, &c. Post apposita vesicantia observavi expectorationem statim promoveri, spirandi difficultatem imminui, & alvi fluxum, si adesset, feliciter sisti, & ægrum sanari.

### Vvillisi sententia.

Horum  
affectu-  
um com-  
plicatio.  
Art. 447. Opinari decet *Peripneumoniam*, & *Pleuritidem* affectus esse modo singulares & separatos, modo connatos & primitus coexistentes, & modo invicem successivos aut succedaneos esse. *Peripneumonia* non tantum *Pleuritidi*, sed frequenter etiam *angina*, & aliis interdum affectibus succedit.

Pleuri-  
tidis c.  
ventus.  
Art. 448. De Pleuritico expectatur, vel ut morbus statim solvatur, partim crebra & libera *venæsectione*, & partim *sudore critico* die 4. vel 8. exorto, vel ut, his non rite succedentibus, diutius protrahatur; & tunc sæpissime huic morbo *Peripneumonia* aut *Empyema* vel *utrique affectus* superveniunt, periculi pleni, qui ægrum e medio ut plurimum tollunt, aut in *phthisin* ægre sanabilem aut exitialem præcipitant,

Cucur-  
bitæ.  
Art. 449. *Riverius* & *Zacutus Lusitanus* exempla notabilia adducunt curationis Pleuritidis per *cucurbitas* cum scarificatione loco dolenti adhibitas. Pro usu externo in linimentis utiliter addatur *album græcum*.

*Veræ sententia.*

*Art. 450.* Post veræ pleuritidis & propriæ traditæ strum reliquum est, ut cæterarum inflammationum & notharum Pleuritidum differentias ac distinctivas regulas præbeamus, & primo.

*Art. 451.* Pleuritis plerumque fit, quando ad sinistra latus circa mammas præsertim, & sub iisdem pleura inflammatur, ibique dolor precipitur, etsi tussiente ægro, hic ad scapulas vel prope eas quandoque respondet; sæpe vero morbus juxta diversum inflammationis situm aliter distinguitur. Præ ceteris notabilis est Pleuritis illa cujus lib. IV. de Morbos. affect. Hippocr. hæc signa præbet. *Pleuriticis ad dorsum in tantum ab aliis differt, quod dorsum dolet velut ex plaga, & suspirat, & acervatim respirat: statim autem sputit pauca, & corpus delaxatur; tertia aut quarta die saniem mingit subcruentam. Moritur autem maxime quarta die, sin minus septima. Quæ Pleuritis igitur gravissima est, & penes Auctorem ruinosa; tamen per id quod scio, hanc veluti duram cœcamque syrtem tumidiora ingenia præterlabuntur, & declinant, ac tamquam non foret, nec minime tangunt. Hoc Pleuritidis genus nos quoque Hippocrate docente observavimus, ejusque verba notando; quod dolor sit velut ex plaga. Dolor enim in dorso accedit non pungitivus, & acutus, sed remissior & obscurus, ut mihi percontanti respondebant ægroti, eum veluti ex profundo spinæ emanare.*

Pleuritis  
dorsalis  
defecti.  
ptio.

Ejus 1.  
specie.

*Art. 452.* Qui dolor in dorso interdum acutus est, quandoque valde acutus ut ibidem ille subjungit: Ceterum quibusdam Pleuriticis saliva quidam pura est, mictio autem cruenta, velut serosa a carnibus assatis sanies, dolores vero acuti per spinam ad pectus, & ad inguen tendunt. Et paulo inferius: quibus autem statim sputa varia, & dolores valde acuti, hi tertia die moriuntur.

II. Species.

*Art. 453.* Sed quandoque non tam dolor quam rubor inflammatorius ad externa prorumpit, nam ex eodemmet Hippocrate: *At si alieni in his Pleuritidibus contingant dorsum rubescere, & humeres calefcere, &*

III. Species.



*inter desidendum gravari, & venter exturbetur egestione cum vigore pallida, ac valde graveolenti, hic propter ventris egestionem vigesima prima die moritur.*

Locus  
affectus  
in sin-  
gulis.

*Art. 454.* Unde tres pleuritidum dorsalium species ex eodem Hippocrate cognoscuntur, quarum prior cum dolore veluti ex plaga cæterisque symptomatibus descripta potius est Mediastini inflammatio, ea præsertim parte, quæ dorsum respicit; altera cum doloribus acutis per spinam ad pectus, & ad inguina tendentibus ab inflammatione tunicarum oritur, quæ nervos intercostales e spina dorsii egredientes tegunt, unde qui ad ultimum ventrem ducunt ex aedem carina cum prominent, ad inguina quoque dolores tendunt; tertia demum neque pleurem, neque mediastinum, neque vaginam nervorum intercostalium inflamat, sed musculos dorsii tantum respirationi ac motui dicatos, unde ex affectus diurnitate, rubore, & forsan tumore musculos hos affici facile arguitur. Idcirco cum ægroti de dolore dorsii queruntur, non modo ejus intensiorem attente perpendo ejusque speciem; verum insuper spinam, humoresque observo si ullus tumor, aut robur extra appareat; eos digitis premendo latentem, aut incipientem tumorem detegere non desino. Cujus generis videtur fuisse Pleuritis ex dorso, qua laboravit, & mortuus est Hippostenes luctator V. Epid.

Indica-  
tio cu-  
rativa.

*Art. 455.* Observat autem Hippocrates pleuriticis ex dorso venter si exturbetur, his propter ventris egestionem vigesima prima die mori. Nos vero fatemur, licet hoc plerumque his Pleuriticis accidat; tamen vero non semper, & ad hoc tempus protraheretur morbus, nisi vehementior alter complicaretur. Quare nec deterremur, & superiedemus a sanguine mittendo cum fluxus aut diarrhæa adsit, quæ inflammationis effectus est, & non sedatur nisi sanguis mittatur, ut experti sumus, & Sydenham docet. Neque quæ nonnunquam supervenit diarrhæa repetendis jam dictis venæ sectionibus obicem ponit; quæ quidem ipsa hac methodo brevi sistetur, etiam non adhibitis medicamentis adstringentibus.

*Art. 456.* Cum vires consent ac morbi initio, & tulus scabi præcipue febris essentialis potius appareat cucurbitulas scarificatas, ut quorundam mos est, adhiberi de-

denego quia juxta Hipp. *venæ tenues non trahunt de quocunque humore, & crasso*; Ex his scarificationibus enim parum vel nihil utilitatis depromitur. Nec movet, quod quidam fatentur; quod hæ cucurbitulæ scarificatæ applicantur, cum vires debiles sunt; quoniam in quibusdam Pleuriticis, & ut plurimum a nimio dolore, & magna tensione pulsus parvi sunt, & obscurantur, viresque depressæ apparent. In quibus vero non adest virium resolutio, ac defectus, sed earum potius perturbatio ac confusio; imo; ipsæ validiores sunt: idcirco in iis audacter mittendus sanguis, ut Morton, & Hippocrate monuit: & sæpissime in praxi observatur, quod depressi pulsus, quo magis sanguis effunditur, attollantur.

*Pujati sententia.*

*Art. 457.* Constitutione quadem vigente Pleuritides verminosas cl. huic Autori videre contingit: fallax hoc morbi genus alia ex observatione, inquit, mihi innotuerat, antequam liberculum, quem de tali morbo Cl. Castelli apud Forojulieneses Medicus concinnavit, legissem. Cum ille itaque eo in opusculo satis talium Pleuritidum tractationem absolverit, actum agere mihi nunc non est animus; sed postquam animadverto Hippocrati quoque si non a vermibus, ex imo ventre Pleuritides innotuisse, contra quas sanguinis missionem prohibuit; aliquot historiolas breviter subdam: ex quibus quidam, apud quos scio somnium esse Pleuritides a vermibus, tametsi Cl. Practicus Jonstonus tradiderit, hoc quandoque mera symptomata Pleuritica excitare; tandem aliquando sapere discant.

*Art. 458.* Hæc igitur in Coacis Magnus Magister posteris reliquit: *Dolores circa latus, in febribus consistentes, citra notas, venæ sectio læserit, sive cibum adversetur æger, sive hypochondrium sublime habuerit.* Fungus profecto necesse est, ut sit, quicumque in hunc Hipp. locum incidens. non noscat lateris dolorem ab imo ventre. Cum absentia signorum ( *citra notas* ) quæ pectus idiopathice pati ostendunt; & præsentia eorum quæ stomachum, atque intestina affecta demonstrant ( *sive cibum adversetur æger, sive hypochondrium sublime habuerit* ) clarissime laterum dolo-

Pleuritidis verminosa descriptio.

Ab Hippocrate adumbrata.

res per consensum ab abdomine fieri demonstrent, ob id non tam ad species dolorum, magnitudinem, aut durationem distinguendas, quam ad locum affectum determinandum, ab eo prolatum puto, in Aphorismis: *dolores laterum, pectoris, & aliarum partium, an multum varient perdiscendum*. Quibus doctissime subdit Tozzi in dicti aphorismi commentario: *Hippocrates Medicos consulere videtur, ut partem affectam in doloribus internoscere curent: nisi enim partes affectæ suis indiciis distinguantur, curatio haudquaquam prospere institui poterit*. Quia ut in re tanti momenti Hippocraticam solummodo optime mentem expromam: *Sæpe ex crapula, & cibis flatuosis, dolores procedere solent, & ad lumbos, & ad latera*.

signum  
ejus pa-  
thogno-  
monic.

*Art. 459. Sed quæ sunt notæ doloris pleuritici Idiopathici ex Hippocrate? Ab hoc textu quisque discere poterit: Si vero sub septo transverso fuerit dolor (an septi positum optime norunt isti Helminthicarum Pleuritidum irrisores) ad claviculam autem de se significationem non præbet (putasse videtur imi ventris dolores ad jugulum non ascendere, quod tamen falsum esse ex observatione patet) alvum molire oportet, aut veratro nigro, aut peplo. Cum illud igitur abest signum, quod pectus idiopathice pati Coo significabat; non sanguinis missione, sed medicamento purgante dato Pleuritidi medebatur; quia materia dolorem efficiens ita auferri e corpore poterat, quod utique fieri non potuisset si morbi causa intra sanguinem stabulasset: quicumque vero ea, quæ inflammata sunt, statim in principio morborum medicamento solvere aggrediuntur; hi de intento quidem, ac inflammato nihil auferunt, non enim remittit affectio, quæ adhuc cruda est; quæ vero morbo resistunt, & sana sunt colliquefaciunt, de vict. in acut. tex. 36. Quodsi dolor sub septo causam in sanguine habeat, non alvi ductione, sed sanguinis missione eam tollebat Hipp. Præcordia inflammata, non ex flatuum interceptione (heu! quod summo judicio eam causam excludit, quæ primas vias obsidet) septi transversi intensiones . . . . solvi non possunt si quis medicamento purgare aggredatur, nam venæ sectio in talibus principatis est. Ibid.*



*Art. 460.* Ad utramque vero doloris causam & quæscutio in sanguine, & quæ extra sanguinem hæret, respiciens alibi scripsit, dolores sub septo & a purgatione, & venæ sectione solvi: & si circa spuriam constam graves dolores fiunt, his solutis fit venæ sectio, & purgatio deorsum de judicat. *tex. 11.* Venæ sectio si a sanguine, purgatio vero si a materia imi ventris pectoris partes doleant, natura monstrante viam Medico: quibus in febre dolore lateris oboriente multa aquosa, & biliosa egerit, hi allevantur. *Coac. sect. 11. vers. 75.* Forte alvi subductio, quæ sputum supprimit, coctionem tollit, idiopathicamque pleuritidem adeo exacerbabat, ut ab hac exerciti lethaliter decumbant, dolori lateris a causa, quæ intra sanguinem agit, auxilio esse poterit? Si quidam Hipp. legerent, haud ita de humano sanguine, quem prodige, amenterque profundunt, male mererentur; morbisque minime ex titulo, aut fallaci hypothese, sed ex observatione, atque ab ea, quæ ab observatis pendet, ratione mederentur. At ipsi viderint.

Cum sciamus stimulum alicubi hærentem partes longinquas in crispationem adigere, easque dolore mulcare, operæ pretium minime duco hypotheticum materię decubitum ad partem dolentem in medium adducere. Quod lumbrici in intestinis, stomachoque stabulantes efficiunt. cruditas quoque vitiosa ventriculum, ac intestina obsidens efficere poterit.

### Trilleri sententia.

*Art. 461.* Statim ergo post primarium illud Her- Phlebo-  
culeum, & divinum plane remedium, post primam, tomia  
inquam, largam venæ sectionem pleuriticis mixturam inditu-  
sic dictam pectoralem, resolventem, & anticausticam ta quid  
simul singulis horis cochleari mensura sumendam, pro- præstan-  
vinamus: nempe ex aquis destillatis Veronicæ, Tus- tissi.  
silaginis, Pulmonariæ, Hyssopi, Salviæ, Fœniculi, mum.  
aut aliis similis virtutis, cum lapid. cancror. sive con-  
chis, Mandibulis Lucii piscis, Antimon, diaphor. La-  
pide Prunellæ, & Extracto corticis Cascarillæ aquo-  
so, & Oxymellite simplici, vel Syrup. de Alth. Fer-  
nelii, Erysmo Lobelli, jujubarum, & similibus,  
quo

quo ipso æstum temperari, respirationem allevari, tussim mitigari, & pectoris expurgationem sensum promoveri crebro animadvertimus.

Oximel  
ad ple-  
uritides  
præstan-  
tissimum

*Art. 462.* Deinde siti nimium urgente; quæ miseris ægros ordinarie vehementer excruciat, tenuem ex hordeo ptisanam, cum oxymellite, vel simplici melle, & tantillo nitri paratam calide crebro ingerendam offerimus; probe gnari, quam eximii usus in hoc morbo sit ptisana hordeacea. Nihil vero melle, & aceto fortius simulque mitius sanguinis coagulationes resolvit. putredini resistit, humorum lentorem attenuat, & incidit, gangrænamque arcet divinis his binis remediis: adeo ut nemo pleuritin feliciter curaturus post venæ sectionem oxymelite carere possit.

Clyste-  
res ju-  
vant.

*Art. 463.* Singulis porro, aut alternis nimirum diebus, quantum nempe ægroti vires permittunt, & acrior vis morbi urget, sub vesperam, quando dolores laterales, fere semper magis ingravescere consueverunt, clyisma sat larga copia tepide injiciendum curo, sed non nisi ex aqua hordei, & oxymelite, sive melle puro, cum una, vel duabus drachmis nitri, aut lapid. prunell. aut arcani denique duplicati paratum, aut more Sydenhami, ex solo lacte cum saccharo præparatum; quo ipso vis flammæ intus furentis infringitur, acrimonia temperatur, & blandus plerumque somnus provocatur.

Topica  
& ex-  
terna.

*Art. 464.* Maximi quoque sunt usus topica, & exterius adhibita, quibus calefactis dolentis lateris regio perpetim est fovenda, fricanda, & inungenda. Simplicissimum hinc & optimum est, ol. amygdal. dulc. vel pro pauperibus solum ol. lini; ipsos quoque calidos cineres vino resperfos dolentibus lateribus, impositos egregium usum præstare innotuit. Possunt & alia nonnihil operosiora unguenta, & linimenta commode adhiberi, ut unguentum antipleuritic. Mynsichti, Barbette, & quæ ex suo penu in notis adjecit Dekers; item aliud Sydenhami, & Hofmanni. Mihi tamen; ut nihil celem, maximum semper usum præstitit linimentum a Boerhaavio fere commendatum, nempe ex semiuncia sacchari Saturni, uncia una acetii rutacei, vel simplicis, & binis unciis ol. infusi rosarum, vel lilior. albor. paratum. Hæc vero omnia cali-

calidissime, quantum fieri potest, sunt applicanda: tumque panis laneis calidis, & regulis calefactis, si ferre quidem potest æger, locus dolens est contegendus, ut calor eo diutius duret. Illud tamen hic in genere monendum, sicca fomenta majore cum successu, & efficacia adhiberi in pleuritide rheumatica, humida. pituitosa, qua senes plerumque infestantur; quam quidem in acuta, & a sanguinis inflammatione progenerata. In hac enim fomenta potius humida, pinguis, & oleosa convenire, doloresque acerbissimos blandissime ex his ipsis consopiri, fida experientia nobis compertum pluries fuit,

*Art. 465.* Ubi vero repetitis jam aliquoties venæ sectionibus restat adhuc insignis spirandi difficultas, vel magis exaugentur, tum duo vescicatoria, vel femoribus, vel tibiis ex Baglivij consilio, applicanda, derivationis causa. Tum enim sputorum fluxum statim promoveri, spirandi molestiam levare, & alvi quoque profluvium, si affuerit, feliciter sisti, bis. aut ter post Baglivium observavimus, licet non semper ex voto successerit, ut ingenue fatear, Eidem quoque scopo inserviunt cucurbitulæ siccæ ex mente Hippocrati, & qui eum jure meritoque sequuntur.

*Art. 466.* Quando vero pectoris purificatio, naturæ beneficio occipit, prodeuntibus jam sputis coactis, maturis, pinguis, & subflavis, tum ex arte nonnihil adjuvanda, ut linctu aut Eclegmate ex ol. amygdal dulcium recenter expresso, syrup. viol. jujubin. capill. vener. de crysimo Lobel. & similibus, qualia describunt Sydenham, Hoffmannus, & alii. Vel infusum Theiforme ex herb. veron. rasilag. pulmonar. hyssop. capil. vener. ruta muraria, cum melle frequenter calide hauriendum summopere prodest.

*Art. 467.* Quod denique ad diætam, & strictiorem vivendi legem attinet, abstinendi sunt ægri viginti adhuc morbo ab omni carne, & victu crassiore, & pinguiore, tenuia contra juscula carnis vitulinæ, aut gallinæ, item uvæ passæ minores, & majores, pruna sylvestria, damascena, cerasa, & similia subacida, & eupepta ipsis sunt concedenda: conducunt, quoque, vel maxime herbæ molles, diluentes, & sapone nativo præditæ: ut Lactuca, Endivia, Acetosa, Beta, Brasica.



*Brassica, Spinachia, Cichoreum, similesque radices: ut Sonchi, Scorzonæræ, Taraxaci, juri vitulino, aut agnino incoctæ, ut pulchre monet Boerhaavius; Conclave tepidum, immo subfrigidum potius sit, quam calidum; nec stragulis, & culcitris nimium obruendi sunt ægroti, æstus enim, & difficultas spirandi eo ipso augetur, & sudor præter rationem prolicitur. Inde fenestræ frequentius per diem nonnihil aperiendæ sudor in primis: & clementiore cælo, quo aer purior, salubrior, & frigidior paullo intromittatur, ne miseri ægroti putrida sua atmosphæra circumfusi, sordidas exhalationes continuo inspirando, & resorbendo suffocentur tandem, & in vivum quasi cadaver commutentur. Quod & in universum in omnibus morbis acutis, inflammatoriis & exanthematicis, ut morbillis, variolis, petechiis &c. sedulo observandum esse post Hipp. Aretæum, Celsum, & alios veteres, præclare docent Sydenham, Baglivius, Boerhaavius, Hoffmannus, & alii magni viri.*

Alvus  
finito  
morbo  
purgan-  
da.

*Art. 468. Procedentibus sic cunctis in dies in melius, & lætioris sanitatis certa spe resurgente post decimum quintum, aut vicesimum diem, leni Cathartico ex Cassia, Manna, vel Rheobarb. cum cremor. tartar. aut tartaro solubil. similibusque alvus ægrotorum est ducenda, ut sic, si quid vitiosi adhuc humoris crassioris restet, e primis viis, & glandulis intestinorum commode egeri possit. Respiciendum tamen est semper ad ægrotorum vires, & durum necessitatis imperium,*

Obser-  
vatio de  
phlebo-  
tomia.

*Art. 469. Aliqua vero adhuc adjicienda restant de quæstione quoties nempe incidenda sit vena? Toties nimis respondemus eam aperiri debere, quoties dura vis morbi eam imperabit, & ægroti vires permittent, quod ex respiratione præsertim, & pulsu conjicere licet. Ter tamen aut ad summum quater, venam secuisse nobis sufficit, ut ex multiplici experientia consistit; si nempe prima, & secunda vice sanguis sat larga copia fuit eductus.*

*Meadii sententia.*

*Art. 470.* In pleuritide detracto primum quantum opus est sanguine; ed tussim levandam; olei ex seminibus lini recens expressi potiones; ad refrigerandum nitrum, & sanguinem in canaliculis suis hærentem solvendum, sanguis hirci sylvestris, saliaque volatilia; denique ad foras extrahendum peccantem humorem, emplastrum vescicatorium lateri affecto impositum insigniter profunt. Et externi quidem hujus remedii commodum, quod a sagacissimo Majernio primum edoctus fui, multis jam annis compertum habeo. Sub finem autem morbi, remittente jam inflammatione, avum laxare oportet.

Inter  
topica  
vesicæ.  
totam  
con-  
nectit  
tur.

*Art. 471.* Illud autem non est prætereundum, fieri nimirum interdum, ut in hoc morbo, & magis etiam in peripneumonia, inflammata primum, inde & pleuræ adhærente extima pulmonis membrana, eveniat abscessus purulentus, quem empyema vocant. Hoc in casu si foras se ostenderit humor, imponendum est medicamentum causticum, quo emittatur. Ulcus autem per totam vitam apertum fervare oportet. Vidi enim cum, eo sanato, & materiæ purulentæ effluxu prohibito, brevi moreretur æger.

Et cau-  
sticum  
influm

*Barbeyraci sententia.*

*Art. 471.* Definitio Pleuritidis est; quod inflammatio fit pleuræ, vel membranæ costas succingentis cum lateris dolore acuto, & pungente, difficili respiratione, & febre acuta continua.

Pleuritidis  
defini-  
tio.

*Art. 473.* Pleuritis ferme nunquam corripit, quin simul peripneumonia conjungatur, seu ut melius dicam, ejus comes est, atque effectus. Aliquando etiam observatur binas has ægitudines simul produci. Occurrunt profecto ægrotantes, qui eodem tempore forti, & acuto lateris dolore atque extrema viscerum exardescencia conqueruntur; interdum etiam evenit Pleuritidem & Peripneumoniam alternatim commutari; quia nonnulli occurrunt, qui ab initio usque nihil nisi acutissimum pungitivum dolorem ad latus experiuntur,

Ejus af-  
finitas  
compe-  
ripneu-  
monia.

tur, tum hoc ipso dolore evanescente, vel biduo post ingenti oppressione vexati, & interno ardore quasi exusti remanent. Alii itidem dantur qui eodem momento ardore pulmonum, & incredibili oppressione teneri, conqueruntur; sed paulo post gravioribus symptomatibus evanescentibus dolore laterum summopere acuto fortiter gravantur, cujus causam transpositionem esse de loco in locum morbosæ materiæ facile perspicimus.

Pleuritis causæ.

*Art. 474.* Remotiores causæ, & evidentiores Pleuritis ex omnes esse possunt, quæ sanguinis massam inflammant; ut calor excedens, contritio, & contractio repentina pororum ob extremum frigus, liquorum atudentium abusus, omniaque exercitia immodica, atque alia ejusdem generis.

Pleuritis spuria.

*Art. 475.* Altera Pleuritidis species datur, quæ *nottha*, vel *spuria* dicitur musculis intercostalibus externis, vel inter costarum intervalla positis insistent, quæ vel a flatuositate, vel ab acri humore ibidem congesto producitur. Huiusmodi vero Pleuritis a vera tribus modis distinguitur. 1. Quod in ipsis intercostalibus externis musculis sedem suam habet, quando alia sedem habet in musculis internis. 2. Quod in spuria ægri impatientes super latus affectum decumbunt; nam in hac situatione externi intercostales muscoli inflammati inopportune comprimuntur, contra in vera ægri in latus affectum volupe decumbunt; in alterum difficillime; quia pars inflammata pulmonum pondere ducta distrahitur. 3. Quod veram Pleuritidem graviora laborosioraque symptomata comitantur, quæ in spuria nec tanta sunt, nec adeo intolerabilia.

Observatio necessaria.

*Art. 476.* Ceterum, ne in errorem inducamur, diligenter observandum est, lateris dolorem satis vivum aliquando excitari, pleurítico similem, qui perperam pro hujus morbi advenientis symptomate arriperetur. Etenim facillime accidit in scorbuticis quibuscumque, aliisque qui nervosis affectionibus subjiuntur, acerrimum humorem cum acerbissimo dolore in pleuram advenire, vel intra intercostale musculos conegari, adeo ut ibidem hærendo intolerabiles dolores excitet. Huiusmodi grassatio tamen optime a Pleuritide distinguitur, quia nulla febre coniungitur, pulsu satis laudabili.



dabili, & regulato persistente, viribus nullo modo labefactatis atque dolore fixo quidam non existente, sed pro ratione qua humor hinc inde vagatur, modo hanc, modo illam partem subsultim divexante.

*Art. 477.* Quoad veræ Plenritidis prognosin *Hippocrates* plurimas habet observationes salubrem, vel malum exitum hujus morbi indicantes; sed diffusum æque ac laboriosum esset, easdem omnes hic commemorare. Quod utilius dici potest, illud est, ut si frequentes, & copiosæ phlebotomiæ cito hunc morbum non solvant, & criticis evacuationibus per sudorem, per hæmorrhagias, per vomitus biliosos, vel per diarrhæas a principio usque evenientibus æger non sanescat, sæpissime in *Empyema* vel in *Phthisin* morbum desinere, unde pessima prognosis oritur.

*Empyema* enim generatur, quia sanguine in Pleura stagnante, nec sese dissolvendi vias reperiente, corruptione is inducta putrescit, quare pus viam per hanc membranam sibi aperiente in pectoris cavitatem dimanat. *Phthisis* autem fit, quando pus ipsorum pulmonum substantiam erodit, & acredine qua imbuatur, ulcus ibidem producit. Idcirco quando *Pleuritici* excreatus sanguineos, vel purulentos edunt, tuto affirmari potest, ulcus in eorum pulmonibus exortum esse. Ut vero id frequentissime evenit iis, qui *Pleuritide* exercentur, hinc non inique superius affirmavimus, morbum hunc ferme semper cum *Peripneumonia* sociari.

*Art. 478.* Methodus qua curari debe *Pleuritis*, binas sibi vindicat indicationes. Prior a conjuncta causa desumitur, quæ in sanguine per pleuram stagnante, ubi inflammationem facit, consistit; altera ab antecedente *Pleuritidis* causa mutuatur, quæ nihil aliud est, quam immodica sanguinis effervescentia, in pleuræ læsionem conspirans.

*Art. 479* Sanguinis emissio utrique indicationi satisfacit, quia præterquam, quod partem quadam fermenti a tota sanguinis massa adimit, calorem etiam imminuendo imponit quin novæ accumulationes in pleura contingant, & evacuandis insuper vasibus opitulatur, adeo ut qui his partibus sanguis inerat, a subsequente in gyrum acto facile abripi possit, sicque nativum omnibus liquidis motum conservate ac restituere.

Alia re-  
media.

Art. 480. Post omissum sanguinem levis quædam ac blanda purgatio institui potest; & Julapia; emulsiones, & clysinata optimos effectus præstant, quorum duo priora sanguinis massam refrigerando ejus immi- nuunt agitationem, alterum intestina abstergendo, ea- dem ab impuritatibus, crassioribus fœcibus, & a san- guinis recrementis ibidem congestis liberat. Si enim diutius morarentur excrementa, metus esset, ne eo- rum pars a venis absorpta sanguinem subeundo nova mala excitaret. Clysteres igitur sequenti modo concin- nari possunt.

Clyster. 4. *Fol. malv. betæ, parietar. lactuce ana man. j. sem. quat. frig. maj. unci. j. sem. bord. integr. man. sem. flor. chamomæll. mellot. pug. j. aq. font. q. s. ebull. simul & colat. unc. xij. adde elect. catholic. unc. j. mel. violat. unc. ij. f. clyster post biduum rei- terandus.*

Ptisana. Quousque morbus, & febris persistunt, cavendum ne ægris alimenta solidiora exhibeantur, sed jusculis eos nutrito quovis trihorio propinandis. Pro potu porriges Ptisanam ex hordeo; & passulis siccis, addita glycyrrhiza aqua pura confectam.

Emulsiones quibus regulariter frui possunt mane, & vespere quotidie, si opus, sequenti ratione parari poterunt.

4. *Amygdal. dulcium mundat. num. xvj. semin. 4. frig. maior 5vj. semin. lactuc. papav. alb. ana 3. sem. contus. in mortar. marmor. sensim affundenda de ptisana supra descripta, atque tantundem aq. destill. pap. rhœad. Filtret. liquor. bifariam dividendus, cujus una pars dabitur ægro mane, altera vespere, postquam addideris, singulis syrup. capill. vener. vel tussilag. unc. j. diac. od. iij. vel laudan. gr. j. in parte vespertina.*

Si pro emulsione Julapium exhibere lubet, sequens optime facit. 4. *Aq. destill. pap. rhœad. lil. ana unc. iij. syrup. violat. unc. j. syrup. papav. alb. 3iij. misce pro unica dosi.*

Obser- variationes de nar- cotico- rum usu. Art. 481. Nulla quidem difficultas objici debet, quoad usum narcoticorum non minus in principio ac in progressu morbi, quamvis cum peripneumonia con- junctus adsit, siquidem non obstante quod Villis eadem

eadem damnet, & cum eo plures alii practici, observatur tamen optimos edere effectus: maxime in iis, qui vigiliis & deliramentis vexantur, æque ac in iis, qui vehementiores patiuntur dolores. VVillis, aliique usum contemnunt, quod sibi imaginantur, excreatus a narcoticis inhiberi, ac expectorationem difficiliorem reddi. Cum autem ab iisdem non sit animadversum nulla aptiora extare remedia ad cohibendum defluxionum impetum ipso Laudano, non cognoverunt ejus usu id moliri, quod crebris phlebotomiis aliisque remediis in hoc morbo adhiberi solitis aliquando frustra intentatur. Ceterum prætereunda non est consideratio sæpissime a pulmonum debilitate expectorationem materiæ purulentæ inhiberi; utque hinc narcotica, quæ huic debilitati optime opitulantur, spirituum animalium generationi favendo, somnum conciliando, vires elanguentes ad munera expectorationis obunda felicissime erigere. Sed cum nihil noxius sit ægrotantibus, quam noctes insomnes transigere, unde calefacto immodice sanguine spiritus dissipantur, aliaque graviora incommoda gliscunt, hinc nihil utilius agi potest, quam mature omnia hæc mala exhibito narcotico declinare, quo dulcis ægro quies conciliatur, & sanguini necessaria refocillatio, quod equidem illud est duabus supradictis indicationibus propositum, ut perficeretur.

*Art. 482.* Hæc omnia remedia eodem sane tempore usurpari possunt, videlicet: quo phlebotomatur æger injici possunt clysteres, atque exhiberi emulsiones, vel Julapia, mane, & vespere, postea devenire licet ad lenes purgatiunculas, modo prius sexta, vel septima vice spatium trium, vel quatuor dierum vena pertusa fuerit, ut sic defluxionis progressu inhibito purgatiunculæ sequenti ratione utiliter institui possint.

Continuatio  
remediorum.

*℞. Senn. orient. ℥iij. ros. pallid. parvum sal. prunell. vel crystal. mineral. ℥j. fol. cichor. lactuc. ana man. sem. aq. font. q. s. ebull. parum, dein colat. add. mann. syrup. ros. compos. ana unc. j. f. potio mane propinanda.*

Potio  
purgans

*℞. Vel ℞. Senn. ℥ij. sal. prunell. ℥j. infund. in jure carniū p. s. & colat. add. mann. unc. j. f. potio.*

Alteratio



Si cum Pleuritide vel Peripneumonia sit conjuncta, atque simul pectus ægri plurimum gravatum adsit, nullus dubitandi locus remanet, quin vini emetici ℥vj. vel uncia j. cum fennæ infusione ei adhibeatur. Hujusmodi autem medicatio in usum duci nequit, nisi a prudenti, & perito satis Medico consulatur.

Habito respectu temporis morbi singula huc usque recensita remedia in usum vocari possunt, & reiterari, in primis leves alvi purgationes, quas subinde usque ad perfectam sanationem, adhibere præstabit.

Topica

Nec perperam interea factum erit, si lateri affecto anodynum cataplasma admoveatur, quo dolore lenito aliquod ægro levameu concilietur; in primis si spuria Pleuritis adsit, musculique intercostales externi, æque ac interni afficiantur. Hoc vero casu, ut ferè semper evenit, si tumor aliquis externe prorumpat in eo ipso situ, ubi dolor urget, post reiteratas venæ sectiones cucurbita scarificata potest, atquo mox inde cauterium excitari, ut exitus morbosæ materiæ tali arte expediatur. Post hæc vulnus eo modo tractabitur, quo alia hujusmodi tractari solent.

Peripneumonia  
definitio, &  
diagnosis.

Art. 483. *Peripneumonia* inflammatio pulmonum est, cum febre acuta, tussi, & respiratione difficili. Præter hujusmodi pathognomonica signa hic morbus sæpe etiam conjungitur: cum dolore pectoris punctorio, pulmonum inflatione seu tumefactione, & sputo sanguineo, nunc puro, nunc vero aliis materiis mixto. His symptomatis, adde sitim inexplebilem, vigilias peritinales, acerbissimum capitis dolorem, interdum delirium, cum magna totius corporis inquietudine.

Art. 484. Evidentes peripneumoniæ causæ eæ ipsæ sunt, ac quæ pleuritidem faciunt, videlicet: omnes eæ generatim, quæ sanguinem inflammare, validasque in eo excitare fermentationes possunt.

Causæ,

Omnes tamen Peripneumoniæ has causas quidem non habent; nam quando senes corripiunt, qui in hunc morbum valde sunt proni, & sanguinis densitate, & crassitie proficiscuntur; quia cum talis sit eorum sanguis, ideo spiritibus destitutus, in pulmonibus facile stagnat, ubi corruptus, & mora ducta putrescens eam inflammationem facit, quam nunc *Peripneumoniam* dicimus.

Peripneumonici interdum ex prava sanguinis constitutione hæc editario jure hoc morbo vexantur. Pulmonum dispositio quoque plurimum hic promeretur, cum non raro indurationes quædam seu scrophulosæ glandulæ principio non admodum magnæ, atque adeo non multum sanguinis motum impediētes, progressu vero majores factæ, vasa contigua comprimant, ex qua compressione transitu sanguinis cohibito, necesse est, ejus vim ad progrediendum insumptam in vasorum parietes recidere, quibus ruptis sanguis hac emanans stagnando inflammationem facit.

*Art. 485.* Quantum ad prognosin spectat, nemo unus non ignorat, morbum hunc valde periculosum esse, majoremque partem eorum, qui eo laborant, occumbere, vel saltem difficulter admodum convalescere. Si Anginæ vel Pleuritidi Peripneumonia superveniat, magis periculosa est, quam si sponte sua primum erumpat, vel utrumque morbum consequatur; attamen quomodocunque accedat, semper periculi plena videtur, maxime si cum febre valde acuta, pertinacibus vigiliis, siti inexplebili, & magna respirationis difficultate conjungitur; etenim hæc omnia immodicum sanguinis calorem, notabilemque pectoris oppressionem ostendunt.

Prognosis  
sis Peripneumonici

Peripneumonia cum *singultu* periculosissima omnium notante *Hippocrate*. Hujus ratio videtur, quia hoc casu inflammatio maxima est, pulmonesque adeo turgentes reperiuntur, ut diaphragmate compresso convulsionem cum singultu faciant.

Sed ægri vita adhuc in præstantius versatur discrimen, quando aliis symptomatis delirium, vel Phrenitis, vel convulsivi motus, vel etiam hemiplegia accedunt, cum hæc omnia morbi causam ad *cerebrum* ascendisse ostendat.

Neque minus timendum est, si una cum gravi respirandi difficultate Peripneumonicus confertis vomitionibus, animi deliquiis, pulsu exili, sudoribusque frigidis exercetur. Hæc enim signa omnia appertissime innuunt, pulmones minime a pressionibus liberari, & quod in eis extravasatum adstat, nec sputo excerni, nec in sanguinis massam retrahi, aut reduci. Hinc magis magisque impedita circulatione spiritus dissipantur,

180 *Pleuritis & Peripneumonia.* CAP. II.  
vires fatiscunt, & æger proinde ad fatum fluum postremo subeundum properat.

Quoad excreatus, qui tantillum densum, & albicantes videntur, atque nonnihil tinguntur sanguine, minus ceteris timendi; tenues contra & crudi sanguine multum imbuti, peiores sunt omnium; quippe qui copiosorem defluxionem ostendunt. Sed malum signum etiam est, si æger nihil excernat, quia extravasatis in pulmonibus, qui remorantur, humoribus necessario sequi debet, ægrum suffocari, vel prorupto tumore Empyema exoriri. Ceteræ excreatum formæ ut fulvi, viridescente, & nigri, omnes sunt mali, quia exuberantem sanguinis calorem demonstrant, in primis vero nigri. Excreatus valde densi ob eandem rationem, valde sunt timendi; nam ob caloris magnitudinem absumpta tenuiori parte, crassior relinquitur, quæ mora ducta adhuc magis densatur.

De urinis non loquor, quippe quæ satis tuta signa non exhibent, quin immo sæpenumero observantem decipiunt. Nihil enim de earum colore, & consistentia affirmari potest; pulcherrimæ videntur in febre maligna, utut insignis corruptio vigeat. Hoc unum profecto notandum est, quod si eadem plurimum a statu naturali recesserint, uti ubi admodum rubentes vel nigricantes apparent, licebit tunc easdem ut mali ominis reputare; color nimirum inconspuetus apertissimum signum exhibet præternaturali calore sanguinem exardere.

Sudor diffusus, urinæ profluvium, diarrhæa, narium hæmorrhagia, menstruorumque fluxus interdum in hoc morbo bene portendunt, præcipue vero si opportune aliquid horum superveniat, nam morbum resolvit, vel plurimum saluti recuperandæ opitulatur.

Conditio virium maximi etiam habetur momenti in Peripneumonia; siquidem tricolentioribus adhuc vigentibus symptomatis, modo vires consistent, & pulsus satis vegetum esse percipiatur; quædam semper salutis spes effulget; contra vero si debilis simul sit, pessimum est; etiamsi alia conquieverint symptomata, nec ut prius excruciare ægrotum videantur.

Si pulsui debili ac parvo ejus inæqualitas quoque accedit, malum omnino est; quia ingentem pectoris op-



oppressionem ostendit; qua libero sanguinis circuitu per viscera impedito; is irregulariter a dextero cordis situ in sinistrum migrat, atque inde in arterias pari ritmo adactus pulsus irregularitatem producit.

*Art. 486.* Cum eadem sit curationis methodus *Peripneumoniarum* ac *pleuriticis*, nec partium affectarum differentia inhibeat; quin uterque morbus iisdem indicationibus regatur, eadem remedia locum habent utrinque; quare *Phlebotomiam*; purgatione, clysteres, ceteraque remedia alterantia in cura *Pleuritidis* adhibita *Peripneumoniam* quoque sanare posse decernimus. Prudenter tamen hic eadem usurpanda sunt, maxime vero attente incumbendum, ne æger purgetur; quin prius quater, vel quinquies *phlebotomiam* subierit. Ratio est quodsi purgarentur post semel; vel bis sectam venam tantum, ex fermentatione a purgante in sanguine excitata; & ex nimia vasorum turgescencia nondum satis imminuta, nova extravasatio in pulmonibus evenire poterit; vel fatalis congestio in cerebro.

*Art. 487.* Eclegmata excreatum adjuvantia, negligenda hic quidem non sunt, quæ ut diu ore agitantur; & sensim per œsophagum descendunt; ita asperæ arteriæ fibris quodammodo irritatis tussis; & excreatus muneri favent. Pluribus modis *Loboch* seu eclegmata componi possunt, vel pulveribus; vel opiatis, vel syrupis; cum autem syrupi aptiores videantur sequentem formulam adjicimus.

*M. Syrup. tussilag. oxymel. simpl. ana unc. j. sem. balj. sulphur. ʒi. sem. f. Loboch cochleatim agro exhibendum, ut in ore detineat; idemque sensim inde deglutiat.*

*Art. 488.* Quoad narcoticorum usum; jam supra satis meminimus: sed hic observandum est, quod in nimia pectoris oppressione *Laudanum* satis tutum non videtur, pro quo mitius narcoticum substitui debet: ut syrupus papav. alb. metu, ne *Laudanum* spiritus in cerebro figendo eorumque defluxum per nervos ad organa respirationis inhibendo aut impediendo oppressionem magis augeat.

*Art. 489.* Casus peculiaris adest quo cucurbitulæ scarificatæ non leve adjuvamen *Peripneumonicis* affectarum: videlicet, ubi percipitur inflammationem ad dorsi usum.

musculos usque pertingere. Cognoscitur remita se habere, quando æger tussiendo circa easdem partes, quibus pulmones suis membranis adhærent, vehementi dolore cruciatur; tunc autem habito respectu loci affecti cucurbitula ibidem applicata majorem partem extravasati sanguinis educit.

*Art. 490.* Omnibus remediis incassum adhibitis fidenter emeticum juberi potest, a quo quotidie miri effectus observantur maxime in morbis difficilimis, & propemodum conclamatis. Laudatur vero hoc remedium, modo viris satis sint vegetæ, ut ejus actioni resistere possint, & postquam sufficiens sanguinis quantitas a veniseducta fuit. Nam si vasa adhuc turgescant, timendum, ne ex inconsueta, & præternaturali fermentatione, quam hujusmodi remedia producere solent in sanguine, vas aliquod insigne rumpatur, unde nova inflammatio esurgeret, a qua periculum augeretur, ægerque in deterius malum protruderetur.

### Farrago sententiarum.

*Art. 491.* Densa & exercitationi assueta corpora (inquit *Hippocrates in coac.*) citius ex *Pleuritide & Peripneumonia* intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt. *Pleuritides siccæ* (inquit idem) & in quibus nihil spuitur, gravissimæ; metuendæ quoque in quibus dolores ad superiora tendunt. A *Pleuritide Peripneumonia*, malum; a *Peripneumonia Phrenitis* malum. *Hippocr. aphor.* sanguinis missio est remedium magni & recentis doloris; at si ve levior, si ve vetustior morbus, vel supervacuum vel serum id auxilium sit, confugiendumque est ad *cucurbitulas* cum scarificatione. *Celsus.*

*Art. 492.* A *Pleuritide*, ultra acutam febrem, fiunt *polyposæ concretiones* in pulmonibus, ut ex cadaveribus, & extracto sanguine patet. *Malpighius.*

*Art. 493.* Adverti debet *Pleuram* Pleuriticorum & *Pulmonem* Peripneumonicorum post mortem sectorum semper exhibuisse spectandam magnam copiam *polyporum*: Polypus autem est sanguis diutius stagnans dilapsa parte rubra. Raro pleura sola absque pulmone inflammatur.

*Art.*

*Art. 494.* Dolorem externe optime leniunt linimenta ex ol. amygd. dulc. sp. sal. armoniac. & camphora. Pitcarn. in MSS. Item linimentum seq. anodyn. ℥. balsam. Locatel. ℥ij. ol. amygd. dulc. ℥j. ol. mac. per express. ung. e flor. aurant. ana ℥ij. m. f. liniment.

*Art. 495.* Quibus plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est, ex Hippocrate, & authoris experientia. Vix datur præstantius remedium in fine morbi, quam syrupus vel decoctum nicotianæ. Barbette.

*Art. 496.* Lucius monitu Æsculapii a Pleuritide curatus fuit applicatione epithematis ex cineribus ab ara desumptis & vino committis. Le Clerc.

*Art. 497.* Vires & usus remediorum sequentium artis Apollinæ gnaris satis innotescunt. Aq. omnium florum, balsam. sulph. anisatum, ens veneris & decoctum coccineum, decoctum pleuriticum, emplast. pleuriticum, fotsus lateralis, haustus pleuriticus, lohoch pleuritic. lohoch viride, oximel. asthmaticum, pulvis pleuriticus, sacculus lateralis, unguentum pleurit.

*Art. 498.* Quæ de Pleuritide traduntur in Medico sunt: hunc morbum periculosissimum satis cognoscendum sese exhibere, quin observantium diligentiam, attentionemque eludat. Ut plurimum dolorem ad latus sinistrum profert interdum etiam ad latus dexterum; febris urget, & tussis, & respirandi difficultas cum dolore. In Praxi communiter phlebotomia ter, quater, & quinquies repetitur pro ratione indigentiae, & indicationis, quod sane principiis Medicis congruit, & generali consensu roboratur. Si vero æger Phlebotomiam adversetur, curatio sequenti methodo instituitur.

℥. Rad. scorzonæ. man. j. lib. iij. ebull. per dimidium quadrantis, dein adde flor. pap. rissæ ad pag. ij. vel iij. iterumque ebull. parum, & in fine ebullition. add. frustulum glycyrrhiz. minutim concis. removeatur decoctio ab igne, & probe tecta reponatur ad subsidendum.

Hæc sit in potum ordinarium ægri, cui postea dantur quinque ovi putamina in cyatho dimidio aq.



plantag. atque inde obtegetur, ut diu fudet. Interea parti dolenti applicabitur cataplasma quod sequitur.

℥. Ovi album; cui adde zinziberis quantum satis est ad dimidium putamen ejusdem ovi implendum, atque tantundem piperis nigris pulverati misc. & cum stappa cannabina parti dolenti applicetur, inde imposta mappa sepe replicata per hor. 24. priusquam amoveatur, retinebitur.

Si propositum sit hoc Cataplasmate uti, ulla venæ pertusio præmittitur; quia eadem etiam omissa morbus facile cedit, modo accurate applicetur cataplasma, quod salutare semper effectum obtinet. Id vero experientia confirmatum habuimus. Sequens Cataplasma quoque laudatur.

Aliud Cata-  
plasma. ℥. Fol. nicotianæ vel fanciulli tabac. unc. ij. crassius incidatur ac pro usu effumationis, tum bulliant in vini optimi rubr. lib. j. usque ad liquoris consumptionem. Dein parti affectæ applicetur calide nicotiana tali encheiresi cocta instar Cataplasmatidis; & quavis xij. hora renovetur.

Aliud. Aliud Cataplasma. ℥. Decoct. verbenæ, farine hordei f. pasta mollis calide parti dolenti admovenda.

Applicato quodam ex descriptis emplastris tempus erit; ut conveniens aliud remedium intus sumendum ægro porrigatur. Quod miros effectus præstat sequens est.

Potio. ℥. Sacchar. pulv. ℥ij. instillantur ei ol. destill. Salviæ gut. xxx. misce & cum aq. card. bened. coclear. iij. f. Potio.

En altera Potio ab eodem Auctore valde laudata.

Alia Potio. ℥. Illius herbæ, quæ ubi muscus abundat occurrit Gallicè vocata Perce-Mouffe man. j. Hac mundata a recrementis, nullatenus autem aqua diluta contundatur in mortario; & cum succo in cyathum aq. salviæ vel scabiosæ infundatur per horas iij. infusio exhibeatur ægro jam post quatuor horas jejuno; cui antea semel saltem vena tusa sit.

Hujus remedii effectus est, sudorum vel urinam educere, utcumque vero agat, ut plurimum sanat. Pulveres ex mandibulis Lucii piscis, dentibus Apri, Ossibus Cordis Cervi, Pulvis pyrius cum aq. flor. sambuc. ablutus, pulv. sang. hirci, ex Pene Cervi, vel Tauri,

Tauri, tum is ex lapid. cancrorum usque ad gr. xxx. unusquisque horum porrigitur cum vino albo, vel cum cyatho aq. card. bened. Quod sequitur remedium præstantissimum quoque est; modo post tertium diem exhibeatur, vocaturque pomum Quercetan.

℞. Pomum, quo intus excavato olibani ℥j. ingeritur, dein probe clauso foramine ad ignem lente coquitur : Pomum  
Quæ-  
retani.

Pomum hoc ægro devorandum exhibetur saccharo cando edulcoratum; insuperque aq. card. bened. unc. ij. propinatis ad sudandum disponitur. Animadvertendum est cum in hac occasione; tum etiam in cæteris omnibus ejusmodi, quibus sudor provocandus est, ut æger levibus sed calentibus stragulis coopertus decumbat, quia si graviora sunt, effectus optatus non obtinetur.

Duo quæ nunc addimus Cataplasmata, eodem Auctore teste, admirandæ quidem pro hoc morbo virtutis habenda :

℞. Panem recentem a clybano extractum, quo bisariam secto ejus dimidium theriaca oblitum parti dolenti admoveatur. Cata-  
plasma.

℞. Cæp. alb. num. xx. quibus coctis in sufficiente lactis quantitate usque ad dissolutionem add: piper. pulv. ℥j. Croci ℥. sem. hujus cataplasmatidis dimidium parti dolenti imponatur, & perseverante dolore post quadrihorium alterum dimidium admoveatur : Aliud

## EMPYEMA.

### Tralliani sententia.

Art. 409. Omnia in universum indicia suppurationis talia existunt: Febris vehementior quam antea: rigor præter rationem, & gravitatis potius quam doloris multi sensus. Ubi hæc tibi apparuerint naturam materia subiectam id pus mutare scito, & si quidem facultas efficiens robusta fuerit, etiam pus non adeo viscosum reperietur; & vomica tunc intra thoracem circa decimum quartum diem erumpet. Sin autem crassius quoque pus ultra dies prædictos inventum fuerit, & ægri vires infirmiores, etiam circa quadragesimum signa  
supura-  
tionis.  
aut

aut sexagesimum, & longius vomicæ erupti expectanda est. Summatim pro copia, & qualitate materiæ, ægrique viribus vomicæ eruptionem futuram expectato.

Et si quidem intra thoraeem pus illapsum, diutius intus manserit, & non fuerit usque ad quadraginta dies expurpatum, ut divinissimus ait Hippocrates, in Phthisin pervenit, pulmone ipso antea puris acrimonia exulcerato, & computrescente. Internosci autem debet locus affectus, si æger interrogatus dicat, dexteram thoracis partem esse calidiorem, magisque gravitatem sentire, tanquam aliquid ex ea pendeat. quando in alterum latus inclinaverit.

*Art. 500.* Qui biliosum pus expuunt, his cremor idoneus est ptisanæ, si superforbeatur, cremorque avenæ. Si vyres imbecillæ sint cremor halicæ, aut txphæ, aut zeæ: sin autem nihil ejusmodi fuerit, nec alvus citata etiam succus amygdalarum, vel per se, vel cum prædictorum cremorum aliquo mixtus. Alvo autem citata nihil prorsus adhibeatur ex iis, quæ amplius ipsam irritare possunt, neque potus, neque cibus ejusmodi. Juscula autem ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis; nisi admodum febricitent, exhibere magis expedit. At cum sputum fieri crassius, & biliosum abjecisse, nec non rejectioni contumax fieri incœpisse, deprehendes, tunc rursus ad aquosam mulsam: aut apomeli transire conducit, exhibendo ipsum paulatim, & non universum. Malsa vero quovis tempore exhibita nihil ægrum offendit.

*Quando* *Art. 501.* Viribus imbecilli existentibus adde ptisanæ cremori columbam, aut pullum. Exhibeto etiam lac dan- ægris gallorum testiculos. Assos cibos exhibere convenit. Sic etiam cerebella porcellorum assa præbere satius est, sale modico ipsis asperso; præterea anserum alæ, suum ungulæ, halyca cocta cum amygdalis, pistaceis, uvis passis, & quæ alia probe nutrire ægros possunt. Auctis autem viribus contra ad solidiorem cibum transeundum est. Quodsi diuturnior effectus fuerit, & corpus totum alimentum non seniens contabescere manifesto incœperit, neque thorax multum puris contineat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer febricitent, si enim multo infestante calore ex-



exhibeatur, non item nutrire, aut humectare poteris. Si quod rejicitur expurgatione adhuc indigere tibi videatur, & non modo fordidum, & fœdi odoris existat, asininum omnibus aliis antecedit, quippe etiam, eo quod probe purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinandum est, quod asinino ad omnia sit persimile.

*Art. 502.* Hyssopum igitur cum melle bene facit purgationem; similiter etiam thymum, aut iris contusa, aut cerui fricti ex butyro, aut pulegium, omniaque hæc seorsim contusa, aut cum melle mixta si exhibeantur bene faciunt, nam generose repurgant. Ad omnia item thoracis vitia, & ad eos qui tali detinentur, quibusque arteria affecta est, admodum salutare, & suave medicamentum est, quod sequitur. Cinamomi, mirrhæ, ana ℥iv. thuris ℥j. dulcis radiculae unc. sem. tragacanthæ unc. vj. nardi indicæ ℥j. ammomi ℥iv. croci ℥j. melle excipito.

### *Æginetæ sententia.*

*Art. 503.* Signa itaque consistentis empyematis sunt: signa gravitas thoracis, tussis vehemens, & arida, cum doloribus; interdum etiam humiditas quædam accedit, Empie-  
matidis. qua levare nonnihil videntur, febriculæque inter initia satis ignaræ, errantes, & difficilis decretionis affligunt. Quum vero in vomitam abscessus appetit, acrius cum horrore aliquo febriunt, inque sermonis proprietate spiritui turbati præcipitantur. Rupto abscessu pus rejicitur, modo porum modo fœculentum. Quandoque superius erumpit abscessus unde gravius incumbit periculum: interdum vero deorsum, atque id quidem quod descendit, partim in ventrem & intestinum transfunditur, partim vero in vesicam, facta per vasa quædam transumptione, delabitur.

*Art. 504.* Febriunt autem febre hæctica usque ad totius materiæ repurgationem, quæ nisi accuratissime procuretur brevi, æger saniosus in tabem rapitur, pulmone exulcerationem sustinente. In qua jam tabe conclamata genæ pallescunt, frons, atque cervix sudoribus rorescunt, carnes contabescunt, ungues incurvantur, & crassiores, candidioresque, aut lividi apparent.

Malo autem magis invalescente ; venter conturbatur , hypochondrium sursum convellitur , dira sitis , & ciborum aversio cruciant : quodque excreatur gravissimi odoris fluxum emittit .

*Curatio.* *Art. 505.* Ante omnia ; puris collecti maturatio promovenda est , spongiarum fotu , cataplasmatibus ex farinis hordeaceis cum caricis discoctis ; & resina exigua ; & stercore columbarum ; utroque ; & hibisco : Adjuvar autem rupturam in latus sanum decubitus . Sorbeatur interea ex temporis intervallo nulla , & cremor ptisanæ admixto melle ; sed quibus plus roboris inest ; ii jus hyssopi , & thymi melle adjecto bibant .

*Art. 506.* Ubi pus expectorari cœperit hyssopi denovo , & iridis , atque glycyrrhizæ decoctorum in multa potionem repete ; vel glycyrrhizam cum sesamo tritam exhibe : aut polline in mulsay & oleo percoctum cataplasmatibus modo inducito .

*Art. 507.* Quum autem ulcus expurgationi per superna renititur ad medicamentum ex marihubio , eruis ad Dodecatheon ; & ad confectioem Philoxeni deveniendum est .

*Art. 508.* Porro qui in tabem decidunt his portâ capitata in chondri , ac ptisanæ sorbitionibus liquefacta dato . Jam vero hæc per se bis decocta exhibenda sunt . Potus aquæ pluvialis esto ; & ex eo melicratum .

*Exussio.* *Art. 509.* Ustiones suppuratis efficacissimas ferre suppetias compertum est . Oportet igitur radice longæ Aristolochiæ oleo imbuta ipsis imposita candenti ferro crustas excitare . Unam inter jugulorum compagem cutem sursum reducta , duas non alta juxta mentum seorsim ab arteriis soporariis , quas carotides vocant . Sub mammillis item inter tertiam , quartamque costam duas altiores grandioresque . Binas alias inter quintam , & quartam , paululum versus dorsum spectantes : aliam in medio pectore , rursus aliam supra ventriculi os : a tergo vero tres , per medium dorsum unam , utroque spinæ laterè geminas , quæ in dorso factam crustam excedant altius impressas .

*Incisio & perforatio Thoracis.* *Art. 510.* Alii vero , quemadmodum etiam Leonides asserit , ferro nuclei olivæ simili candenti inter costas , ea in parte , quâ abscessus est , usque ad pus adurunt . Quidam scalpellum quoque confidenter adhibent , inter

inter quintam, & sextam costam transversâ incisione, paululum tamen infra cutim incidunt, deinde acuminato scalpello membrana, quæ costas succingit, perforata, pus excernunt, Verum isti quoque, & qui ferramento ad imum usque adustionem moliuntur, vel illico mortem inferunt, una cum pure vitali etiam spiritu confertim exinanito, vel fistulas irremediabiles efficiunt.

*Celsi sententia.*

*Art. 511.* Dolor pulmonis si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas interdum excitat aut circa vigesimum diem, aut circa quadragesimum, nonnumquam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem, ejus partis sensit. Sed eæ vomicæ modo a pulmone, modo a contraria parte nascuntur.

*Art. 513.* Quod suppurat ab ea parte, quam affligit, dolorem, inflammationemque concitat, ipsum cavalius est; & si in partem suam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest: Si febris non dimittit, eaque interdum levior est, nocte incrementum, multus sudor oritur, cupiditas tussiendo est, & pœne nihil in tussi excreatur, oculi cavifunt, malæ rubent, venæ sub lingua inalbescent, in manibus fiunt adunci ungues, digiti, maximeque summi pallent, in pedibus tumores sunt, spiritus difficiliter traquitur, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore oriuntur.

*Art. 513.* Quod si protinus initio dolor, & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante vel circa vigesimum diem erumpet. Si serius ista cœperint, necesse est quidem incrementum, sed quo minus cito affecerint, eo tardius solventur. Solent etiam in gravi morbo pedes cum digitis unguibusque nigrescere. Quod si non est tumor consecuta & reliquum corpus invaluit, pedes tamen decidunt.

*Art. 514.* Si suppuratio, inquit *Hippocrates* in Præ-

*Empyematis indicia venturæ.*

*Indicia præsentis.*

*Indicia confirmati.*



mati dia-  
gnosis . fagiis , in alterutro latere tantummodo fuerit , vertere ,  
atque edificare convenit in his , utrum in altero habeat  
latere dolorem , & alterum quam alterum calidius sit ;  
atque eo in alterum cubante latus , requirere oportet ,  
num aliquod desuper onus illi pendere videatur : si enim  
id fuerit ; suppuratio in altero latere fatigat .

Prognosis . *Art. 515.* Si corpus adeo grave est ut ungues quo-  
que , & digiti lividi sint , expectanda mors continuo  
est . Si digiti ac pedes omnino nigrescunt , minus pesti-  
feri sunt , quam si liveant . Sed alia signa consideranda  
sunt : si enim facile ferre malum appareat . & aliquod  
aliud fuerit salubre signorum , morbum verti significat  
ad abscessum ; ita ut æger sit convaliturus : corporis  
vero nigredo casura . *Hippocr.*

*Art. 516.* Quod si ne rupta quidem vomica , vel pu-  
re extrinsecus emissio febris quievit , aut quamvis quie-  
verit , tamen repetit : item si sitis est , si cibi fastidium ,  
si venter liquidus , si pus est lividum & pallidum ; si  
nihil æger excreat nisi pituitam spumantem , periculum  
certum est . Atque ex his quidem suppurationibus , quas  
pulmonum morbi concitarunt , fere senes moriuntur ;  
ex ceteris juniores . *Celsus .*

### *Ballonii sententia .*

In em-  
piricis  
cur ca-  
lor au-  
geatur  
noctu . *Art. 517.* Accidit omnibus hectica febre labo ranti-  
bus , ut noctu intensiorem calorem habeant , non quod  
nox augeat febrem ratione suæ diatheseos morbosæ ,  
sed ratione dati oblatique cibi ( inquit *Galenus* ) inca-  
lescunt enim a sumpto cibo , & maxime dum distri-  
buitur . Quare de nocte potius , nam & cibus interdum  
datur ? *A Vega* mihi videtur pueriliter hoc explica-  
re . Quia ( ait ) tempore *Hipocratis* non prandebant  
sed cœnebant ; *Galenus* æque male . Nec enim omnino  
explicat illud *Hippocratis* : *Noctu vehemantior* . Melius  
diceret . quoniam agitur de purulentis , in omnibus  
suppurationibus dolores ad noctem ; id quod non tan-  
tum audiendum dum pus sit , sed dum pus continetur  
aliqua parte fovens febrem lentam . Vel dicemus cum  
hecticis partes solidæ ignitæ sint , non mirum si noctu  
calor increseat , tum quia nox humectat , tum quia re-  
vocatur calor , & spiritus intro . Sic calor crescit non  
ratio-

ratione ipsius affectionis, sed ex eventu. Vel dicemus nocte revocatur calor naturalis ad centrum; qui calor quia igneus est, dum revocatur intro non nanciscitur aptum domicilium; & quo loco humectare debet siccatur, & squalorem auget. Et tunc non fiunt calores febri- es, sed quædam exacerbationes. Præclara quidem est quæstio hæc.

Quærat autem quis: an pus suos motus habeat nocturnos potius quam diurnos? Nam & in inflammationibus internis paroxysmus est nocturnus. Et id non est proprium nec hecticis, nec empyicis ut nocturnas molestias potius experiantur, quam qui aliis morbis implicantur.

Art. 518. Unde mirati sumus cur antiquitas, pe- Ratio  
culiari quodam privilegio, & prerogativa exacerbatio-quænam.  
nem nocturnam puri, & purulentis assignaverint. Nec  
nim id novum est. Nam & venerea lue affectis, præ-  
sertim ubi solidas partes invasit, & conspurcavit, no-  
cte dolent magis, & arthritici & odontalgici, & ce-  
phalalgici & catharrodes, denique multo maxima pars  
egrotantium. Præter rationes a nobis alibi adductas,  
sunt & hæc probabiles. Primo quia omnes ferme morbi  
sub tempus noctis ingravescent. Multis id quidem de  
causis: Partim quia ob adveniens tempus nocturnum  
hic admirabilis quidam motus, & revocatio intro, mo-  
tus quidem plane contrarius motui ipsarum vigiliarum.  
Deinde, coctio fit noctu. Coctio quidem non solum  
umororum naturalium, sed & contrariorum, & feбри-  
um. At dum pus sit, febris augetur, & dolor. Quæ  
ratio & analogia de pure in abscessibus, in aliis mor-  
bis, & febribus audiri potest. Maxime autem id ap-  
paret in empyicis. Dolent enim partes solidæ & au-  
getur calor febrilis, qui interdum in partes omnes ex-  
pansus erat.

### Septalii sententia.

Art. 519, Cum suppuravit, ex disrupta vomica vim  
alia via recte expurgantur, quam per tussim screata,  
non multum spei in evacuanda ea materia per alvum  
reponere debet Medicus, quod ope medici hoc vix fie-  
ri possit; præstat id quandoque Natura, quæ nobis in-

In Em-  
pyema-  
te non  
porest  
Medico

pus per alvum evacuated. compertas vias invenit, & ad salutem ægri statuit; salubriter id quandoque a Natura tentatum scimus, id Aretæus testatur: & nos in purulento ex pleuritide jamjam ex suffocatione moribundo vidimus in magno hoc Valetudinario, qui cum phlegmone laboraret, & propemodum strangularetur, sudores jam frigidi adessent, livescerent omnia extrema, potissimum facies, subito alvi fluore supervenient, maxima saniei copia effusa, brevi tempore convaluit: raro igitur cum id faciat natura. cum eadem nobis incognitas vias sibi struat, cum præterea non sit per loca convenientia, omnino non erit imitanda a Medico; potissimum quia, si leviori purgante utemur, noxii nihil evacuabimus; sin validiori, vires imbecilles reddemus, in quibus solis salutis spes posita est, ut & ferendo morbo sint idoneæ, & materia per tussim scretu expellis sati possit.

*Art. 510.* Per urinam licet quæ in thorace, & pulmonibus continetur materia difficillime, & minus tuto educi possit; promoventibus tamen lotium tuto uti possumus, ut saltem materia, quæ in vomica adhuc continetur, & quæ denuo colligitur, per vesicam excerni possunt.

*Art. 521.* In unctione. & sectione facienda in empyicis hæc sit cautio, ne a ruptione vomicæ statim fiat, sed cum Hipp. in *Coacis prænotationibus* differenda erit in decimum quintum diem, ut & materia coctione ulteriori mitescat magis, quia ab effusione extralocum, ubi maturuerat, iterum alteretur, & ulteriori coctione melior reddatur, post quem diem si inunctio facienda, omnino maturandum. Placet enim Oribas. 9. *Synopseos cap. 3.* celeriter evacuandum esse, neque multum cunctandum, ne vires collabascant: in quo casu omnino a tali actione abstinendum est, ne in illud incommodum incidamus, in quod cum certo mortis periculo incurrunt, qui in ascite ad sectionem numquam veniunt, nisi cæteris remediis omnibus primum in usum ductis, & jam viribus exhaustis, & morte præforibus stante.

*Art. 522.* In suppuratis vomitus plenus est periculi; si enim eodem tempore vehemens tussis, & exolus. creandi necessitas superveniat, simulque evomantur im-



petu multo ex ventriculo crassiora, vix evitari potest suffocatio, conspirante ad suffocationem, & œsophago, & aspera arteria; tum præterea, quod contractis musculis abdominis in vomitu, puris copia multa in pectore repleto coarctata, magis in regione venosæ arteriæ compulsa, sæpe corita suffocat, ut statim mors subsequatur.

*Art. 523.* Proderit tamen inanem vomitum etiam digito provocare, non tamen promovere: si enim a rectis abdominis musculis ab infernis partibus compresso diaphragmate materia paratior facilius propelletur.

Quomodo evocandus.

*Langii sententia.*

*Art. 524.* Empyema Thoracis purulentam designat materiam ex pleuræ, vel pulmonum abscessu rupto ad cavitatem Thoracis depositam.

Empyema quid? Signa ejusdem.

Cognoscitur ex pondere, & fluctuatione in Thoracis, cavo, quæ non admittit decubitus ægri in latus sanum, sed statim suffocationem minatur. Attendendum tamen hic, num pleuritidem, & peripneumoniæ excipiat, ne confundatur cum Thoracis hydrope.

*Art. 525.* Cura vel præservationibus gratia expetitur a Medico, vel restitutionis.

Cura.

Præservatoria in eo consistit, ut occasionales corruptionis causæ quantocyus removeantur, v. g. inflammatio discutiatur, obstructio a pituita deoppiletur; acrimonia sanguinis, catarrhus, & tussis corrigantur: vulnus consolidetur; quæ cuncta quibusdam mediis possint obtineri, ex superioribus partim, partim ex subsequentibus innotescat.

Præservatoria.

Quodsi omni præservatione incassum adhibita nihilo minus sequatur vomica, aut Empyema, aut Phthisis, tum ad alteram curam deveniendum est ubi hæc quatuor puncta observanda sunt.

Restitutio.

*Art. 526.* Primo num ulcus jam ruptum sit an sensus? si non apertum est, interim tamen vel dolore, vel respirationem impediendo molestiam pariat, de ejus ruptione cogitandum, quam obtinebis, vel per usitata remedia emollientia interne, & externe usurpata, vel interne per cancos vivos contusos cum aceto, vel vi-

Ulcus aperiendo.

no, aut externe per oleum corticis cocurbitarum longiorum, cujus comparandi modum, & virtutem incomparabilem vid. in M. N. G. Ann. 1. obs; 10. Vomitorium remedium utut a quibusdam in casu desperato præscribatur non suadeo; licet enim obtineamus ex nimia totius corporis conquassatione aliquândo rupturam vomicæ, ob suffocationis tamen periculum; quod inter vomendum imminet, aut hæmoptysis, aliaque dira symptomata facile insequentia ad evitandas censuras osorum Medicinæ, tutius erit, prorsus ab illis abstinere, vel ante usum de periculo; & ancipiti eventu adstantes, & ægrotum commonefacere.

Pus edu-  
cendo.

*Art. 527.* Secundo aperto aposthemate officium est Medici evacuationem puris vel per expectorantia tentare, qualia sunt veronica, scabiosa, hyssopus, tus-silago, capill. veneris, marrub. alb. brassica rubra; rutu, salvia, rosmarinus, rad. helenii, Angelicæ, Levistici, Imperatoriæ, ligni, guajac. &c. vel per laxativa, ut rhabarb. mechoacanna, fol. sennæ, rad. polypodii, vel per diuretica blanda, ut petrosel. heder. terrest. ocul. cancr. vel si in thoracis cavo fluctuet, per canculos cum aceto, vel vino contusos, quod medicamentum alias vix in hoc casu fallit. Si per urinarias vias non exturbaverint purulentam materiam, ad paracentesim deveniendum est, quæ celeriter tamen adornanda est; nam ut notat Tulpius alias educes quidem pus, & sanguinem, non tamen e periculo ægrum. Quo diutius namque pus relinquitur, eo magis nocet.

Ulcus  
mundi-  
ficando.

*Art. 528.* Hac enim operatione præterquam quod intentionem naturæ sequimur, evidentem non raro pro-tuberantiam intra costarum interstitia formans, & digito quasi locum ostendes per quam materia extrahi debeat; illud insuper commodi accedit, quod decocta vulneraria per siphonem immediate ad locum læsum infundi, adeoque ulcus detergi, & ad consolidationem disponi potest.

Hinc tertium oritur quod est, mundificatio ulceris & consolidatio, de quibus non citius cogitare debet Medicus nisi pure maxima parte evacuato. Con-venientissimum igitur tum erit, cum bechicis vulneraria præscribere, ut sunt urtica, bugula; herb. costi, che-



resolium, geranium robertianum; mille fol. pyrol. plantag. portulac. petroselin. fani-  
cula; burf. pastor. rad. symphyti maj. tormentil. pīmpinell. &c. aut locō harum plantarum præparatas jam cum saccharo conser-  
vas; modo tūssim non augeant; costi; flor. salviæ, urticæ præ primis, & rosarum: aut alia balsamica  
ē. g. balsam. peruvian. aut sulphur. in speciē terebinthinatum parca tamen manu usurpare:

Art. 529. Quartum deniquē est; ut symptomatum sympto.  
habeatur ratio, ex quibus maxime urgentia remo- mata e-  
veantur: inen-  
dando.

## E M P Y E M A :

## Boerhaavii sententia :

Art. 530. Empyemā est collectio puris in thoracis Empyemā  
cavo; ut plurimum ex rupto Pleurítico vel peripneu- ma  
matico abscessu; cognoscitur a tempore inceptæ inflam- quid.  
mationis xx. dierum sine purgatione; & tussi sicca,  
gravitate ad diaphragma; decubitu in unum latus;  
strēpitu puris ad motus, febre lenta; genis rubenti-  
bus; oculis cavis; digitis in extremitate calidis; un-  
guibus recurvis; & abdominis tumore.

Art. 531. Ad curationem quod attinet; cognita Cūtat.  
vomicae pulmonis; pleuræ; diaphragmatis; mediastini;  
vel pericardii disrūptione; omni ope nitendum; ut  
pus evacuetur per os; vel per urinas; si natura has  
monstraverit vias; vel deniquē per thoracis aperturam  
opē instrumenti idonei in latēse affecto; inter costam  
4 & 5, vel 5 & 6 ab inferioribus numero ducto,  
pus lente & per vices educendo; ex indolē puris edu-  
cti; & reliquis ægrōtantis circumstantiis, prognosis de  
vita vel morte pronuntianda erit; si Empyema fuerit  
vetus; vires collapsæ; capilli cadentes; alvi fluxus  
colliquativus; corpus tabitum &c. paracentesis facta  
mortem accelerare solet;

## Villifii sententia .

Art. 532. Empyemā est collectio puris intra cavi- Signa  
tatem thoracis qua respirationis organa opprimuntur; Empie-  
illis matis .



illuc vero pus istud confluere solet, vel ex *pleuriti-*  
*de*, vel *peripneumonia* (& quandoque forsitan ex *an-*  
*gina*) suppuratis & disruptis; post morbos prædictos  
*Empyematis* secuturi major erit suspicio, si post unam  
 vel alteram septimanam; sine sputo copioso, rigores,  
 & febris, & spirituum languores, superveniant, & dein  
 post 14, vel 20. dies *Empyematis* plane facti signa  
 erunt respiratio difficilis, pectoris gravitas, materiæ  
 fluctuatio, & molestiæ sensus e corporis situ mutato,  
 sitis & febricula fere constans, genarum rubor, totius  
 inquietudo & vigiliæ. De *paracentesi* vide locum, & de  
 eventu ejusdem p. 201. Vide etiam *Mayerne*, p. 178.

*Ettmulleri sententia.*

Diagno. *Art. 533.* Cognoscitur, quando factum sit *Empye-*  
 sis. *ma*, quod remittat febris, quin etiam fluctuatio quæ-  
 dam puris hinc inde percipitur; rumpitur autem *vo-*  
*mica* circa diem 20. 30. aut 40. dum vero rumpitur,  
 rigor fit, & febris intensior supervenit, adest tussis  
 continua, quasi ex profundo, quia diaphragma gra-  
 vatur ex incumbente pure parum excernitur, febris  
 mitior evadit, & magis lenta, respiratio est difficilis,  
 & sentitur pectoris gravitas, si corpus inclinant pene  
 suffocantur; sentiunt frequentissime *evaporationes* ex  
 pectoris cavo ad os ascendentes instar *aquæ calidæ*;  
 ulteriori progressu percipiunt in ore *saporem tetrum*  
 & quasi *putridum*, pulsus intermittit.

Curatio *Art. 534.* Apertio thoracis fit inter 5. & 6. costam  
 per ape. (a supremis numerando) mature fiat. Vide *Sculte-*  
 ritionem *tum*. Quod ad remedia attinet, exhibenda sunt gru-  
 thoracis mosum sanguinem *dissolventia* & *absorbentia*, & tunc  
 & aliter. præstat a *diureticis* incipere, in fine autem aliquod  
*sudoriferum* subnectere. Si moliatur aliquid natura,  
 semper medicus sit ejus minister; V. G. quando uri-  
 na purulenta redditur, dentur *diuretica*: in diarrhæa  
 purulenta, *laxantia*; si ad sputum vergeat, *expecto-*  
*rantia*, immo *vomitória*; *nicotiana* est egregia; *fon-*  
*ticuli* etiam a quibusdam inter costas inuruntur, in  
 terne *balsanica*; *vulneraria*, decocta e *lignis*, *gela-*  
*tina* C. C. *hedera terrestris* valde commendatur. Vi-  
 de *vomicam pulmonis*. (841. &c.)

## Verne sententia.

*Art. 534.* Si inflammatio sit jam corruptiva; & verus sit jam obortus abscessus tria juxta Emtullerum sunt patranda. Primo suppuratio promovenda. Secundo abscessus perfecta ruptio adjuvanda: Tertio abscessu aperto partis ulcerosæ mundificatio, & consolidatio; ac simul puris excretio instituenda.

*Art. 536.* Cum suspicio sit verum jam factum esse abscessum, decocta pectoralia valentiora adhibeo uti parata ex hyssopo; Syrup. de symphyto Fernelii, Syrup. de nicotiana, ac præcipue decoctum tabaci Ferdinandi quæ singula apoltema maturant; & rumpunt. Ex nicotiana enim præcipue præsidia utpote quæ acutiora irritando vomitum, & sternutationem inducunt, & abscessum rumpunt.

Decoctum Tabaci hoc est

*Art. 537.* ʒ. *Fol. tab. unc. j. bull. in aq. dulc. ℥iij.* ad consumpt. medietatis add. in fine fol. malv. branc. ursin. violar. ana m. j. colentur & cum sapa miscantur, & detur calidiusculum pluries cochleatim.

Quo decocto uti valentiori non nisi postremo locutor, & cum maxima urgeat vis rumpendi; at ejus vice prius Syrup. nicotianæ quam pluries sum expertus ad unc. j. pro vice præbeo.

Fumus nicotianæ quoque proficit; ut si folia ejusdem reponantur super cineres adhuc ignitos, & fumus per fistulam excipiat: at magis proficius est fumus ex nicotianæ pulvere carbonibus injecto.

Ruptionem coadjuvant etiam emplastra parti affectæ apposita: uti ex quatuor gumm. ex sodicat. paracelsi, quod nimis potens est, omnia denique topica, quæ pro abscessuum ruptura conveniunt: ut ole. & unguenta inter quæ præcipuum locum tenet unguentum Zachariæ.

*Art. 538.* Ager suum quoque exequatur munus, sese volvendo de uno latere in aliud, tussiendo ac fortiter excreando, & nicotianæ pulvere aut alio sternutationem provocando.

Quia ruptio seu apertio abscessus duplici loco fieri potest, duplicem quoque methodum requirit.

Suppuratorum indicationes.

Ut abscessus rumpatur.

Ut abscessus rumpatur.

Secus aperendus.



abscessus fit in musculis externis tantum, & tunc ubi certi sumus de ejus maturatione spatia intercostalia ibidem perforanda sunt. Nec enim in eo loco, quo in empyemate, pure jam in thoracis cavitate collecto sectio fieri solet, apertio instituenda, sed ex pondere, dolore, & calore loco abscessus deprehenso intra duas costas leviter aperiendus est. Quandoque vero abscessus adeo externe tumet, ut veluti sacculus promineat, qui adeo facili sectione aperitur. Etiam inflammata pleura præcipue ea parte quæ musculos intercostales respicit, adeo ut ea parte abscessus rumpatur, & pus musculos adjacentes fere inundet, hæc perforatio seu paracentesis institui poterit; sed caute nimis, ne perterebrata pleura ea parte, qua sana est, nova, & periculosior inflammatio oboritur, & æger binis morbis pessundatur mortem indubio subeat. Idcirco in tam ardua operatione lente procedendum, & non nisi præstantissimo Chirurgo, & Anatomico fidendum, ne artis infamia emergat.

*Art. 539.* Aperto igitur abscessu abstergendum est ulcus: & syringa præcipue injiciendum decoctum vulnerarium elicatum ex hedera terr. herb. veronic. radic. aristoloch. myrrha, cui addi potest sp. vini plus minus pro ratione quantitatis liquoris injiciendi; vel potius spiritus terebinthinæ veluti mundificantium princeps, & balsamicus.

*Art. 540.* Si vero abscessus ad exteriora haud inclinet, sed in penetrabilibus fiat, in varias rumpitur partes: quandoque ex dilatata pleura pus intra saccum colligitur, ex cujus membranæ laxitate, & præ dolore, distentione, ac agitatione, quadam flacciditate acquisita fieri nequit abscessus ruptio; quæ ut accadat, membrana necesse est ut maneat tensa, unde disrumpi valeat; quod in filia D. Pisonis notavit *Lindanus*. Intra igitur sacculo materia purulenta nimis acris, & putrida reddita facile moriuntur ægri: & si quidam hujusmodi affecti evaderent (quo admodum difficile duco) non nisi hoc modo fieret, quod ab illa materia acris, & corrosiva erosio, & corruptis sanguiferis vasis, a quibus imbibitur, & resorberi posset illud evasatum; quod deinde per ureteres, aut alias vias excerneretur, ut supra innuimus ex *Bartholino*; &



sic natura ipsa veluti medicatrix partes consolidaret, & callo obduceret.

*Art. 541.* Vel apostema in pleura factum in cavitatem thoracis abrumpitur, & empyema efficit: tunc in alium morbum commutatur Pleuritis; qui utique solvatur non adeo facilis est, & phthisis timorem habet uti ex *Hipp. V. Aph. tex. 15. Quicumque ex morbo laterali suppurantur, si in quadraginta diebus purgantur a die, qua fit ruptio, liberantur; si vero non, ad tabem transeunt.* Quoniam materiæ purulentæ per trachæam ad os non adeo facilis ascensus est, ex qua decedunt pulmones ipsi inficiuntur, & ulcus insanabile acquirunt; idcirco præsidia quælibet, quæ in empyematis cura a clarissimis auctoribus recensentur, sunt propinanda: quæ ne nimis voluminosus fierem reticeo.

*Art. 542.* Vel abscessus seu apostema in ipsis pulmonibus fit quandoque circa partes ac glandulas; ex quibus materia purulenta exitum in bronchia, & trachæam faciliorem reperire potest, & sic expectorantibus ejus educationem promovere par erit: & deinde consolidantibus, & balsamicis apostematis finem coæquare, & conglutinare congruum erit.

*Art. 543.* Materia exitum interdum non adeo facilem per trachæam reperiens, sed intus diu contenta, & partes propinquoiores fere exedens cavitatem magnam in ipsis pulmonibus efficit, quæ vomica difficilioris curationis erit: si disrupta per trachæam exitum quæret; instantaneæ suffocationis periculum habebit; præter finuosum ulcus non adeo facile sanabile: aut lacerata membrana pulmones ambiente empyema quoque ex peripneumonia fiet.

### *Barbeyraci sententia.*

*Art. 544.* Quamvis Empyematis vocabulum latiori significatione sumptum suppurationem quamlibet significet, videlicet puris collectionem in quamvis corporis parte; nihilo tamen minus ex omnium medicorum consensu idem usurpamus ad eam puris vel purulentæ materiæ collectionem indicandam, quæ in thoracis cavitate accidit; puris dicimus vel purulentæ materiæ collectionem, quia alterum ab altera ut plurimum distinguere solet; nam pus veræ corruptionis congestionem si-

Si rum.  
patur  
in Tho-  
racis  
cavita-  
tem.

Si rum.  
patur  
in Thra-  
chæam.

Vomica.

Empyema  
quid?

gnificat, materia vero purulenta corruptionem cum sanguine, bile, aliisque humoribus mixtam.

Ejus  
causæ.

*Art. 545.* Antecedens causa Empyematis morbus est semper aliquis pectoris, veluti Pleuritis, vel Peripneumonia, ut alibi etiam innuimus.

Accidentaliter quoque Empyema produci potest a suscepto in pulmonibus, vel in pectore vulnere aut ex ruptura vasis cujuslibet a casu, vel ob ingens editum conuenen. Utcumque res se habeat, sanguis qui affatim in pectoris cavitatem emanat ob ductam ibidem moram sese in pus convertit, quia circulari motu cessante, commixta ejus principia a mutuo nexu recedunt, & corruptionis occasionem faciunt; si hoc in pectoris cavitate producitur, Empyema proprie est.

Empyematis  
signa.

*Art. 546.* Empyematis signa sunt duarum specierum. Priora ostendunt, quando oriturum est: ut si pus a pulmonibus in peripneumonia, vel a pleura in pleuritide generetur, quod deinde in pectoris cavitatem effunditur. Altera ostendunt morbum jam confirmatum, seu puris collectionem in dicta cavitate factam.

Prioris speciei signa sunt: exacerbatio febris cum insigni rigore, & languoribus, nec non cum aliquo sensu ponderis in thorace percepto.

Alterius speciei signa confirmatum Empyema ostendentia sunt: Febris ardens cum nocturnis exacerbationibus, & continua ferme respirandi difficultate, materiei in cavitatem thoracis effusæ ad corporis motum sensibilis fluctuatio, sudores diffusi maxime noctu, insignis genarum rubor, oculi cavi, ungues recurvi, crurum pedumque inflatio, eruptio quarundam pustularum per pectus, imi ventris tensio, atque in fine morbi tumor œdematosus circa locum in quo pus collectum invenitur.

Cognoscitur pus in latere sinistro colligi vel in dextero, ex loco quem prægressa tenuit inflammatio, ex calore, pondere, & fluctuationis sensu materiei effusæ, quæ omnia symptomata lateri affecto semper inhærent.

Nullum hic sermonem habemus de signis Empyema ab hydrope pectoris distinguantibus, quia de iis aliquid dicendum nobis proponimus, ubi de pectoris hydrope agemus.

*Art. 547.* Quantum ad Prognosin eadem ante, & post



post paracentesin pronunciari potest. Si perspectum sit ægrum viribus destitui, morbumque pessimis symptomatibus stipari, tunc libere dici potest, de eo esse conclamatum; unde potius ac lateris apertionem suscipere, ægrum fortis suæ relinquere præstat, metu ne medicus intulisse mortem insimuletur. Si contra vires adhuc valeant, nec symptomata nimium vehementia vigean, fidenter operatio institui debet, qua peracta si effluens pus album sit, æquale & concoctum, bonum est, & felicem eventum portendit; si vero tenue, foetidum, & sanguinolentum, malum, & sanationis spem admodum infringit.

Empyema quod Pleuritidem, aut Peripneumoniam consequitur longe deterius est, quam quod vulnus vel vas cuiusdam pectoris rupturam; nam hujus consecraria ut plurimum bona prodire solent maxime si vulnus admodum pulmones non penetraverit; illius contra sæpenumero in Marasimum, in febrem lentam, atque in Phthisin exeunt.

Quando Chirurgi specillum aureum vel igneum colorem a purè recipit, malum est, juxta *Hippocratem*, quia hujusmodi colores summam puris simul instrumento fortiter adhærentis acrimoniam ostendunt.

*Art. 548.* Tota Empyematis curativa methodus lateris perforatione innititur, maxime si evidentia signa habeantur eandem utiliter suscipi posse; secus in re dubia laudabilius est, aliquandiu protrahere, quam imprudenter ac temere operatione instituta suæ famæ perperam morem gerere, ægrumque in gravius discrimen protrudere. Ubi eo usque completum esse Empyema innötuerit, ut nullus dubitationis locus maneat, mox manus operi admovenda, latusque perforandum, ut hac pus in pectoris cavitate congestum egredi possit, atque hujus operationis methodus apud laudabiliores neotericos, qui eandem accuratius descripserunt, consulenda.

*Art. 549.* Dum operatio expeditur, hæc duo animo sunt diligenter perpendenda. Alterum ut pus sensim, & reiteratis vicibus educatur, quia cita nimis ac plenior evacuatio a tanta virium exinanitione exciperetur, ut æger protinus occumberet; alterum cavendo quo magis fieri potest, ne aer per factum vulnus pe-

Curatio  
per Pa-  
racen-  
tesin.

Nonnul-  
la ob-  
serva-  
tiones  
huc fa-  
cientes.



ſtoris cavitatem ſubeat, quia vix hic puri miſcetur, ejus fermentatione mirifice aucta acerrimam putidamque facit corruptionem. Quamobrem ad hujusmodi inconueniens opportune vitandum, vel ſaltem inhibendum bis terve in die haberi injeſtiones decocti cujuſlibet vulnerarii in thoracis civitatem laudamus, quæ etiam in uſu trahi debent, intuitu nimis denſum pus diluendi. Ubi perſpectum erit pus nimis tenax viſcidumque eſſe, decoctum, ſeu aqua vulneraria ſequenti ratione comparabitur.

24. *Fol. agrimon. abſynth. min. ana man. j. ſummit. hyperic. roſ. rub. ana man. ſemis, uvar. paſſul. un. ſem. aq. font. q. ſ. ebull. ad conſumpt. tertię partis, dein colat. lib. j. adde mel. roſat. unc. j. ſ.*

Injeſtio  
vulne-  
raria.

Quo liquore toties fit in thorace injeſtio quoties puri denſitas exigit, dando operam ut ægri corpore poſt injeſtionem paulo agitato omnia intus miſceantur, pus promptius diluatur, & interior cavitas exactius purgetur; ea demum ſituatione locabitur æger, ut facilius immiſſa injeſtio cum pure poſſit effluere.

Præcticis nonnullis uſuvenit pro quavis alia injeſtione aquam hordei cum oxymelite, & melle roſato uſurpare, alii vero ſupradictæ decoctioni *Ariſtolochiæ*, & *Gentianæ* radices addunt.

Præter injeſtiones ad puri exitum expediendum laudatas, commendamus etiam opportunum aliquod Emplaſtrum ſuppurationis adjuvandæ gratia parti affectæ applicare.

Dum operatio inſtituitur ſi deſiderium incedat cognoscendi, an quod emanat purum ſit pus, an vero materia tantum purulenta, nihil aliud præſtandum eſt, quam ut partem quamdam effluentis in aquam dejiciamus, quæ ſi fundum petat pus merum indicabit, quod ratione ſubſtantiæ terreſtris gravitate ſua facile deſcendit; ſi vero ſupernatet, erit tantum materia puriformis, quæ aliorum liquorum mixtione mero pure levior apparet.

Remedia  
interna.

Art. 550. Ceterum, ut maſſa ſanguinis refrigeretur, & quidquid in ea acris, & ſalini reperitur temperatione ſubeat, exhibebuntur identidem ægro emulſiones, vel julapia; ut ſequitur.

Emul-  
ſiones.

Emulſiones, inquam, eadem methodo componi po-  
te-

terunt qua recensitæ supra fuerunt in Pleuritide. His  
pertinaces vigilæ, aut vehementes dolores urgeant,  
addere Narcotica licebit, Julapiorum vero formulæ ita  
se habent.

℞. Rad. alth. glycyrrh. ana. unc. j. fol. bugloss. ca-  
pill. vener. borrag. polytr. ana. man. j. sem. 4. frig. Jula-  
pium  
seu A-  
poze.  
ma.  
maj. unc. j. stor. borrag. pap. rhæad. violar. hord. ana  
pug. j. aq. font. q. s. coq. ad consumpt. tertiæ partis  
dein in colati ℞j. dissolve syrup. jujub. vel violar. unc.  
iij. fiant tres partes, quarum alteram mane aliam  
vero vespere æger propinet.

Pro hujusmodi Julapiis aquæ destillatæ identidem  
adhiberi possunt, quomodo sequens formula ostendit.

℞. Aq. destill. pap. rhæad lil. convall. ana unc.  
iij. vel tantundem aq. destill. rosar. in quib. dissolv.  
syrup. capill. vener. vel tussilag. unc. j. sp. sulph. pa-  
rum. m. f. julapium vespere sumend.

Aliud.

Interea alvus clysterum ope lubrica servanda est, qui  
decoctione parantur foliorum Malvæ, Parietariæ, La-  
ctucæ, addito parum hordei, cum manipulo surfuris,  
tum etiam electuar. catholic. & melle rosato.

Subinde etiam blandis laxativis purgandus æger, ut  
inde pars quædam febrilis materiæ evacuetur. Qua-  
morbem.

Laxati-  
va al-  
vum.

℞. Senn. ℥ij. tamarind. unc. sem. pulp. cass. unc.  
j. ros. pallid. parum crystal. miner. vel sal. prunell.  
℥j. aq. font. unc. viij. infund. per noct. super ciner.  
calid. mane in colat. unc. v. dissolv. mann. unc. j. pro  
potione ægro exhibenda.

Atque identidem danda ei aliqua potio vulneraria,  
præcipue si Empyema alicui graviori vulnere superven-  
nerit, vel etiam si ab ingenti conatu ottum fuerit, ob  
vasis cujusdam in pectore ruptionem. Quæ sequitur op-  
portunam judicamus.

℞. Hord. integr. man. sem. fot. agrimon. pimpinel. Potio  
vulne-  
raria.  
millesolii, sanicule, consolid. maj. ana man. sem. pi-  
losell. parum summit. hyperic. tantundem ros. rub. pug.  
j. aq. font. q. s. ebull. ad consumption. tertiæ partis.  
In colatur. dissol. syrup. ros. sicc. unc. j. vel ij. cujus  
subinde aliquid cochleare ægro porrigetur.

Si vero non obstante horum remedium usu æger  
in marasimum, vel Phthisin ruat, præscribetur ei ali-  
nium



ninum lac, & per hujus usum omni decimo die infusione sennæ cum manna purgabitur,

Hac ipsa methodo tractandus quoque est, si forte habita thoracis perforatio in fistulam degeneret, cum nihil utilius sit hisce in casibus lacte.

*Inter legendum & observandum.*

*Art. 651.* Signa effusionem puris in cavitatem thoracis connotantia ex accurata descriptione quam D. Verduc dedit in suis *Chirurgicis Operationibus* hujusmodi sunt.

Accura-  
ta de-  
scriptio  
signo-  
rum Em-  
pyema-  
tis. Tunc cognoscimus, inquit, in pulmonibus, vel in pleura abscessum generari, quando Peripneumonia, vel pleuritis consuetis remediis minime obtemperans diem decimum quartum prætergræditur, absque eo quod ullum concoctionis signum, aut per sputa, aut per sudores, alvum, & urinas efferat. Hisce stantibus abscessus generatio die vigesimo quinto, vel trigesimo attendenda est, citius vel serius etiam, pro ratione virum, ætatis, & temperamenti ægrotantis, vel habito respectu magnitudinis morbi, vel anni temporis. Abscessum jam perfectum cognoscimus, quando nulla habita secretionem per necessarias vias, febris & dolor una cum aliis symptomatis imminuuntur, & aliquandiu conquiescunt, ægrotusque minus gravatus, sed aliquantulum melius se habere videtur. Si vero paulo post dolores oppressionesque revertuntur, etsi non adeo vehementes; vel si febris exacerbat, & renovat; atque crebris sociatur rigoribus, & cum tussi conjungitur; vel si æger sudores maxime nocturnos habet; vel demum si dolor gravativus evadit, & cum sensu ponderis; hæc vero omnia abscessum denotant. Cognoscitur abscessum inter utraq; pleuræ laminas esse, quando prægressa symptomata vehementia fuere ex. gr. si febris acuta admodum præcessit, dolores vivissimi, tussis prorsus sicca, ullo absque excreatu; quæ omnia respirationem dolorosam simul efficiunt; Cognoscitur abscessum pulmones tenere, si levior fuit febris, dolor obtusior, oppressio major quamvis minus dolorosa respiratio, tussis vero frequentior, & validior, sputum sane sanguineum, & purulentum &c. ægerque inter tuendum,

& ex-



& excreandum meticulosior & tristior. Cognoscimus item abscessum intra pectoris cavitatem erupisse, quando æger dolorem gravativum percipit in loco diaphragmatis, præcipue versus costas spurias, de quo nihil prorsus antea querebatur, & ubi sedendo hunc ipsum dolorem augeri sentit, atque inde respirationem difficiliorem fieri; si in latus decumbendo, in quo antea semper doluit, levamen aliquod experitur, contra vero si in latus appositum, in quo nihil mali passus est, materia, quæ in alterutra Thoracis cavitate fluctuare supponitur. Mediastinum premendo sensibiles dolores ibidem cum insigni respirandi labore parit. Quod si extravasatio utramque cavitatem pectoris teueant in neutro latere decumbere æger poterit, quin a recensitis molestis magis non vexetur, unde commodior decubitus hoc in casu supinus erit, nec sedere utique valebit ob sensum ponderis, & doloris totum diaphragma occupantem, quod in hoc situ adeo opprimetur, ut respirationis munus exercere nequiverit, nisi ubi effusæ materiæ quantitas admodum pauca reperiatur.

*Art. 552.* Evenit aliquando ut pus a Thorace contentum per urinæ vias immutatum egrediatur, quod sane circulationis legi referre non dubitamus; quia venarum absorbentium orificia, quibus undique Thoracis cavitas scatet illud satis liquidum haurire possunt. Neque dubitamus, inquam, ita se rem habere; cum nullibi aliæ viæ prodeant, per quas natura pus a Thorace ad renes detrudere possit. Observatione dignum est hujusmodi effluxum in suppuratis Pleuritide ut plurimum contingere, in quibus pus, quod generatur, liquidum esse solet, & inconcoctum.

Pus per  
urinas.

*Art. 553.* Refert *Vilistus Pharm. Rational.* cauterium intra homoplasas inustum, purulentam hanc materiam aliquando egregie eduxisse; sed specialis tantum est casus: a quo regula formari potest nulla. Quænam amabo via ex Thorace ad scapulas datur? Et licet dixeris per poros, & fibrarum interstitia transire hanc materiam posse, quia totum corpus permeabile est, & perspirabile juxta Hippocratis effatum: non tamen Aphorismo huic semper se alligari patitur Statura; sed rarioribus observationibus hæcce puris evacuatio æque annumerari debet, accubi per renes, & ve-

Idem  
per ho-  
mopla-  
sas.

& vesicam, aut per secessum eadem succedit: Ne tamen nihil omnino egisse, videmur; si fortasse æger respuat *paracentēsin*; excitentur in eo huiusmodi fonticulus, exhibeanturque simul resolventia diuretica; aut blande laxativa, ut si forsitan per quoddam emunctorium deducere pus sponte vellet natura, in subsidium ista opportune adhibita nanciscantur. *Langius*:

*Art. 554.* Methodus ab Auctore Lexici Medici Gal-  
Ptifana. lice conscripti laudata, ut pus a cravitate pectoris per urinæ vias egrediatur, ita se habet: Æger primo utatur sequenti Ptifana.

℥. *Sassaf. frustulatim incisi unc. j. inf. in aq. fervente dein parum bull. tum add. Heder. terr. Pulmonar. man. sem. iterum null. parum* *¶ in fine Glycyrrh. par.*

Deinde hauriat æger fumum ex decoctione fol. & flor. Tussilag. aqua incocta ter in die, quod; ut facilius exequi possit, caput ejus tela laxè deorsum fluctuante obtegatur. Huiusmodi remedium seu suffumigium prodest tantum; ubi abscessus pulmonem occupet, pro quo interim bis in die sequens decoctio propinari jubetur.

℥. *Fol. Tabac. ʒj. aq. unc. xiv. bulla parum, dein probe tecto vase infusio in loco frigido relinquitur. Huius dosis est unc. j. vel bina cochlearia, addunturque ol. tartar. p. d. gutt. jv. singula vice: Decoctio hæc tepide hauritur.*

Alia decoctio.

Adhiberi etiam cæpæ squill. post aqua cocta, cujus decocti cyathus manè, & vespere ægro propinatur. In aquæ mensuram h. e. unc. xvj. cæpæ squillæ unc. iv. ebulliendæ injiciuntur. Si canceri fluviale facile comparari possunt; eorum tres vel quatuor cum jure incoquuntur in quo Agni vel Vituli caro aut Bovis splen- cum macriori pullo; hordeo; & caricis infarcto; ebullit. Nec affirmare erubescō; quod si diu in hoc regimine persistatur curationem prosperum exitum obtenturam. In alvi stipticitate clysteres injiciuntur ex fursuris decocto, cum salis culinaris pugillo.

*Art. 555.* Mox ac comperiētur febrem desivisse aliaque symptomata conticuerint Lac ægro sequenti ratione temperatum porrigetur.

Lactis  
usus.

℥. *Rad. scorzoner. fol. scabios. hord. integr. ana*  
man.



Can. j. aq. font. ℥. iv. sem. bull. per horæ quadrantem; dein tantundem lactis adde cremore suo bulliendo scorsum exuti, & in hac mixtura dissolve mellis optimi q. s. ad gratum saporem.

Art. 556. Potio hæc mane stomacho jejuno; atque In Paespere trihorio a cena propinatur, quæ insuper in racen- Rheumate; Siccitate pectoris; & catarrhis excellit. ressi no. tandæ e

Supra recensita Empyematis signa non solum ad cognoscendam morbi daturam dirigunt; verum etiam connotant utrum operatio perforationis sit necessaria. Nam inutilis quidem esset in pulmonum Empyemate ubi Thoracis perforatio ad materię evacuationem incassum adhiberetur; excepto tamen si abscessus pulmonum superficie insideret, absque eo quod viscus pleuræ adnæreat; quo casu abscessus ad locum doloris exactissime correspondet. Quodsi abscessus profundiora teneat, nec dolore fixo ad hunc ipsum locum correspondente patefcat, tunc operatio frustanea prorsus ac inutilis foret.

Præcipua in hac operatione cautio est, ut commodior situs eligatur pro faciliore materię defluxu. Etenim in Empyematis casu duo in Thorace notantur loca; ubi perforatio institui potest utiliter; alterum, puta, necessitatis, alterum electionis; necessitatis illud quando apostematis situs, ut in abscessu pleuræ; aut in eo pulmonum eidem pleuræ adhærentium, evidentissime ad externa apparet: electionis alterum quando nihil magis determinat; ut in uno potius quam in quovi alio loco perforatio instituat. Hoc verò casu commodior situs eligitur h. e. ad posteriorem inferioremque Thoracis partem inter tertiam quartamque spuriam costam numeratione ducta ab inferiori ultimâ cum distantia quinque transversorum digitorum a spina dorsi. Si operatio hæc habenda sit in ægro admodum pingui, vel qui insigni teneatur emphysemate adeo ut metus sit ne costarum numerus rite supputetur, tunc necessarium erit angulum inferiorem Omoplætæ quætere; & infra eum ad quatuor digitos transversos; & procul a spina dorsi quinque digitos perforare.

Observandum item est in iis diuturno pectoris morbo, & longa pleuritide vexatis diaphragma insensibiliter costis adhærere, adeo ut ad tertiam quartam & quin-



& quintam usque ascendat, maxime si frequentior respiratio fuit, & concitata, Ideo quærendum est diligenter de situ doloris, atque hoc illud est antequam operatio suscipiatur, quod accurate cognosci debet.

Quando pleura, in eo situ, qui post inflammationem in abscessum abiit, pulmonibus adhæret, pus, quod tunc ad diaphragma usque descendere nequit, erosio intercostalibus musculis viam sibi quandoque efformet, quo disrupto evacuatur; sicque ex prava causa salubris effectus producitur.

Quantum demum ad modum, quo perforatio absolvi debet, unde puri, sanguini, vel aquæ a Thoracis cavitate contenti exitus expeditur, consulendi sunt hac de re, tum etiam de iis quæ postmodum peragenda sunt, doctiores Chirurgiæ Scriptores in primis vero Neoterici: quales sunt *D. Verduc, Dionis, la Charriere*, sed maxime *D. Garengot Tom. II. cap. 6. pag. 376. & seq. secund, edit.*

## PHRENITIS & PARAPHRENITIS.

### *Hippocratis sententia.*

Phreni-  
tidis  
Diagno-  
sis.

**Art. 557.** Phrenitis ubi apprehenderit, febris primum debilis detinet, & dolor circa præcordia maxime autem dextera, ut ne contingi quidem permittant; mente moventur ægri, & intentis oculis vident, & alia similia faciunt his, qui peripneumonia affecti mente laborant; nam quemadmodum facilis est transitus a pleura ad pulmones, sic ex pulmone ad phrenes: sive ad septum transversum (seu diaphragma). Cum autem quarta aut quinta dies advenerit, febris fortior fit, & dolore augescunt & color subbiliosus efficitur, & mens percellitur. Si hic morbus a mota bile veniat visceribus, & septo transverso insidente, judicatur brevissimus septima die, longissimus undecima, quem effugiunt pauci, transi-que etiam in peripneumoniam, & si transierit pauci effugiunt.

**Art. 558.** A pleuritide in peripneumoniam atque inde in phrenitidem malum est. Urinæ decolores nigra innatantia in medio habentes Phrenitidem cum vigiliis,

giliis , in turbatione significant . Stillatio e nari-  
bus in hoc morbo pernicioſa , tum alias , tum ſi quar-  
to incœperit die , nec non malæ ſunt egeſtiones alvi  
albæ . Phrenitici parum bibentes , ſtrepitum valde per-  
cipientes , tremuli aut convulſi ſiunt . Tremores autem  
hic ſiunt lethales . Manſuetudo in principio , & frê-  
quentes permutationes convulſoriæ , & alvi proflu-  
vium rubicundum mala ſiunt . Quicumque ſupra qua-  
draginta annos phrenitici ſiunt , non ita valde ſane-  
ſcunt : minus enim periclitantur quorum naturæ , &  
ætati morbus affinis fuerit . Floccos de veſtibus evelle-  
re , aut paleas de pariete detrahare lethale .

*Art. 559.* Cum phrenitide atrabilariis occupatis ſi Prognosis bona.  
hæmmorrhoides oboriantur , bonum . In hoc morbo in-  
ſomnia evidentia bona . Tanto minor inſania , & de-  
lirium ſit , quanto paucior & debilior eſt bilis quam  
pituita .

*Art. 560.* Hic morbo affectum caleſcere oportet Curationis methodus.  
calefactionibus humidis , & potionibus excepto vino ;  
mollito enim corpore , ſudor quoque magis ſequitur ;  
& alvus & urina ſecedit . Caput multa caſida lavare  
conducit , & ſi quidem fieri poterit ſurſum purgare ,  
& per tuſſim ac ſpuitionem educere oportet quemad-  
modum in peripneumonia , ſin minus inferna ſalvus præ-  
paranda eſt , ut egerat . Morbus autem lethalis eſt ; mo-  
riuntur enim tertia , aut quinta , aut ſeptima die , ſi  
vero leniter corripiat veluti peripneumonia judicat .

### *Ballonii ſententia .*

*Art. 561.* In doctrina Hippocratiſ triplex phrenitis Phrenitis triplex.  
reperiri poteſt . Una vera in inflammatione , & alte-  
ratione cerebri poſita ; altera impropria quæ obſcura  
dicitur , quæ in alienatione temperamenti cerebri ,  
non ſolum in alteratione conſiſtit , & eo modo ſe ha-  
bet ad cerebrum , quo febris hæctica ad corpus febrile  
& hæcticum , unde in *Prorrh.* ait Hipp. *Tremulæ , blan-  
dæ , obſcuræ , & contrectantes deſipientiæ valde ſiunt  
phrenitiæ* ; tertia etiam impropria , eſt , ut quum quis  
phreniticus quidem eſt , ſed non valde inſanit , nec ea  
facit , quæ vere phreniticus ; id porro ſit , quoniam  
præter humorem bilioſum deſipientiam facientem ,



est crassus alius & frigidus, qui inducit aliquid comatodes: unde iterum Hipp. Epid. *Nullus phreneticorum vehementer insanavit, velut aliis usu venit, sed alia quadam veteruosa in somnum inclinatione capite gravati peribant.* Et hi phreniticis obſcure vocantur; & id ſæpe vulgo ignotum, & medici eos demum vocant phreniticos, qui clamant, & exſiliunt. In obſcure ea (Phrenitide) virium languor eſt, & hectica quædam affectio Phrenitidis: Idem contingit, quod laniſ tinctis, quæ colorem non deponunt; ita quidem hæc affectio cerebro impreſſa hectico modo vix elui poteſt, quare Hipp. memorat: *Quibus convulſis oculi fixi relucent, non apud ſe hi ſunt; & diu egrotant.*

Phreneticorum  
deſipi-  
entia  
peſſima.

Phreniticus  
quaſi  
miraculo  
ſani-  
tati re-  
ſtituitur.

*Art. 562.* In lib. *Paradigmatum* hunc habet caſum: Nobilis phreniticus per novem dies decubuerat. Nulla arte conciliatur ſomnus, circa nonam noctem omnia exacerbat. Exſiliebat, & medico aſſidenti manum aſſerre volebat. A miniſtris in lectum conjeſtus eſt, ſingit ſe dormire. Inopinato e lecto ſurgit, & e ſublimi fenestra, in medicum, qui in area ſtabat, incidit præceps. Miraculo ſanitati reſtituitur. Putant caſu diſcuſſam materiam, copioſæ urinæ fluxerunt, ſimile quid apud Hipp. lib. 5. Epid. Guidam crurum rigor erat, & diuturnus: forte in lapidem cecidit, læſum caput eſt vertigio oborta eſt, deſiit malum vetus.

Veternosa phrenitis  
du-  
plex.

*Art. 563.* Et in *Deſin. Medic.* Ut plurimum phrenitidem contingit eſſe conſpicuam, ut quum ægri ejulant, vociferant, floccos carpunt, mordent, proſiliunt, aperteque delirant. Eſt & alia in qua delirii quidem ſumma ſunt omnia, ſed manifeſtis illis notis ſeſe produnt minime. Et ea ſæpe cum veteruosa eſt affectione, quæ ſi non adeſſet æque petulantes, vehementesque ægrotantium impetu forent. — Porro veteruosa affectis biſariam adeſſe poteſt.

*Art. 564.* Vel pituita cerebrum occupante per ſe aut cum alio humore: unde part. 1. lib. 1. *Prorrh. ſect. 1.* Dum, ait, malum eſſe ſi comatoſi phrenitici quarto die exacerbantur, ſignificat, ait Galenus; jam non a ſanguine malum eſſe: quia ſi illud ſanguis adduxiſſet, veriſimile eſſet, aut natura juvante, aut Medici ope copiam ſanguinis detractam diminutamve eſſe; tunc autem cum quarto die, quo malum ceſſa-



re debet; illud increfcat, dominantis pituituofi humo-  
ris argumentum eft:

*Art. 565.* Secundo modo veternoſa quodammodo  
phrenitis eſſe poteſt per alienationem temperamenti;  
humidique abſumptionem novo quodam affectionum  
ſucceſſu; Itaque ſubiūdicat Hipp: obſcure tamen, de-  
lirium biſariam ſuccedere poſſe aut alterato tantum  
cerebro; aut alienato: Alienatio autem alteratione  
longe deterior eſt: Atque talem phrenitidem parvo  
pulſu languido ac anguſto exiſtere aſſeverat Galenus  
in *Comm.* oppreſſa nimirum jacente, ac ſanctente ſa-  
cuntate. Et qui aſſident ægris; dum ægrum non di-  
rimentem ſe vident ac taciturnum; brevi cum eo be-  
ne actum iri credunt; quum mors tamen proxima  
inſit.

*Art. 566.* Si in ardente febre aurium ſonitus cum phreni-  
ſcaligine; proveniatque in naribus gravitas; mente ex his ſym-  
melancholia ægri aberrant. Galenus hanc Hipp: locum proma-  
explicat de febre ardente cujus focus eſt in cerebro tica &  
propter collectam in eo bilem, quæ inflammationem idio-  
excitat: Eaque febris diſtinguitur ab altera; quæ fit pæ-  
non coacervata in cerebro materia; ſed in venis in-  
ferioribus reſide, a qua flatuoſa expiratio ſuſcitatur,  
delirium excitans. Nam cujus febris ardentis materia  
in cerebro manſionem habet; ea continuam habet de-  
ſipientiam, & ſymptomata non ita ſunt fugacia: At  
quæ ardens febris materiam habet in aliis partibus;  
non habet deſipientiam aſſiduam. Prior febris phreni-  
tidi ſimillima eſt ob ſymptomatum cognationem: Sed  
in phrenitide ſymptomatica; ea eſt febris; quæ adeſt.  
Præterea; ardens febris primario cerebri affectu con-  
tracta fere ſtatim inſit; apparetque. Phrenitis non  
tam cito; ſed tempore acquiritur. Ita enim Galenus;  
phrenitis, ait; paullatim accidere ſolet; non autem  
quieſcere ſubito, atque confertim. Immo ne in de-  
clinatione quidem febris deliria quieſcunt, quod aliter  
contingit in iis febribus, quarum deliria ſunt ſym-  
ptomata tantum; prout enim manſueſcit febris, ita  
& deliria.

*Celsi sententia.*

Phreni-  
tidis de-  
finitio.

*Art. 567. Phrenitis* a Græcis dicta, infania est acuta, & cum febre. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere, & loqui aliena. Quod non quidem leve est, neque incidere potest, nisi in febre vehementi, non tamen æque pestiferum est. Nam plerumque breve esse consuevit, levatoque accessione impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre præceptum est.

Pecior  
ejusdem  
descri-  
ptio.

*Art. 568. Phrenitis* vero tum demum est, cum continua dementia esse incipit, aut cum æger, quamvis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit; Perfecta est ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus autem plura genera sunt. Siquidem ex phreneticis alii hilares, alii tristes sunt, alii facilius continentur, & intra verba disipiunt, alii confurgunt, & violenter quædam manu faciunt: atque ex his ipsis alii nihil nisi impetu peccant, alii etiam artes adhibent, summamque spem sanitatis in captandis majorum operum occasionibus præbent, sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos, qui intra verba desipiunt, aut leviter etiam manu peccant, onerare asperioribus coercionibus supervacuum est; Eos vero qui violentius se gerunt, vincere convenit, ne vel alteri, vel sibi noceant. Neque credendum est si victus aliquis, dum levare vinculis cupit, sanum jam se fingat, quamvis prudenter, & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est.

Metho-  
dus me-  
dendi &  
regimen.

*Art. 569. Fere* vero antiqui tales ægros in tenebris habebant, eo quod eis contrarium esset exterreri, & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid judicabant. At *Asclepiades*, tamquam tenebris ipsis terrentibus in lumine habendos esse dixit: neutrum tamen perpetuum est. Alium enim lux, alium tenebre magis turbant, reperiunturque, in quibus nullum discrimen dephrendi vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est utrumque experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce, eum, qui illam, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger si vi-

res habet loco lucido, si non habet, obscuro continendus est.

*Art. 570.* Si vires ægri patiantur, sanguis mitti debet. Nec minus deliberari, potest an alvus ducenda sit: tum interposito die convenit caput ad cutem tondere, deinde aqua fovere, in qua verbenæ aliquæ incoctæ sint, vel ex reprimentibus: aut prius fovere, deinde tondere, & iterum fovere, ac novissime rosa caput, naresque implere, offerre etiam naribus ratam ex aceto contritam, movere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Si vero virium imbecillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpillo, similique aliquo madefaciendum est.

De san-  
guinis  
missione  
aliis re-  
mediis  
capiri  
admo-  
vendis.

Utiles etiam in quibuscumque viribus herbæ duæ sunt, *Solanum*, & *Muralis*, simul ex utraque succo expresso caput impleatur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est, parcius tamen in his, qui nimis hilares, quam in his, qui nimis tristes sunt.

*Art. 571.* Adversus omnium autem sic insanientium animos, gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Sæpius assentiendum, quam repugnandum est, paulatimque, & non evidenter ab his, quæ stulte dicuntur, ad meliora mens ejus abducenda est. Interdum etiam elicienda ipsius intentio, ut sit in hominibus studiosis litterarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur, aut perperam, si id ipsum eos offendit.

Quæ ad  
ægri a-  
nimum  
spectant

*Art. 572.* Omnibus vero sic affectis somnus, & difficilis, & præcipue necessarius est. Sub hoc enim plerique sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam cronicum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant his, quidam somnum moliantur potui dando aquam, in qua papaver, aut hyoscyamus incoctus sit: alii mandragoræ mala pulvino subiciunt: alii vel amomum, vel cycamini lacrymam fronti inducunt. Neque alienum est, si neque sanguis antea missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam admoveere. Quæ quia levat morbum potest etiam somnum facere.

Vigilia  
tempe-  
randæ.

*Art. 579.* Moderatio autem in cibo quoque adhibenda. Nam neque implendus æger est, ne insaniat, quid,

Cibus



neque jejuni utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. (Cardiacum morbus est contrarius Phrenitidi ex nimia imbecillitate corporis, quod stomacho languente, immodico sudore diregitur) opus est autem cibo infirmo, maximeque sorbitione, potione aquæ mulsæ, cujus ternos cyathos bis hyeme, quater æstate dedisse satis est.

*Tralliani sententia.*

*Art. 574.* Phrenitis exquisita a flava bile nascitur eamque præcedunt vigiliæ continuæ, & intensæ, somnique turbulenti, ægri exiliunt, & somniorum imaginationibus interdum detinentur, ut etiam nonnulli se futura scire suspicentur, & velint prædicere. Præcedit etiam, ut ægri, quæ dicuntur, obliviscantur. Item cum respondent ferociiores ac iracundiiores, quam prius apparent, magnam, & crebram respirationem edunt, pulsus habent parvos, & duros, atque occipitio frequenter indolescent. Quodsi affectus increverit, fixis oculis cernunt, eosque admodum squallidos, & rubentes habent, nec non pituita eis inhærescit, ac lacrimæ ex utrisque profluunt. Si vitium magis intendatur, incipiunt & flocos carpere, & festucas legere, neque responsionem manifestam dare possunt, & linguam multo magis scabram habent, febresque sicciores, interdum & tremuli sunt, & ægre sentiunt, ut etiam cum excitentur vix aut nequaquam exaudiant.

Phreni-  
tis ex  
quisita.

*Art. 575.* Phrenitis spuria seu falsa a mixtione bilis cum pituita oritur, Hac detenti vigilant simul, & in altum somnum deferentur, rursusque paulatim delirant, & somno alto, soporosoque oppressi cum tumultu excitantur, & iis, qui eis loquuntur inordinata verba, & insaniam testantia respondent.

Notha  
seu spu-  
ria.

*Art. 576.* Phrenitis inveterata ea est, ob quam ægri, per initia quidem turbulenti fiunt, & furibundi tanquam bile statim ad superiora tendente, & cerebrum excitante, postea autem hecticis febribus fere detenti æquabili temperie in totum cerebrum dispersa non amplius valde perturbantur, & inordinata, furiosaque nugantur, sed jacent, neque vocem edere propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figuram mu-

mutantes, neque valide exilientes, manus solummodo inordinate jactant, nonnulli autem ipsorum ne palpebras quidem, propter vires jam ante debilitatas aperire possunt. Sin autem aliquando aperiant, ubi paulisper respexerint, statim rursus propter infestantem humorem connivent. Pulsus hic maxime imbecillis est, durus, exiguus, & angustus.

*Art. 577.* In omnibus Phreniticis si vires robustæ Phreni-  
sunt, & nihil aliud prohibet, sanguinis detractio ad- tidis .  
hibenda est tanquam primum omnium, & maximum curatio  
futurum præsidium. Sin autem repugnet æger, quod  
sæpe accidit, ut nolit brachium porrigere, omnino co-  
nandum tandem est ex recta in fronte vena sanguinis  
missionem moliri. Deinde caput refrigerandum com-  
mendat, & vigilias excindendas. Non solum autem  
vigiliis sed etiam feбри mederi dedet. Balnea item pro-  
sunt, a quibus in posterum delirio, & affectu febrim  
incidente liberantur. Sin autem vires imbecillæ fue-  
rint tunc maxime vitabis, inquit, ne quid corpori so-  
mnoque inducendo accommodum exhibeas. Nam in  
his qui infirmas vires habent, non vulgaris noxa, im-  
mo interdum mors talium potionem comitatur.

### *Vvillisi sententia.*

*Art. 578.* Phrenitis est desipientia continua, scilicet Phreni-  
principum cerebri facultatum depravatio ab inflamma- tis  
tione meningum orta cum febre *synocha*. Huic mor- quid  
bo affinis Paraphrenitis dictus est diaphragmatis inflam- causa .  
matio.

*Art. 579.* Phrenesin potius febris succedere, & quia  
sanguis effervescens recrementa sua adusta capitis trans-  
fert, produci, *Hippocrates* olim, & nunc quisquam  
vel e plebe observat, in quantum, scilicet, febrici-  
tantis urina a turbida, & crassa, in tenuem & aquo-  
sam mutata Phrenesin imminemtem indicat; cujus id-  
circo affectus causa exinde colligitur esse *materiæ fe-*  
*brilis* in cerebrum metastasis.

*Art. 580.* Ex dissectionibus patet Phrenesin non a Quales  
meningum inflammatione oriri, neque Paraphrenesin morbi  
diaphragmatis, sed Phrenitis definiri potest; totius reveia  
anime sensitive sive spirituum animalium, quoad to- sunt  
tum Phreni-

is &  
Para-  
phreni-  
tis.

tam eorum hypostasin, phlogosis sive inflammatio; & prout incendium vel a cerebro tantum, vel ab hoc simul & cerebello incipit, valgo in Phrenitida & Paraphrenitida distinguitur, quod tantum est ac functiones animales spontaneas fere tantum & potissimum, aut una cum his vitales lædi.

Signa  
diagno-  
stica.

Phrenitis ( inquit Lommius ) his signis innoscit, febris urget acuta, atque continua, continuusque mentis error, modo his, modo aliis animæ vitalis actionibus; expeditus in omnem audaciam homo est, & vicissim tum vigiliis, tum somno difficili, turbulentoque impeditur, sic ut interrupta quiete protinus cum impetu e cubili prosiliat, vociferetur, ferociat, ac modo p'oret, modo cantet, verbaque sine sensu, sine ordine proferat, interrogatus ab alio omnia aliena respondet; oculi sunt mobiles, flammei, cruenti, squalidi, quos eger cerebro perfricat, modo sicci, modo lachrymis perfusi, lingua spuma & nigra, dentes frident, sæpeque cruor e naribus aliquis fertur, & interdum posteriora capitis dolent; item manibus tremunt, digitisque floccos vellit, & fasciæ e stragulis legit; urina est tenuis flammæ, interdum etiam ( quod pessimum ) tenuis albaque est.

Prognosis.

Art. 587. Phrenitis, aut brevi tempore in salutem, aut mortem, cum febre terminatur; aut diu protracta & post febrem superstes, demum vel sanatur, vel in alios morbos, nempe, lethargum, aut maniam, aut melancholiam transit, vel demum in desipientiam perpetuam, fracto, scilicet, ( quod ajunt ) cerebro.

Curatio.

Art. 582. Si phrenitis in principio febris accidat, venesectio locum habet, & enzmata sunt præcipui usus, cataplasmata pedibus admoveri debent ex foliis rut. cham. verben. rad. brion. stor. papav. errat. cum sapone; vel eorum loco columbæ vel bullidum calent discissi; pro siti restringenda bibat Palmarii potum divinum, scilicet aquam fontan. cum succo limon. & sacchar. vel emulsiones; hypnotica sunt caute usurpanda; in hoc affectu placenta rosacea vel flores papaveris cum aceto & nuc. moschat. capiti & temporibus cum fructu applicari potest.



## Boerhaavii sententia.

Art. 583. Phreniti est vel vera, ubi cerebrum vel <sup>Vera vel</sup> potius illius meninges utræque primario inflammatione <sup>sympto-</sup> efficiuntur cum delirio & febre acuta conjuncta, vel <sup>matica.</sup> *symptomatica* ex metastasi materiæ febrilis in cerebrum.

Art. 584. Phrenitis vera 3, 4, vel 7, die necat, <sup>Even-</sup> vel abit in maniam, leparum, coma, catocen; A <sup>tus.</sup> *peripneumonia* & illo lethalis; a *variolis* admodum mala.

Art. 585. Hæmorrhagiæ quandoque morbum solvunt <sup>Indica-</sup> In Phrenitide vera prodest *venæsectio* larga. Immo in <sup>tiones</sup> hoc affectu (inquit *Doleus*) arteriotomiam in tem- <sup>curati-</sup> poribus institutam commendamus. Inducuntur *diluentia* <sup>va.</sup> ex decoctis, *antiphlogisticis* & *nitrosis* affatim exhibitis, *laxantia* & *clysmata*, *capitis rasura*, *epispastica*, *cucurbitæ* in partibus inferioribus.

Art. 586. Certe in Phrenitide (inquit D. Freind) <sup>sectio</sup> quæ febribus supervenit, <sup>venæ</sup> sectionem venæ jugularis quam <sup>jugula-</sup> maxime efficacem esse expertus sum, cum alia remedia <sup>ris.</sup> minus commode responderint: neque efficacem tantummodo, sed & adeo tutam, ut valde mirer aliquid de efficiendi difficultate, nedum periculo apud scriptores inveniri: nam hæc vena, uti nullo fere labore secatur, ita & secta facillime omnium sanescit. (Frequentissime etiam in aliis capitis morbis gravioribus in praxi mea jugularem sequi.)

Art 588. Paraphrenitis est morbus *Pleuritidis* simili- <sup>Para-</sup> lis, ubi diaphragma vel saltem ejusdem margo vere <sup>phreni-</sup> inflammatur, & longe frequentior est, quam vulgo <sup>tis quic.</sup> creditur; cognoscitur ex febre continua; dolore inflammatorio in inspiratione maxime urgente; hinc respiratio sublimis; celeris, suffocativa, delirium perpetuum, convulsio, furor, gangræna, symptomata omnia atrociora quam in *Pleuritide*; & licet totum malum cognitum sit, insuperabile tamen.

## Ettmulleri sententia.

*Art. 588.* Phrenitis moderno usu vocabuli est delirium intensissimum membranarum cerebri inflammatione ortum cum febre peracuta, veteribus *Sphucelismus* seu *Sphacelus cerebri*; est malum ut plurimum lethale, 3, 4, vel 7, die interficiens Lethalem phrenitidem denuntiant dyspnœa, facies cadaverosa, sudor syncoticus, lingua & manus tremulæ, stillicidium narium, &c. si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum conqueruntur ægri, funestissimum est signum, mox enim *delirium* & *convulsiones* aderunt, quod sæpius observavi, convulsiones superveniunt, quando inflammatio cerebri incipit abire in gangrænam.

*Cura.* *Art. 589.* Cura nil habet peculiare præ cura in febre acuta cum delirio; *Tinctura papav. rhœad.* effervescentiam sanguinis compescit; item *camphora* & *nitrum*; quando ab alio morbo pendeat, curato morbo primario delirium cessat; ideoque *sudorifera* & *alexipharmaca*, sunt propinanda, in *tinctura bezoardica*, &c. In febre ardente decoctum *tamarind.* *epithemata* etiam plantis pedum conducunt.

*Acida,* *Art. 590.* Blandiora acida & cinnabarina cum emulsionibus *inter interna remedia omne tulerunt punctum* in phrenitide ex præcepto *Vvaldschmidii*.

## Septalii sententia.

*Art. 591.* Vix in Phrenitide lenienti per os assu-  
Phreni- mendo, ad deturbanda excrementa, in primis viis exi-  
tis str- stentia, prima die locus datur, sed molli clymate in-  
rim vena- jecto, si ejus etiam commoditas detur, mittendus est  
secunda. sanguis, secta in brachio vena: cum enim influxus jam  
desierit, aut majori ex parte factus sit, frustra hoc au-  
xilium revulsorium tentamus

Cave autem ne in Tralliani, & aliorum errorem incidas, qui cum ob maniacos motus sanguinem e brachio detrahere nequeant, venam frontis secant; si enim copia adsit sanguinis in laborante, ut in nujusmodi morbo majori ex parte contingit, tantum abest, ut

ut laboranti opem feras, ut potius, attracto ad laborantem partem sanguine, morbum adaugeas: revellendus igitur potius, aut scarificatis cucurbitulis, aut, quod melius esset, venis sedis apertis.

*Art. 592.* Neque etiam in hoc casu ad animi usque reliquium mittendus est sanguis, quod plerisque plagis non cuiusse video; quod, cum repellentibus frigidis ab initio etiam usi sumus, refrigerato toto, ac a capite retracto adeo multo sanguine calido, sæpenumero, aut phrenitis hæctica inducatur curatu impossibilis, aut lethargus subsequatur.

In vena frontis secunda adstrictio illa gulæ, quæ fit, aut vena intumescat, aut non multum sit violenta, aut quam brevissimo tempore perficiatur; ne quodammodo ad superna repulso sanguine, ubi ad cerebrum, & meningis pervenerit, morbum adaugeat, aut sane, eodem incrassato, magis contumacem efficiat.

*Art. 593.* Cucurbitulæ quæ bregmati, fronti, & reliquis capitis partibus post evacuatum corpus affiguntur, ad extra trahendam materiam, arentes non sint, & cum flamma, sed ex aqua calida, nec longiori tempore hæreant; & si subjacens pars in ruborem abierit, leviter eam scarificabimus; sin minus, spongiis ex aqua tepente substratum, & elevatum locum fovebimus.

*Art. 594.* Cavendum in hoc morbo, ne in eorum errorem incidamus, qui ab initio non esse purgandum censent, sed expectandam esse coctionem, maturatio magis putredinem jam factam supponit, quam corrigat; quo tempore, facto jam apostemate morbus evinci vix potest; eodem igitur vel altero die purgandum &c.

In iis qui alvo duriori sunt, rhabarbaro non ita facile utendum, si enim simul cum bile non educitur, effervescentem magis bilem reddit, facillimeque supernis partibus ob igneas partes communicari solet; & ob hanc unam causam Avic. grana quatuor, aut sex scammoniis medicamenti ex rhabarbaro indidisse in phrenitide curanda censendum est; quidquid dicant Græculi quidam, acriores Mauritanorum scriptorum reprehenses.

*Art. 595.* Quamvis in hoc omnes fere conveniant sim-



Repel-  
lentia  
aliquan-  
do adhi-  
benda.

simpliciter refrigerantibus, solisque repellentibus prima-  
tantum die esse utendum, ut repellatur influens suc-  
cus, æstus, & partis, & influentium humorum temperetur,  
dolor sedetur, & afflictae parti robur addatur, sequen-  
tibus vero diebus miscenda esse aliqua resolventia; sæ-  
piissime tamen aliter faciendum esse, quod urgeant in  
augmento adeo symptomata, æstus. dolor, vigilia, &  
mania, ut frigidissima etiam progressu temporis in u-  
m duci debeant Aretæus admonuit.

Cavendum tamen ne nimis assidue iis utamur frigi-  
dissimis; aut narcoticis; nam dicebat Aver. 3. *Col-  
lect.* 3. caput tuto calefit, at non citra pericula refri-  
gerat; periculum enim impendit; ne quem dormire  
volumus, postea excitare non possimus, ut ait Cel-  
sus: sæpe enim in lethargum calamitosum abire so-  
lent, ex sola mala curatione phrenitidis,

Externa  
qualia;

*Art.* 596. In topicis etsi acetum in aliqua portione  
admisceri expediat, ut refrigeret, repellat, & pene-  
trationem adjuvet; neque tamen multum admiscendum  
est, ne siccatione vigilias concitet; neque acrius, quod  
calidae partes, & siccae nimium praevaleant.

Neque tamen placet, quod a plerisque recipitur, ut  
aceti loco, acido citri, aut limonum utamur; nimium  
enim adstringit, & ob acerbis terrestresque partes ne-  
que pervadit, neque admixtorum penetrationem adju-  
vat: quin imo externos meatus constringendo, resolu-  
tionem humoris, aliis temporibus omnino impedit.

*Inter legendum & observandum ex  
Schomberg.*

Phreni-  
tidis vo-  
cabulum

*Art.* 597. Videtur usum apud Medicos veteres ob-  
tinuisse, ut partis affectae nomini adderent terminatio-  
nem *itis*, quando inflammatorium in primis ejusdem  
partis morbum designare volebant, uti patet in Phreni-  
tide, Hepatitide, Nephritide, &c.

Ejus or-  
tus ex  
solis ra-  
diis.

Nihil magis periculosum, quam si solis radiis ex-  
posito capite qui dormiat. Memini (inquit *Van Sw-  
vieten*) binos Messores, sanissimos certe, & robustil-  
simos, intra binarium sic periisse, dum fœni acervo  
incumbentes, nudo capite meridiano soli exposito ob-  
dormivissent.

Durum & nervosum Phreniticorum pulsum esse, monuit Galenus, quandoque etiam tremulus, undosus, & inæqualis.

Pulsus  
in ea  
quid?

*Art. 598.* Phrenitis non potest esse sine inflammatione membranarum cerebri; inflammatio autem membranarum cerebri potest esse sine delirio. Lacrymæ altero tantum oculo, vel ex utrisque; acres, paucæ, densæ, eorum angulis adhærentes, pessimi sunt ominis, tum quia minimum liquidi, tum quia argumento esse poterunt, ipsas non per secretionem naturalem effluere, sed potius villis erosis, aut lassis, adeoque corpore jam a dissolutione tendente.

Prognosis  
ex  
oculis.

*Art. 599.* Omnes homines qui dispositi sunt, ut facile incendant in Pleuritidem, & Peripneumoniam, facile Phrenitici fiunt.

Quæ  
dispo-  
nant in  
Pleuri-  
tidem.

In omnibus morbis, ubi primus impetus febris incipit habere summum turbulentum, cogitate, quod ad sit levis incipiens inflammatio, hæc si per dies aliquot porrexerit, dabit perfectam Phrenitidem.

Si videam (inquit Boerhaavius) ægram, & rogem, quomodo vales? & respondet: Quid tua refert? certi estote, quod tum intra unam horam erit ferox, hoc Medicum monere debet, ut tum adhibeat medicamenta contra Phrenitidem nondum natam.

Omnes morbi capitis qui ab inflammatione intestinorum ut causa, sunt pessimi.

Si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum conqueruntur ægri funestissimum est signum, mox enim delirium, & convulsiones aderunt; convulsiones superveniunt quando inflammatio cerebri incipit abire in gangrænam.

Ratiocinatio funditus tollitur in dementia; immittitur in stultitia; depravatur in delirio.

*Art. 600.* Tria sunt quæ phrenitidem præcedere solent. Primum est, agitatio calidorum humorum, secundum est; eorum raptus in caput; tertium, & postremum est, eorundem humorum malitia, propter quam naturæ imperio inobedientes exsunt.

Quæ  
eandem  
præce-  
dunt.

*Art. 601.* Malum si phrenitis mutetur in lethargum, non ita si lethargus in Phrenitidem.

Prognosis.

In delirio si superveniat alvi fluxus, præsertim morbo

morbo ad coctionem tendente, solvit illud: sæpiusque vidimus ægros deliros; inquietos; & anxios diarrhœ superveniente, sequente die in melius abiisse.

Alvi fluxus prodest in hoc morbo; non quod morbosam materiam evacuat solummodo; sed etiam; quod dum humoribus huc ruentibus viscerum abdominalium vasa deplentur, & sanguini impulsio minus resistunt impetus & humorum copia pulcherrime a capite avertitur, quod magni momenti est in curatione Phrenitidis. Hic morbus citissimam validissimorum remediorum applicationem requirit; cum ex sua natura adeo periculosus, & cito lethalis sit.

Maximi momenti in praxi est; ut in cura Phrenitidis symptomaticæ attendatur ad Genium morbi primarii ex quo orta fuit Phrenitis. Lingua nigra in acutis fere semper post se trahit delirium.

Febres ardentes semper habent urinas tenues, & coloratas: hinc si tales urinæ sunt albidiores; tenuioresque, & adsint vigilæ, oculorum perturbatio, lingua balbutiens; &c. prognosticare poteris brevi futurum delirium.

Si Phrenitici sint phlegmatici; furor non admodum vehemens; viresque corporis infirmæ, non est dandum *Diacodium*: nam in istis casibus semper nocet; interdum perniciofa sunt opiata.

Urinæ subjugales i. e. crassæ, & turbidæ in acutis morbis fere semper morbos capitis post se trahunt: si cum talibus urinis vigilæ sæviant, dolores capitis, lingua arida, & ardores viscerum: prognosticato adstantibus brevi delirium futurum.

Phrenitidis  
mecho-  
das cu-  
randi.

*Art. 602.* Curatio ad morbum; vigilas, & urinæ suppressionem est obvertenda. In illo venæ sectio est unicuique remedium: sed & penna ad radicem instans stellæ effigiata; intra nares immissa, ac foriter circumducta, copiosum aliquando eduxit sanguinem. Præterea hypnotica repellentibus admisceri, vel seorsim adhiberi debent. *Laudati opiati* gr. iij. in liq. convenienti, caute adhibita; ne phrenitis in veterium abeat, laudantur. Urinæ suppressio vel sponte; vel quod ægri reddere negligunt; accedere solet, & fomentis emollientibus tollitur. Habent in isto morbo usum *Lunæ potabilis Hartmanni* gr. vj. pondere, *Phar-*

*macum*



CAP. II. Phrenitis & Paraphrenitis. 223  
 macum Phantasticum Bartoletti, cujus dosis a drach.  
 . ad ij. & spiritus terræ sigillatæ. Jonstonus Med.  
 pract. lib. IV. art. 3.

## INFLAMMATIO VENTRICULI.

Art. 603. Morbum hunc cujus diagnosin omnes ferme veteres practici præteriere sub titulo acutorum morborum *Venæ Concaavæ* descripsisse Aretæum comperio. Fridericum vero Hoffmannum ex recentioribus titulo *febris stomachicæ*.

### *Aretæi sententia.*

Art. 604. Nascitur & circa venam hanc, ad quam omnia gastrica vasa spectant phlegmone, quæ & ipsa si magna sit; celeriter hominem tollit. Ignis enim acer mordaxque in ambabus cavitatibus inclusus accenditur; paucusque dumtaxat foris apparet; ut tangenti flamma tenuis esse videatur: æger vero sese comburi existimat: pulsatus arteriarum exigui sunt, creberrimi; ac veluti oppressi atque repulsi: frigus adest extremorum, satis aspera oris siccitas: facies decolor rubet: omne corpus subrubidum est: præcordia dura sunt atque revulsa: dolor in dextera parte major, & cum eo palpitatione in longitudinem ad ilia usque perveniens: quibusdam & arteria secundum dorsum inflammatur, quod pulsatio in alteris præcordiis manifestat: nam & ipsa venæ cavæ morborum particeps efficitur juxta illam in sinistro latere posita, utpote ea, quæ in omne corpus diducitur, nihil levaminis afferent neque cutim emolliente. Cutis autem sic affectorum squallida, rugosa ac aspera est: sed in partibus prominentibus atque ossibus, ut in cubitis, genibus, digitorumque articulis magis talis conspicitur. Somni tumultuosi fiunt, alvus quibusdam nihil reddit, quibusdam exiguum, acre, biliosum. Lotium acre mordaxque est. Mens utique his constat, sed quadam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur.

Art. 605. Quotquot hunc habitum viderunt, causi, Quos idest ardoris speciem appellarunt, quando quidem quæ corripit adsunt, sub ardoris genere collocarunt. Per Autu- & quando  
 annum

nam hæc labes exoritur, cum ferum quiddam & immane sapit. Viros ac juvenes occupat, quibus mala vivendi ratio laboreſque tenuem corporis habitum compararunt.

*Art. 606.* Decimoquarto die hi plerumque moriuntur. Quibus morbus diutius trahitur, duplo longiori tempore pereunt. Quotcunque autem obinitio puſillam phlegmonem habent, aut magnam paulatim remittentem, mortem quidem evadunt, ſed nondum morbo liberantur. Hi longo ſane tempore Cauſo laborant, verum omnia periculofa jam deſinunt, dolores, præcordiorum diſtentiones, & pulſum malitia, & mentis ignavia; adhuc tamen ſaſtidioſi ſunt, languentes, conſilii inopes, ſimulque & ardor, & ſicis, & linguæ oriſque ſiccitas ægrum diſcrutiant. Multum diuque trahentes ſpirant, & ſubito torum aerem una ſpiratione refrigerandi cauſa adducunt. Verumtamen ſi frigidam quamplurimam aſſatim bibunt hi brevi intervallo moleſtia levantur, poſtmodum ipsis ſitis accenditur, ruſumque uberrime aquam ingurgitant, & hæc eſt mali ſucceſſio, & reciprocatio.

De potus uſu obſervatis.

*Art. 607.* At ægregius medicus frigidam liberaliter citra noxam propinare poteſt, ut in aliis ardoribus uſuvenit, ſed longe tutius ardore a vena cava oriente laborantibus eam conceſſerit. Quodſi ventriculus aut veſcica potam aquam expellant, neque vomitione opus eſt; ſin id facere nequeant, a multa frigida epota nultum vomendum eſt. Homo enim diſrumperetur ſi tanto bibito humore nihil aut per ſudore, aut per urinam, aut per ventrem effunderet.

Pauli Æginetæ ſententia.

*Art. 608.* Verum in calidis ſtomachi intemperiebus ( Ægineta addit, ) & ardentibus cum reſolutione ejus vel anime deſectū, aut aliqua cibi fuga, nulla omnino occaſione excepta, quam feбри, aquam gelidam potui dato cum ſucco urvæ acerbæ, aut malorum cotoneorum decoctum, aut claviculæ vitis, aut ſeminis cucumeris juſ, aut pulverem ipsis ex aqua frigida. Stomacho præterea veſicam gelida aqua ſartam, aut cucurbitæ ramenta imponito. Catapotia item quæ extinguerendi ſitim potentiam habent exhibenda ſunt.

*Art. 609.* Venam itaque in cubito protinus cædito, multum-

multumque sanguinis, sed non semel totum mittito; immo & bis, & ter, alio die, quo interim vires instaurentur repetito. Deinceps cataplasmate utitor, & cucurbitulam præcordiis, ubi est arteriæ tensio, necnon, & inter scapulas, nam ibi quoque pulsationes sunt, affigito, liberiusque scarificato, & multum sanguinis detrahito. Verum & alvus præter consuetudinem valde suppressa ad lubricitatem per clysterum molliores infusionis est revocanda, acribus autem minime utitur. Extremas partes, pedes videlicet, & manus gleucino oleo, aut Sicyonio, aut ex adarce unguine excalescito, nam partes istæ in ipsis valde frigescunt. Præterea ante cibos potui dato, quæ lotium evocant, meon, assarum, absinthium, nitrum quoque inspergito, sed omnium valentissima est cucurbita, & cinnamomum, si quis ejus copiam habeat. Lac istis &imenti, & medicinæ vim præbet: etenim refrigeratione indigent: esto autem mulieris, quæ proxime peperit, & duobus lactis cyathis unus aquæ admisceatur; lac etiam bubulum optimum est, tertio loco caprinum ponitur. Oportet etiam sudores elicere. Caput sicut in ardentibus febribus irrigetur. Epithema pectori, & sinistræ mammæ, quale in syncoपा, superdetur. Cibaria concoctu facilia præbeantur. In cubile rectus decubitus, ut omnia his similia sint, quæ in ardentibus febribus fiunt. Exercitatio modica ad sudores evocandos nec non & balneum si æger interius exardescit.

*Tralliani sententia.*

*Art. 610.* Ubi stomachus inflammationem sustinuerit, magna opus est diligentia quia maximum morbum, & necessitatem corpori affert. Mixta igitur curatio in ipso potissimum tentanda est, & non, quemadmodum in minus principalibus resoluta, & laxante medendi ratione utendum. Nam periculum non, exiguum comitabitur, neque æger alimentum sentiet neque appetere id amplius poterit.

Curatio  
caute  
insti-  
tuenda.

*Art. 611.* Adjiciatur igitur una cum laxantibus, etiam corroborans aliquod, nempe absynt. paulum, aut mastichæ. Attendendum autem qua re opus sit,

Indica-  
tiones  
curati-  
væ.



atque ejus copia intendi magis debeat. Si igitur laxantia requirantur, adjicito fotui etiam chamæmelum; sin autem ægri vehementer febricitent etiam gelucinum, adipem anserinum, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & resolutio, non adeo laxantium aliquod fotui addito, sed potius curationem ex melino, & vino tentato, absynth. rosas, cenanthen, mala palmulas in vino macerans. Summatim ad id quod urget, roborantia, & laxantia, alias aliter augemus. Non solum autem fotus, sed etiam cataplasmata aliaque medicamenta usurpari debent.

### Mercurialis sententia.

viſtus ratio. *Art. 612.* In curanda ventriculi inflammatione primo viſtus ratio instituenda eſt, ut aer ſit frigidus; & quieſcat æger, maxime vero ut *Gal. 13. meth.* monet, tradenda eſt, ratio cibi & potus; nam ptifana eſt cibus omnium accommodatiſſimus, herbæ refrigerantes decoctæ, ut cichorium, lactuca, endivia, & omnia cichoriacea, panis in aqua lotus. Vinum omnino fugiendum eſt, & utendum, vel ſola hordei aqua; vel aqua cocta.

Venæ ſectio. *Art. 613.* Inſtituto viſtu prohibendum ne inflammatio augeatur, & ſtudendum ut ea, quæ facta eſt auferatur. Circa quos ſcopos multa ſunt notanda, & primo circa prohibitionem inflammationis conveniunt frictiones, cucurbitæ, venæ ſectio. Sed notandum quod quamvis dixerit *Gal.* in omni inflammatione ſanguinis miſſionem eſſe efficaciſſimum remedium; tamen in inflammatione ventriculi pauciſſime eſt evacuandus ſanguis, niſi adſuerit magna plenitudo.

Purgantia. *Art. 614.* Circa ſecundum ſcopum notandum ante hujus morbi declinationem nullum evacuans medicamentum convenire, quoniam cum hæc medicamenta trahant ab univerſo corpore ad ventriculum, facile inflammationem augent. Quod ſi aliqua conveniat evacuatio, ut *Avenzoar* monuit, ſolus clyter ſufficere poteſt.

Topica. *Art. 615.* Notandum omni tempore convenire medicamenta ſimul mixta ex adſtringentibus, & diſcutientibus, id quod docuit *Galen. loc. cit.* quare extrinſecus

secus erit componendum medicamentum ex ol. de absynth. cydon. rosat. chamomel. vino, mastice, ut scilicet materia discutiatur, simulque robur ventriculi conservetur. Intus vero accommodata est ptisana, succus cydoniorum, lac. amygdal. dulc. & amar. syrup. ros. sicc. decoct. cortic. granat. cydon. chamomel. & tandem in omnibus medicamentis tum intrinsecis, tum extrinsecis, hunc scopum habeatis, ut simul adstringatis, & discutiatis.

*Art. 616.* Desinente inflammatione poterit aliquod Ulcerene medicamentum exhiberi; ut manna, cassia, tamarind. ut simul possitis alvum solvere, nec attrahere violentem ad ventriculum. Ulcerum curatio.

*Art. 617.* Quodsi ulcus ventriculum infestet, primum studendum est, ulcus abstergere; deinde consolidare, & exsiccare, & ut summam dicam, omnia ulcera ventriculi eo modo tractanda, quo alia ulcera, illis tamen additis medicamentis, quæ etiam rubor ventriculi conservare possunt. Ulcerum curatio.

### Ettmulleri sententia.

*Art. 618.* Inflammatio stomachi est affectus periculosus; & si quis alius, peracutus, adest febris ardens, & aliqualis tumor in præcordiis; circa Ventriculi regionem dolor insignis sub costis nothis; cum gravi æstu ibidem; siti inexplibili; corporis jactatione & vigiliis; superveniunt deliria; vomitus; & non raro convulsiones lethales; raro evadunt; 3. vel 4. die finiri solet; interdum, sed raro, ad suppurationem tendit, & abscessus rumpitur, vel in Ventriculi, vel abdominis cavo; malum fere semper incurabile. Inflammatio Ventriculi.

*Art. 619.* Distinguendum est inter Ventriculi inflammationem & Hepatis: in priore ardor & dolor magis in profundo sunt, in hepate inflammatio magis circumscripta est, & mitiora urgent symptomata. Differentia inter Ventriculi & Hepatis inflammationem.

*Art. 620.* Curatio eadem est, ac in aliis inflammationibus, viz. per venesectionem, &c. Sudorifera primatum obtinent. Externa convenit cataplasma ex stercore columbino, fermento, &c. ad suppurationem promovendam ad imitationem Sennerti. Vid. Boerb. Curatio.

*Friderici Hoffmanni sententia.*Defini-  
tio.

*Art. 622.* Est igitur stomachica febris (ex inflammatione ventriculi) passio acuta, ardens, & inflammatoria, oriunda ab inflammatione nervosæ, & membranaceæ ventriculi substantiæ universum nervosarum partium systema afficiens, & ob id admodum periculosa.

signa.

*Art. 622.* Symptomata individui ipsius comites, e quibus ceu pathognomonicis signis, cognoscitur, sunt: vehemens internum incendium, summa anxietas, dolor gravi tensivus in præcordiis, maximeque scrobiculi cordis regione, sitis magna, vigilia, inquietudo, corporis jactatio, extremorum refrigeratio, pulsus subdurus contractus, & frequens, vel etiam inæqualis, spiratio difficilis, creber conatus vomendi, & doloris ad omnia assumpta, maxime irritantia, & medicamenta exacerbatio.

Diffe-  
rentia a  
morbis  
agnatis.

*Art. 623.* His etiam distinguitur ab aliis, quæ in stomachum cadunt passionibus, in cardialgico quippe dolore, sive cardiaca veterum passione, magna pariter adest circa præcordia anxietas, dolor pressorius, & acutus, usque ad dorsum pertingit, extremorum refrigeratio, assiduus ad vomendum stimulus, corporisque inquietudo adsunt, sed in ventriculi regione ardor non tam impensus est, nec tanta sitis, & linguæ ariditas, neque etiam pulsus tam celer, & contractus. Melius quoque ferre possunt ingesta, tam alimenta, quam medicamenta, spasmo potius quam inflammatione ventriculi affecti. Erosio vero stomachi, quæ sæpius biliosas febres, choleram morbum, & iracundiam excipit, caret febre, non tam subito infestat, sed successive, per intervalla tantum ingravescit, neque dolore tam ardente stipatur, & diutius trahitur. Quæ demum in intestinis consistit inflammatio, habet tormina circa umbilicum, cum crebris dejectionibus fœcum spumularum, aut leviter cruentarum, æstus quoque totam corporis superficiem cum pulsum celeritate, & magnitudine occupans major est, ac in ventriculi inflammatione ubi extrema manus, pedes, & nasus magis frigescent.

*Art.*



*Art. 624.* Pro differente causarum indole; & agendi potentia differt quodammodo inflammatio gradu. Nimirum quæ a potu frigido corpori æstuanti ingesto, item & a bile per iracundiam commota, & copiosius in duodenum effusas succitatur, mitioribus stipatur symptomatibus, non tam facile necat, diutius trahitur, & datis inter initia congruis remediis promptius obsecundat. Sævia vero & periculosiora sunt pathemata, quæ a venenis causticis, ab emeticis acrioribusque drastis inferuntur, & celeriter jugulant, nisi cito efficacia opponantur præsidia. Et omnium deterrima illa est inflammatio, quæ senibus, infirmis, scorbuticis, & diuturno mœrore confectis, item in fine acutorum morborum accidit.

Differens  
gradu.

*Art. 625.* Sed quando irrequisita est, corporis jaectatio, potus ingestus eructatur, singultuosa ventriculi, & diaphragmatis convulsio accidit, animus deficit, facies comparet Hippocratica, pulsus intermittens est, mens emovetur, & artus convelluntur, funestum eventum denunciant ex inflammatione sphacelosa facta.

Eventus  
funestus.

*Art. 626.* Quando ab assumpto veneno caustico, septico, arsenicali, vel acerrimo purgante, emetico, mercuriali, aut metallicò medicamento male præparato inflammatio accidit, non certius, non tutius, & celerioris efficaciam est auxilium, quam demulcentia, oleosa, pingua, lac scilicet, cremor ipsius, ol. amygdal. dulc. nec non olivarum, crebro, & in copia hausta. Si a bile acri corrosiva, ut in cholera, metuenda est inflammatio, tunc terrea, absorbentia fixiora, & inter hæc maxime ossa, & cornua philosophice, ut dicunt, præparata, cum decoctis gelatinosis, uti pedum vituli, & vervecis, gelatina C. C. decoct. hord. aven. cum vel sine lacte, item cum ol. amygdal. dulc. ex usu sunt. Quando porro ab iracundia vehementi obortus in ventriculo spasmus inflammationem minatur, nihil efficacius est pulvere absorbente nitroso, cum liquore anodyno alternatim dato, vel in aqua quadam antispasmodica, vel emulsione ex seminibus frigidis, aut papaveris albi. Postea composito spasmo, ad educendas biliosas sordes, accommodatissima rhabarbarina sunt, & passu-

Acrida  
monia  
biliosa,  
& caustica  
rum ob-  
tundenda.

Interna  
discuti-  
entia.

*Art. 627.* Quæ ex retropulso exanthemate imminet, vel jam induc̃ta ventriculi inflammatio est, depellitur optime emulsionibus ex semine cardui mariæ, cardui benedicti, napi, quatuor frigidis majoribus, cum pulveribus bezoardicis temperatis, quibus subinde nitrum cum momento camphoræ addendum. Itam incomparabiles effectus præstat liquor noster anodynus, cujus quatuor partes cum una spiritus bezoardici Bussii partis dosibus crebricus oblatus sudorem placidum movet. Si etiam miasma pestilentielle, aut aliorum contagiosorum morborum corpus subiit, quod primario ac celeriter vim suam putredinosam, & inflammatoriam ventriculo insinuat, illico lenissimum exhibendum emeticum, a postea subjungendi pulveres blandi diaphoretici cum nitro, & pauxillo camphoræ, vel oleum bezoardicum VVedelii ex uncia ol. amygdal. dulc. in quo drachma camphoræ soluta, ad octo vel decem gutt. dandum.

Externa  
& topi-  
ca.

*Art. 628.* Præterea exterius diro huic malo omnibus modis obviam eundum. Improbo calidiora quæ vulgo adbibentur ut sp. vin. camph. ol. destill. in sp. soluta, emplastra quoque stomachica. Ego quidem magno cum fructu multoties tepide tantum applicare jussi vesicam lacte cum flor. emollientibus, & croco decocto plenam. Neque minus admodum proficuum censeo linimentum ex ol. amygdal. unc. ij. & camph. ʒj. cum quo præcordia frequentius inungendam, & superius ponenda lintea calida. Egregium quoque ad discutiendum, & sudorem movendum est epithema ex acet. rosacei unc. ij. sp. vin. camph. ʒij. essent. croci, castor. ana ʒj. nitt. ʒ. sem, m. tepide præcordiis admovendum.

*Calmettei sententia.*

Diagno-  
sis.

*Art. 629.* Signa inflammationis stomachi diagnostica sunt, ingens dolor cum ardore, punctione, distensione, atque pulsatione conjunctus. Præterea tumor adest in ea parte, si non visu, saltem tactu conspicuus, qui si admota manu paululum prematur, ægrum ad clamores, & questum incitat. Adest quoque respiratio difficilis ob descensum diaphragmatis, & he-



& hepatis illi appensi stomachum in inspiratione comprimendum; sitis intensa, linguæ siccitas, deglutitio laboriosa, ob fauces, & guttur, & œsophagum exsiccata, & corrugata, lipothymia quandoque, dum phlogosis ad os ventriculi superius extenditur propter commercium nervorum cum corde, febris vehemens ob supradictas rationes, & interdum lypiria, dum scilicet inflammatio intensa est, in qua dum interna uri videntur, exteriora rigent, unde pulsus minutus potius, & obscurus, quam magnus & plenus in hoc affectu, aliisque internis inflammationibus plerumque plenus apparet.

Sed quod hujusce phlogoseos certiore adhuc facit diagnosin, labor est stomachi, & anxietates a sumpto alimento etiam liquido, quia dolens hoc viscus minimum onus ferre vix potest. Præterea calidum admodum sumptum jusculum vix tale a stomacho per sentitur, quia ipse magis fervet, ne quid dicam de vomitu subruento hunc affectum quandoque subsequente, aut præcedente.

*Art. 630.* Cave tamen ne hepatitidem seu hepatis stomacho incumbentis inflammationem cum dicto affectu confundas, potissimum quando ejus cava pars laborat; sed partium figura, & situs, symptomatum sævitia, quæ stomacho affecto major est, & inferius recensenda propria signa hepatitidis hos affectus ab invicem satis distinguunt, qui tamen complicari, & conjungi ob partium dictarum viciniam, & contiguitatem facile possunt.

*Art. 631.* Ventriculi phlogosis periculosissima est, & facile hepati, diaphragmati, cordi, &c. utpote vicinis communicari potest, præsertim dum illa ad superius stomachi orificium propagatur, quo tempore animi deliquia, & syncopes contingunt.

*Art. 632.* Ejus curatio ut & omnium aliarum inflammationum principio statim a venæ sectionibus inchoanda est, iterum atque iterum celebratis tum in brachiis, tum in pedibus quantum scilicet ægri vires, ætas, regio, temperamentum &c. ferre possunt, ita ut in robusto, juvenili, & sanguineo corpore, & in aliis eadem proportionem ad decem, vel duodecim phlebotomias, parcas, aut largas una, duabus, aut pluribus

Differe-  
rentia  
ab he-  
patitide.

Prognosis.

Curatio  
a phlebotomia  
inchoanda.



diebus pro necessitate institutas progredi non pudeat. Hac enim via, si qua alia, morbus efficaciter reprimatur, & causa antecedens inflammationis, seu sanguis, qui præsto est e vasis gastricis exilire, ad incipientem phlogosin aut fovendam, aut ampliandam, a parte affecta revellitur.

Obfer- *Art. 633.* Notandum tamen in hac, & quacun-  
vatio. que alia inflammatione, quod quanto magis progres-  
sus videtur affectus: & facta, ut ajunt, fluxio, tan-  
to minus necessarius sit venæ sectionum repetitus nu-  
merus, nisi eadem fluxio renovari identidem videatur.

Hyrudi- *Art. 634.* Hæmorrhoidum apertio per hyrudines,  
num ap- si æger huic evacuationi assuetus sit, aut eadem tu-  
plicatio. mentes appareant, plurimum etiam conferre poterit.  
Quod vero de cucurbitis tum siccis, tum scarificatis  
dorso, scapulis, natibusque admotis sentiunt veteres  
in hoc affectu, ut in plerisque aliis, vix a neoteri-  
cis laudatur, nisi forsan quid ob somni deficientiam  
ratione doloris excutiendum est, aut humorum in  
cerebrum metastasis derivanda, præsertim quando  
phlebotomiæ, cujus vicariæ dicuntur, locus amplius  
non est.

Remedia *Art. 635.* Præter memoratas sanguinis emissiones  
interne plurimum refrigerantia conducunt in principio, & ali-  
usur- quo modo repellentia per os usurpata, & in modica  
panda. dosi ne stomachum fatigent, assumpta; tale est ox-  
cratum dilutum, potus frigidiusculus aquæ fontanæ  
succo limonum, berberis, aut malorum granatorum  
&c. acidulatæ, vel tinct. ros. rub. succus portulac.  
lactuc. cydonior. oxalydis, aut eorum decoctum cum  
syrup. acidiusculis, refrigerantibus, & paulo adstrin-  
gentibus: juscula herbis refrigerantibus alterata, jus  
pulli seminib. frigid. & papav. alb. aliisque refrige-  
rantibus infarcti, julepi refrigerantes, acidiusculi, &  
parum adstringentes aq. ros. plantag. nymph. portu-  
lac. acetos. lactuc. &c. destillatæ. Emuls. ex sem.  
quat. frig. & semin. pap. alb. paratæ, syrup. violac.  
limon. nenuphar. de papav. alb. præsertim ubi dolor  
urgens compescendus est, ut somnus necessario conci-  
liandus, deliriumve, si adsit, sedandum. Quibus om-  
nibus merito addi debet frequens salis prunellæ usus  
refrigerandi, & reperiendi facultate pollens; spir.  
salis,

salis sulphuris, vitrioli ad gutt. aliquot, aliaque ad febrem inflammationemque compescendas aut minuentes idonea.

*Art. 636.* Interim dum hæc remedia adhibentur, non omitti debent elliteres emollientes, refrigerantes, & lenientes singulis diebus repetendi cum cassia elect. lenit. diacathol. mell. violat. crystal. miner. aliisque mitioribus purgantibus, quibus alii magis refrigerantes quam purgantes intermisceri utiliter possunt ex sero lactis, oxycrato, decoct. refriger. &c. parati. Progrediente morbo dictis remediis minus insistendum est.

*Art. 637.* Quod ad purgantia spectat ea non minus in inflammatione stomachi quam in vomitu sanguineo suspecta haberi debent, præsertim ineunte morbo, eodem vero paululum remissio commoda sunt modo sint leniora, ut tamarindorum decoctum, & infusum, cassia, manna, syrup. ros. palid. aut flor. persici in jusculo aut pauca ptisana dissolutum, rhabarb. infus. aut senna in minori dosi cum limonibus frustulatim incisis.

*Art. 638.* Exterius remedia sola, quæ institui cum aliquo fructu possunt, sunt foci regioni ventriculi admoti refrigerantes simul, & repellentes, frigidiuscule applicati, declinante vero morbo non refrigerantes, sed resolventes parandi.

*Art. 639.* Si quid sanguinis vomitu rejiciatur adauge remedia, supra dictis, sanguinis fluxum cohibentia; si lipothymix urgeant, adhibe cardiaca, & vires restaurantia sæpius memorata, parce tamen ne stomachi, aut sanguinis fervor augeatur,

*Art. 640.* Quodsi in abscessum morbus degenerat, qui ex eo dignosci potest, quod dum fit, dolorem & febrem intendit secundum Hipp. Aph. factoque dolor atque febris, perseverante tamen tumore, remittunt. Talis abscessus ob puris acrimoniam tunicas stomachi erodentem rumpitur necessario, vel in externa, vel in interna ejusdem superficie, unde ulcus subnascitur, quod cognoscitur ex iis, quæ precesserunt: inflammatione, nempe, & abscessu, aliisque supra enumeratis dolorem ejusdem partis, aut solutionem, atque dilationem efficientibus. Si in partem ventriculi concavam rumpatur, patebit magis ex vomitu sanguineo, purulento, atque secessu simul, tum ex ructibus fætidis

Clysteres.

Purgantia nisi leviora.

Remedia externa.

Et corroborantia interna.

Abscessus oborientis diagnosis.



tidis lipothymiis &c. tum ex dolore quem stomachus ab assumptis etiam lenioribus patitur; quæ symptomata minime aderunt, aut non ita urgebunt, si in superficie ejusdem externa, seu convexa ulcus excutitur, nisi forsan omnes stomachi membranas perforet. Ulcus denique ventriculi in quacunque ejusdem parte, seu regione sedem obtineat dejecta semper appetentia stipatur.

*Ejusdem* *Art. 641.* Prognosis in ulcere ventriculi funesta semper instituenda est, nisi idem perexiguum sit, & superficiem ventriculi externam occupet, ne quid dicam de febre lenta, & habituali ulcus hoc consequente, quæ cum maxima humorum discrasia, & quæ facile emendari non potest, semper conjuncta est.

*Subse-*  
*quentis*  
*ulceris*  
*curatio.* *Art. 642.* Si stomachi ulcus curationem recipere potest, hoc fiet potissimum per ea, quæ sequuntur remedia in exigua dosi, non minus ac alimenta ægrotantibus exhibenda. Ac primo quidem per usum ptisanæ ex consolidantibus, vulnerariis, & detergentibus compositæ, & melle incocto ad despumationem, aut saccharo, quæ plurimum detergunt, conditæ, aut jusculorum ex iisdem paratorum; ut rad. symphyt. maj. aristoloch. zedoar. gentian. pentaphyl. tormentill. cichor. lapat. acut. &c. fol. pimpinel. bugul. fanicul. scabios. pilosell. absinth. prunell. veronic. agrimon. chamædr. cent. min. cichor. sylvest. vinc. pervinc. &c. hord. integr. liquirit. passul. ros. rub. flor. hyperic. & bellid. minor. Cavendum tamen pro ratione ulceris ne nimium detergentia, & asperitate sua aut amaritudine partem ulceratam stimulantia majori dosi præscribantur, inde enim ulcus refricaretur, & recrudesceret; quare quandoque simplex hydromel. aut decoct. symphyt. & hordei cum sacch. rosac. aut conserva rosar. aliis preferri debent.

*Balsami-*  
*cis.* *Art. 643.* Balsamus etiam sulphuris terebinthinatus, spir. & ol. terebinth. balsm. peruvian. ad gutt. aliquot in juscul. aut potu magnis in hoc affectu extolluntur laudibus. Sed inter ea quæ conglutinant, & humorum acrimoniam ulcus soventem demulcent, commendantur præ primis: decoctum cancr. fluiat. carnis junior. animalium, mucilagin. gummi tragacant. sem. psyll. & cido-nyor. & alth. decoct. hordei aut hydromellite extractæ.

*Art.*



*Art. 644.* Balnea aut semicupia ex aqua dulci tepida, lactis usus ad plures dies, potissimum asini, hordeacea, avenacea, orizata valde diluta immo bochetum ex rad. chin. saffafr. aut falsæ parill. si febris non admodum vigeat, nec corpus valde exsiccatum videatur, internis medentur ulceribus.

*Art. 645.* Sunt qui in ulcere præsertim diuturniore, aquarum mineralium acidularum, tanquam valde detergentium, potum per plures dies commendant, sed leviores eligendæ sunt; h. e. acidulæ magis temperatæ, aut eædem si tales non sint ptisana diluendæ, nec magna copia sumendæ sunt, ne stomachum fatigent.

*Art. 646.* Cathartica quia in omnibus morbis plus minus necessaria sunt, in isto quoque affectu, ut fordes stomacho innascentes abstergantur, & quæ sanguinem inficiunt expurgentur, rarius tamen, & parca manu sunt adhibenda: qualia sunt cassia, tamarrindi, rhab. syrup. fl. persic. aut de cichor. composit. manna &c. Clysteres vero frequentius usurpari possunt.

*Art. 647.* Quibus omnibus remediis adjungenda sunt, si præsertim ulcus ad consolidationem tendat, bolus armena, terra sigillat. sanguis dracon. gumm. arabic. atque tragacant. manna thuris, amyllum sine calce paratum, conserv. rosar. cynorrhod. rad. symphyt. syrupi adstring. & ex decocto vulnerario parati, tum demum sarcocolla, lacte muliebri nutrita, ex quibus pulveres, opiata, electuaria &c. confici poterunt ad usum.

## INFLAMMATIO INTESTINORUM.

### *Hippocratis sententia.*

*Art. 648.* Si intestinum rectum inflammatum fuerit, & dolor habeat, & febris, & frequenter ad exonerandum alvum desideat, & nihil egerat, & præ inflammatione sedes exiisse videantur, & aliquando urinæ stillicidium corripiat, hic morbus fit, quum pituita ex corpore in intestinum rectum decubuerit.

*Art. 649.* Conferunt autem calida quæ pituitam ratio, atte-

attenuare ac consumere possunt, aquosamque reddere, ut non sit ardor, nec morsus aliquis in intestino. Curare itaque oportet hoc modo Ægrum in calidam aquam collocato, & trita grani enidii gr. LX. in vini hemina, & olei hemina dimidia diluito, tepefacto, & infundit. Hæc pituitam, & stercus educunt. Si vero in aquam non sedet, ova cocta in vino nigro odorato ad sedem apponito, calido quoppiam inferne subtrato, aut vesica aqua calida plena, aut lini semen tostum, molitum, tritum, pari farina, in vino odorato, & oleo ammixta cataplasmatibus modo calidissime imponito. (Post alia topica recensita deum addit) si quidem ad hæc dolore liberetur satis est; sin minus bibat peplum, meconium album appellatum, aut aliud quoddam, quod pituitam purgat. Et quamdiu durat inflammatio, eduliis levibus nutria-

Inflam- tur.

matorum *Art. 650.* Circa intestinum tenue dolores diuturni, intesti- & circa lumbos, & ad præcordia, si ægri cibus aver-  
norum santur una cum febre, his dolor internus ad caput  
prognos- progressus ipsos occidit convulsorio modo.

### *Tralliani sententia.*

*Art. 651.* Nosces colicos cruciatus (& dolores in-  
Intesti- testinorum) ex biliosis, acribus, & calidis humori-  
norum bus (atque proinde ab inflammante causa vel a jam  
inflam- facta inflammatione) concitari, quia interna morde-  
matorum ri, exiri & lancinari videantur cum febre acuta, lin-  
signa. gua arida, siti, vigiliis, & singulis diebus magna ex  
parte accessio invadit; urina sit acris, & quæ per al-  
vum excernuntur biliosa, copiosaque sunt. Ad hæc  
quod cibus calidioribus, potionibus, & medicamentis  
ægri magis irritentur.

*Art. 652.* Si colicum (& intestinale) affectum ab  
inflammatione fieri contingat, nequaquam purgatio-  
Purgan- nem præsertim inter initia, & cum illa nondum ad  
tia vi. concoctionem pervenerit exhibere audebis, alias do-  
tentur. lores, vigiliæ & tormina augentur, quibus omnibus  
incrementibus in ileosum morbum ægri incidunt. Ne-  
que enim aliud est Ileos, quam Colici affectus inten-  
sio ac incrementum. Quapropter purgatio inflamma-  
tio-

ione tentatis denda non est, venæ autem sectio adhibenda, & paulatim ex toto corpore evacuatio tentanda.

Porro si propter inflammationis magnitudinem etiam Quoracarina supprimi contingat, venam & in talo, & in su-  
 fu vena  
 teriori pedis parte secare non est alienum: sæpe enim  
 pedis  
 tum hoc nos fecissimus, & alvi, & urinæ excretio se-  
 secan-  
 quuta est. Alimento in his utendum est, cremore pti-  
 da.  
 sanæ, aut avena mediocriter, item injectione per al-  
 tum ex cremore ptisanæ, chamæmel. succo lini semi-  
 nis & hydrelæo, præsertim si etiam febris vehemens  
 urgeat. Rarum namque est Colo inflammationem su-  
 stinente, febrim non oboriri.

*Art. 654.* Quæ extrinsecus imponentur, temperata Externa  
quæ.  
 sint, nihil acre habentia; e quorum numero est, etiam  
 chamæmelinum oleum, & ex farina hordeacea, linique  
 semine epithema, nec non cerata similiter, quæ com-  
 ponuntur ex chamæmelino, cera, rosaceo, & luteis o-  
 vorum. Ponderis æqualitas fiat ejusmodi. ʒ. Ceræ  
 unc. v. chamæmelini unc. ij. sem. farinæ fabaceæ ol.  
 rosac. ana unc. ij. sem. lutea ovor. v. aut vj. succi  
 lini seminis q. s. Hoc & renibus & vescicæ inflamma-  
 tæ pulchre auxiliari potest.

*Art. 655.* Balnea continua priusquam totum corpus Balnea  
an ju-  
vent?  
 recrementis vacuatum fuerit adhibenda non sunt. Post  
 sanguinis autem evacuationem, & si dolor urgeat, bal-  
 neo ut absurdum non est. Si vero vires refragentur,  
 in alveum ægri descendant, corpus oleo chamæmelino  
 illinentes.

*Art. 656.* Vino si inflammatio adhuc fervet, & fe- vinum  
quando  
propi-  
nandum.  
 bres præpollent, abstineant, ubi concoctionis notæ ap-  
 paruerint, ut si vires imbecilles videantur, non alie-  
 num est ipsis vinum tenue, & aquosum propinare.

### *Jonstoni sententia.*

*Art. 657.* Inflammatio intestinorum est eorumdem Defectio &  
diagn.  
inflam-  
matio.  
nls in-  
testinor.  
 tumor a sanguine extra vasa in illa elapso, & putre-  
 scente exortus. Hujus signa sunt: dolor fixus, & di-  
 stendens, tumoris perceptio, ut intestina chordæ instar  
 convoluta deprehendantur, alvi suppressio, urinæ inter-  
 ceptio, febris præsentia.



Ejus  
causa. Causa in definitione exposita est. Autumno, ob tenuitatem sanguinis in primis affluit, quia æstate geniti humores tenues, & mobiles autumnī frigore inæquali in profundum corporis pelluntur.

Et cū-  
ratio. Curatio est ad aliarum inflammationum normam institienda, & quidem citò, quia malum est acutum, & sæpe in gangrænam, & sphacelum abit. In ea refrigerantia, quæ exhibeantur, absque adstrictione esse debent, a purgantibus plane abstinendum; ne locus affectus exasperetur.

Art. 658. Dividitur secundum locum & causas.

Divisio  
bifariam I. Alia est per se, de qua jam egimus. Alia ab *Enterocæle* in qua intestina statim reponi debent. Alia a *Contusione* in qua reliquis, quæ inflammationis causa adhibentur, aliquo lenientium & concoquentium addatur.

II. Alia est in tenuibus intestinis, quæ est frequentior, & in qua stomachi distentio, spiritus angustia, vomitus assidui, ut nec potus contineri queat, urgens dolor, & tormina magis ad superiora vergunt. Alia in Crassis, in qua dolor ad hypochondria magis pertingit, lumborum adest gravitas, vomitus non ita continuo durat.

### Ettmulleri sententia.

Inflam-  
matio  
intesti-  
norum. Art. 659. Accidit in herniis, ileo, & ab aliis causis. In loco inflammato tumor rotundus tactui (quandoque) percipi solet; adest vehemens dolor pulsatorius, fixus, distendens, &c. alvus occlusa, febris, vomitus, languor, &c. frequentius in *ileum lethalem* terminatur. Commendatur *omentum vervecinum*. Vide *Ideum*.

### Boerhaavii sententia.

Inflam-  
matio  
intesti-  
norum  
causa. Art. 660. Intestina maxime tenuia, & frequentissime, in suis membranis acuta inflammatione, ut ventriculus, sæpe infestantur: a causis communibus inflammationis huc delatis; vel a materia acri potus, cibi, condimenti, medicamenti, veneni, assumpta huc delata, in plicis valvulosis detenta hærente; tum etiam

tiam ab acri; putrida, fœtida materie purulenta, chorosa, gangrænosa, biliosa, atrabilaria, ex œsophago, stomacho, hepate; liene; pancreate; omento huc appellente; hærente; rodente; denique a convulsione ingente prægressa; flatus creante; motum sistente; sicque inflammationem creante.

*Art. 661.* Nata his locis; contrahit intestina; ca- Ejus si-  
ritatem claudit; transitum appulsi impedit; dolorem gna &  
acutissimum; ardentem; fluxum creat; convulsiones vio- effectus  
entas, ubi appulsis irrigatur; producit; alvum clau-  
dit; vomitum excitat ingestorum. & appulso-  
rum, citius, tardiusve post assumptionem; prout superius, vel  
profundius hæsit; flatus dolentes; tormina cum bor-  
borygmis acutissima; ileum; volvulum; abscessum, gan-  
grænam, scirrhum; cancerum; febrim acutissimam; dei-  
lilitatem ex dolore acerbissimo summam; mortem ci-  
tissimam producit.

*Art. 662.* Quando in gradu inflammatorio subsistit, Prognos-  
coloris Iliaci nomine imponit incautis, frigori, flatui, sis.  
mento, periculoso successu adscribitur, calidis tractatur,  
& carminantibus; eventum funestissimo.

Cognoscitur autem facile pro vera inflammatione  
ex febre acuta continua, siti ingente, calore magno,  
pulsu duro; dolore igneo; urina flammea, debilitate  
summa.

Si flexum Coli occupat facit *Colicum* dictum *dolorem*;  
si recti intestini ultima infestat, tum pro hæ-  
morrhoidibus cæcis haberi solet: solvitur dysenteria  
munda subcruenta biliosa.

*Art. 663.* Simul ac noscitur præsens per sua signa Cura  
tunc statim maximo molimine tentanda sanatio; quæ inflam-  
acquiritur primo missione larga, & repetita sanguinis, matione  
secundo assiduo injectu clysmatum laxantium, diluen- nis.  
tium, antiphlogisticorum, sæpe repetitorum ad ter-  
tiam, quartam, & ultra vicem uno die; tertio potu  
assiduo calido eorundem, additis prudenter opiatis,  
& iis, quæ causæ singulari compertæ adversa sunt;  
quarto fomentis ex similibus toti abdomini applica-  
tis, maxime ex junioribus, vivis, calidis, sanis,  
animalibus impositis; quinto interim caute cavendo  
ab omni acri, impetum augente, calefaciente, potu,  
cibo, medicamento, motu, animi affectu; sexto tan-

taudiu persistendo in horum usu, donec omne malum sedatum sit, nec tribus diebus redierit.

Suppu-  
ratio.

*Art. 664.* Si malo hoc prægresso nec debitis remediis curato, & ultra triduum semper cum vehementia persistente, loco doloris, ardoris distractionis, succerit horror vagus, per totum corpus sine causa, obtusus con gravitate dolor in loco, signum erit ibidem formari abscessum; unde intra 14. dies eo rupto effluet pus; quod si in cava abdominis effluit facit mala multa ex viscerum putrefactione inde sequente ut: Ascitem, & Tympanitem, unde post lentam terribilemque Tabem, & ejus symptomata mors. Si autem in cava intestinorum pus effluit facit dysenteriam purulentam magnam, parvam, longam, brevem, prout ulceris ibi facti natura dabit, inde sæpe integræ intestinorum membranæ exeunt, & sæpe tabes sequitur.

Cura sup-  
purationis.

*Art. 665.* Simul ac suppurationem adesse noscitur statim inhibendus omnis victus, unde stercus multum, durum, crassum, acre nascitur, æger pascendus solis jusculis cum leniter deterfivis radicibus incoctis, cujus modi sequens est.

*℞. Rad. scorzon. tragapog. sisari petroselin. cichor. ana unc. ij. cum jure carnis s. a. decoct. ad unc. xxx. & huic jusculo admisce vitelli ovor. num. ij. salts q. s.*

Decocta balsamica detergentia multum bibenda, & instar clysmatum injicienda ut sequitur.

*℞. Rad. valerian. hortens. unc. ij. fol. levistici man. ij. flor. hyper. man. j. agrimon. unc. ij. aq. font. ℞ij. s. decoct. de quo bibat æger. unc. ij. omni hora, & eodem etiam fiat clyisma.*

Aut aquæ fontanæ medicatæ larga copia bibendæ in his pergendum usque ad perfectam sanationem.

Gangræ-  
na.

*Art. 666.* Futuram gangrænam loco suppurationis prævidemus, si morbus habuerit causas violentissimas & gravissima produxerit symptomata, atque si simul nulla benignæ resolutionis, vel medelæ signa apparuerint. His prægressis eam fieri docent subita, & sine causa, acerrimi doloris remissio, manente pulsu debili intermittente sudore frigido, dysenteria foetida; cinericia, ichorosa, livida, nigra, sæcum sine sensu demissione; unde brevi placida mors. Malum hoc, eoque provectum raro medelam capit; curandum prius;



CAP. II. *Inflammatio intestinorum.* 241  
prius; ceterum methodus adhibita in suppuratione  
prodest.

*Art. 677.* Futurum scirrhum prænoscitur: si intesti- scit-  
norum inflammatio diu durans, nec in summam læ- rus.  
vitiem ascendens, nec resolutione, nec medicamen-  
tis, nec suppuratione soluta, relinquit in loco affe-  
cto stuporem, gravitatem, distractionemque constantem.  
Tunc enim gravia & pertinacia mala simul producit,  
qualia imprimis stupor, pondus, ventrisque incre-  
mentum assiduo aucta; hinc cavitates intestinalis an-  
gustia: fœcum ibi, & chyli stagnatio, a qua ma-  
teriei inclusæ putrefactio unde intestini occlusio, in-  
torso, & ingestorum remora, atque adeo Ictus, vol-  
vulus, vel ab acri irritante dyenteria scior, con-  
vulsio, singultus, vomitus, dolor assiduus, febris, ma-  
cies, atrophia, mors.

*Art. 668.* Medicamenta parum valent, quæcumque Cura  
idem sint: victus sit, ut dictum est, in cura sup- scirrh.  
purationis, sic fertur diu sine magno malo. Sed si per  
acria imprudenter applicata, maxime per valida pur-  
gantia scirrhus ad suppurationem, & corruptionem  
vergat, tunc cancer illic oritur, lævitque; quo casu  
potus ex solo lactis recentis sero convenit; victus ex  
pusculis avenaceis, farinosis, carnosive solis cum vi-  
tellis ovorum; clymata blandissima ex solo decocto  
seminum lini, foliorum solani officinarum, vel capi-  
tum pap. alb. injicienda; medicamenta summo opere de-  
mulcentia, anodyna, leniter opiata, non facile in acre  
transseuntia, danda.

Reliqua vero videnda sunt in Cl. Van Suavieten e-  
rudicissimo Commentario, tum etiam in hac nostra  
Synopsis sub titulis de Ileo, & Colica.

### *Farrago sententiarum.*

*Art. 669.* Intestina tam tenuia, quam crassa, quæ Intesti-  
membranosa fere tota, ex tunica prima a peritonæo, rorum  
altera musculari, cum fibris longitudinalibus, & cir- inflam-  
cularibus, nervosa, & villosa contexta, innumeris ner- matio-  
vorum, & vasorum furculis perfusa, & exquisito nes fre-  
sensu ac motu instructa, & multis & gravibus quentes

morbis patent, e quibus haud postremus inflammatorius, qui ipsis ex variis causis accidit. Nam atrocitas illa & lethalia quandoque pathemata, quæ assumpta venena, emetica validiora, & drastica purgantia excipiunt, ab inflammatione in sphacelum transeunte ortum ducunt. Vulnura ac læsiones intestinorum, non aliter quam inflammatione necant. Febres synochas, & ardentes, maxime cholericas, dysentericas, item plurimas malignas, neque minus exanthematicas, in primis variolas lethalem sæpe intestinorum inflammationem inducere uberius testatur dissectio cadaverum his morbis defunctorum. Convulsivam etiam Colicam, maximeque eam, quæ a podagra retrocedente ac subsistente ex cohibito, aut sufflamminato hæmorrhoidali fluxu; sanguine inducitur, iliacam quoque, ex hernia incarcerata, aut intestinorum convolutione, passionem, non alia ratione quam intestinorum inflammatione lethum inferre, est in comperto. Nihil quippe vitalibus motibus adeo est infensum, quam putredo, quæ excipit inflammationem, ac in nervosis exquisito motu ac sensu pollentibus partibus, consistit, *Fridericus Hoffmannus*.

*Art. 670.* Si Medici nostri temporis omnium ægrorum hypochondria statim tractarent in morbis potissimum acutis, pauciores certe committerent errores, quam non faciunt spreta hypochondriorum observatione. Qui bene noverit hypochondriorum statum, in morbis quam bene curare noverit! quam bene præfagire! Etenim diu durans meteorismus seu tumor præcordiorum dolorosus in acutis ab hæctica intestinorum intemperie, sive nimium intento fibrarum intestinalium elatere, pendet. Quantum hic nocet remediorum farrago! Quantum saccharatorum usus! Quantum purgantia intempestiva! Hypochondria dolorifica cum alvo profusa pessima. Numquam sunt in tuto, qui meteorismum, & tensionem hypochondriorum diu gerunt in acutis. A labefactato viscerum naturalium tono, a labefactatis eorundem functionibus, prostratisque facultatibus talia dependent. *Baglivius*.

*Art. 671.* In inflammatione intestinorum venæ sectio laudatur. Etio proderit in principio morbi largiter celebrata, indatur, terne simul adhibito nitro in substantia, & aliis nitra-



tratis v. g. arcan. duplic. in quibus præter vim resolventem, refrigerantem, & laxativam conjunctam habes, item Martialia, præprimis ubi in gangrænam abit inflammatio. *Jo. Langius.*

*Art. 672.* Si ex inflammatione intestini dolorem fieri contingerit, caveat Medicus, ne ullo quantumvis levi medicamento subducente utatur; ne attractis ad partem inflamatam ab illæsis partibus, calidis aut pravis humoribus; aut inflammatio augeatur; aut impedito transitu in volvulum desinat. Cassiæ tamen solius usum aliquando non respuerem in tali casu, quod miti illo blando, & humido calore sæpe inflammationem sedet, dolorem leniat, & suppurationem tumoris adjuvet. *Septalius.*

Ex inflammationis intestinis purgatio lethalis

Pleraque ad intestinorum inflammationis, & gangrænae curationem necessaria peti poterunt ex generali utriusque affectus tractatione suo loco tradenda; licet gangrænam intestinorum existimem incurabilem. *Deleboe Silvius.*

Gangræna le. thalis

## INFLAMMATIO MESENTERII.

*Riverii sententia.*

*Art. 673.* In explicandis mesenterii, pancreatis, & omenti affectibus, auctores admodum steriles sunt; & major pars illorum, peritus eos omiserunt, quod cognitu difficillimi sint, & majori parte non nisi ex dissectis cadaveribus innotescant, ut ex historiis constat a Schenchio, Sennerto aliisque collectis. Frequentissimi tamen esse consueverunt, unde Fernelius asserit, sæpe in mesenterio latere plurimorum morborum causas, ut cholerae, melancholiae, diarrhoeae, dysenteriae, cachexiae, atrophiae, languoris, lentarum, errantiumque febrium, vomitionum, dolorum colicorum, tumorum & abscessuum.

Quæ mala ab affecto mesenterio oriuntur.

*Art. 674.* At inflammatio specialiter in hoc viscere concitatur, quando sanguis in venis meseraicis cumulatus, per alicujus rami apertionem in mesenterii substantia effunditur. Ad hanc inflammationem afficiendam plurimum confert humorum congestorum acrimonia, & erosio, lapsus aut percussio

Ejus causa.



regionis hypogastricæ, hæpatis debilitas, corporis calefactio nimia, vel refrigerantium usus intempestivus; motus criticus naturæ in febribus malignis, aut variolis, diarrhœa vel dysenteria intempestive suppressa.

**Diagnosis.** *Art. 675.* Signa diagnostica sunt, febris languida, occulta, lenta, absque siti, & gravioribus symptomatibus: anorexia, tensionis, & gravitatis sensus subter ventriculum citra magnam duritiem, & quæ nonnisi pressu dignoscitur, citra dolorem etiam saltem effatu dignum, quia pars obtuso sensu donata est: egestiones chylosæ; quas plerumque ichor tenuis consequitur: sine ullo doloris sensu, modo seorsim ac sincerus, modo fœcibus permixtus.

**Differentia a similibus affectionibus.** *Art. 676.* Mitiora sunt omnia modo dicta symptomata si mesenterium solum inflammatione afficiatur: si vero una cum eo etiam hepar, liens, aut intestina tententur vehementiora sunt omnia symptomata. Speciatim vero intestina simul cum mesenterio inflammari, ostendit febris hemitritæa, quam observavit Spigelius plerumque ob harum partium inflammatione oriri. A musculorum abdominis inflammatione distinguitur, quod tumor, & dolor partes externas magis occupat, & levi tactu statim percipitur, & insignem dolorem ac febrem inferre solet. Distinguitur a tumoribus diaphragmatis qui paucissimis hæctenus Medicis innotuerunt, quia insignis perpetuo adest hic respirandi difficultas, hypocondria revulsa sunt, pulsus durus ac parvus citra omnem tumoris in hypochondriis sensum aut apparentiam.

**Prognosis.** *Art. 677.* Quod ad prognosin attinet periculosissimus est hic affectus, qui plerumque in abscessum degenerat. Sæpe etiam materia morbifica alio a natura transmittitur, non tamen plane tollitur, unde malum recrudescit, & sæpe per multos annos, immo totum vitæ tempus perseverat, nunc febre redeunte, nunc eadem in colicos dolores mutata.

**Curatio.** *Art. 678.* Curatio eadem ac hepatis lienisque inflammationis; illa igitur a suis capitibus huc erit transferenda. *Nisi resolvatur, in abscessum, gangrænam at scirrhum desinit,*

*Art. 679.* Diagnofis abfceffus Mefenterii interdum facilis eft, interdum vero difficillima. Si enim ab inflammatione ejufdem partis fiat ex fignis ut in abfceffu inteftinorum facile dignofcitur, fecus vero vix difcerni potef,

*Calmettei fententia.*

*Art. 680.* Abfceffus & ulcus mēfenterii difficilis admodum funt diagnofeos, nifi illa dictæ partis inflammatio præcefferit; quæ ultra tempus fine ægrotantis morte perfeveret, quod tamen non valde ordinarium eft, & inditium dat tumorem inflammatorium difcuti, & refolvi non putuiſſe; ſed fuiſſe ſuppuratum atque in pus converſum. Si quæ tamen reconditorum affectuum; & qui nonnifi per diſſectionem cadaverum plerifque innotuerunt Medicis, ſigna ſeu potius conjecturæ afferri poſſint: illæ ex dolore, tenſione, gravitate affectæ partis; cibi faſtidio ſine ullo calore, & febre præcedentibus; ex magna fatietate poſt paucum aſſumptum cibum; ſtomachi pondus meſenterio incumbens; ex febre lenta, & languida ſubſequentē, ex vomitu atrophia corporis, dejectionibus fœtidis chyloſis, ſanguineis; & rupto in inteſtina abſceſſu purulentis, petendæ ſunt, atque etiam ex abſentia ſignorum alias vicinas partes affectas in ſpecie designantium.

Abſceſſus meſenterii diagnofis.

*Jonſtoni fententia.*

*Art. 681.* Meſenterii inflammatio eſt ejufdem tumor, ab humoribus cum ſanguine nutriente in ſpatio ipſius effuſis, vel glandulis altius impactis; & calore externo accedente putreſcentibus exortus.

Deſignatio.

*Art. 682.* Signa ſunt: febris lenta; plerumque ſemitertiana; dolor lumborum; nunc in utraque parte, tunc in dextera, qui ſe ad anteriorem regionem ventris, ſupra & circa umbilicum extendit, alvus ſuppreſſa, egeſtiones chyloſæ, quas ut plurimum ichor tenuis, modo ſincerus, & citrinus, modo fœcibus permixtus inſequitur. Differt a doloribus ventriculi; uterinis, Colicis, & Nephriticis, ſignis in ipsis ex-

Diagnofis.

positis. A pinguedine ventris differt, quia hic manu totus comprehenditur, quod summæ cuti inhærescat, secernique a musculis abdominis potest. A musculorum abdominis tumore differt, quia is circa pressus dolore afficit, nec alvum ita remoratur.

**Curatio.** *Art. 683.* Curatio non est negligenda; periculosa nempe tum propter febrem, qua æger contabescit; tum propter putredinem, qua mesenterium corrumpitur. Extenditur vero interdum ad quadragesimum, interdum octogesimum diem; interdum per vitæ tempus durat, febre, & colicis doloribus mox redeuntibus, mox cessantibus. Purgantia vel nulla, vel lenia; nec in principio, nec plus attrahatur; sed inflammatione ad concoctionem tendente. Sed nec Cassia in curationis auspicio satis tuta.

**Mesenterii abscessus diagnosis.** *Art. 684.* Abscessus mesenterium infestantes sunt varii. Nam 1. si locum spectes vel sunt supra umbilicum, vel infra, vel circa; 2. si constitutionem, interdum mesenterium ex multis magnis scirrhis conflatum invenitur. Interdum lapilli in eo reperiuntur. Interdum infinitos habet abscessus, sine sensu, ac dolore folliculo proprio inclusos, ac gypseam, glutinosam, aut liquidam materiam continentes, Cognoscunt autem difficulter, & interdum non nisi post mortem, si tamen venter intumuit, & symptomata adsunt, nec hydropis, vel alterius alicujus affinis morbi signa præsto sunt, suspicari de illis debemus. Excluduntur autem prodigiose. Aliquando sponte ad alvum hæc saburra erumpit, & non raro facto circuitu revertitur. Aliquando inter peritonæum, & abdominis musculos copiose profusa, vel in cavitatem ventris rupto peritonæo defluit, aut per abscessum exterius erumpit &c. Aliquando ægro bene ferente id accidit. Aliquando eidem mortem accelerat.

**Morbi curatio.** *Art. 685.* De eorum curatione hæc in genere notanda. 1. Alvum semper debere esse fluidam. 2. Resolventibus materiis, sed levibus, vim aromaticam habentibus; blande strigentibus festinandum. 3. inter detergentia Symplicium Mercati ex calyce palmam obtinere. 4. Ad consolidandum Terebinthinam Cypriam quovis modo præparatam, in primis si materia peccans in lumbis ac circa renes delitescit, omnibus præferen-



CAP. II. *Inflammatio mesenterii.* 247  
 ferendam. 5. Ad citiorem abscessus maturationem bal-  
 neum æquæ dulcis frequentandum. 6. Vires etiam  
 egregie essentia Persicariæ cum oleo calchantino rubo-  
 rari. 7. Acidulas, quia facultate penetrandi, & ex-  
 terforia ulcera erodant, & temperiem pessum dent,  
 vitari debere.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 686.* Inflammationes, & tumores Mesenterii Inflammatio  
 sæpius sunt fons & origo chronicorum, & admodum Mesenterii  
 latentium morborum, & fomites mirabilium turbarum  
 ægros, & medicos vexantium. Dolores adfunt nunc  
 circa dorsum & lumbos, nunc in abdomine & circa  
 umbelicum, tormina inferentes, lenti tamen omnes  
 & diuturni, subinde cum febricula erratica, dolo-  
 res subinde per intervalla recurrunt.

*Art. 687.* Quando apostema suppuratum rumpitur, Abscessus.  
 horror insignis, interdum rigor quatit ægrum, cum  
 superveniente æstu non raro insigni, quem puris præ-  
 fertim per alvum excretio successive comitatur.

*Art. 688.* Corpus sensim emaciatur; respiratio e- Diagnos.  
 vadit difficilior; & subinde aliquid molesti, quod  
 ipsi ægri satis explicare nequeunt, in profundo abdo-  
 minis circa, & infra umbilicum persentire affirment,  
 flatulentia ægros vexare solent. Sæpe multis annis  
 affligunt hujusmodi tumores, in scirrhusos & strumo-  
 sos abeuntes.

*Art. 689.* Curantur hæc pathemata Mesenterii, Curatio  
 cum diuturniores sunt, ut alii chronici affectus ca-  
 chectici & hypochondriaci; tractandi sunt tamen  
 caute, & sine violentia. Convenit externe em-  
 pl. de cicuta cum ammoniaco, de ranis cum mer-  
 curio, &c. Interne deobstruentia, millepedes, reme-  
 dia ad strumas, &c. Apertio venarum hæmorrhoida-  
 lium per hirundines; purgantia sunt nociva, enemata  
 utilissima.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 690.* Gignitur in Mesenterio phlegmone ab- Qui  
 scessus a sanguine in eam partem a venis effuso, ibi morbi  
 que

ex phle. que putrefactum, illa autem tactu percipitur, dolorem  
 gnone infert gravem, & febrem multis gravibus symptoma-  
 mesen- tis stipatam, tamen ideo æger non cogitur decumbe-  
 terii o- re, & negotia sua relinquere.

Ab. cessu rupto pus copiosum, & album defluit ab  
 alvo, interdum mixtum fœcibus, interdum seorsum  
 cum ab. cessus vergit in colon, aut rectum intestinum.  
 Præterea in mesenterio cholerae, melancholiae, diarrh.  
 dyssenter cachex. & intermittentium febrium, alio-  
 rumque latentium morborum causæ continentur, quod  
 a Fernelio annotatum, a veteribus medicis prætermis-  
 sum miror.

Eorum  
 signa.

Art. 691. Ipsæ tamen febres, quæ ex mesenterio  
 veniunt, & nobis cum Euglivo audiunt mesentericæ  
 in duo merito genera sunt dividendæ, acutas scilicet,  
 & lentas, sive chronicas, Quare si intus ventre ar-  
 dor, dolor, cum præternaturali totius corporis æstu,  
 pulsu celeri, virium prostratione, anxietate & inquietu-  
 tudine se se prodit, in intestinis hæc consistere judi-  
 candum. Febres etiam quæ cum dolore, ardore, nec  
 non tumore immi ventris junctæ, & tandem per al-  
 vi fluxus putridos, & copiosos, vel etiam purulentos  
 solvuntur, cum magna intestinorum difficultate ex  
 Mesenterio provenire nil dubii est.

Ex mesenterio quoque, ibique stagnantibus corru-  
 ptis humoribus prodeunt hemitritæi sic dictæ sive se-  
 mitertianæ febres, quæ ex continua inflammatoria, &  
 intermittente tertiana sunt compositæ, periculi non ex-  
 pertes. Notæ hæc jam fuerunt Hippocrati, & Galeno,  
 easdemque nitide, & accurate descripsit Spigelius pe-  
 culiari libro. Discrepant tamen a nostris in eo, quod  
 quotidie circa vespere, & alternis quoque diebus,  
 levi accedente horrore ingravescendo, junctum ha-  
 beant abdominis dolorem, ventrisque tumorem, &  
 quandoque ad aliquot hebdomadas protrahantur, &  
 nonnumquam in febrem lentam, & hecticam conce-  
 dant. *Frideric. Hoffmann.*

Utiles  
 animad-  
 versio-  
 nes.

Art. 692. Dolores palpitantes circa umbilicum, in-  
 testini tenuis, aut mesenterii inflammationem indi-  
 cant, sæpe delirium movent, & in tympanitidem  
 pessimum desinunt. Qui colicos dolor fixus est in  
 ventre cum calore lancinante, pulsu duro, & siti in-  
 ten-

CAP. II. *Inflammatio mesenterii.* 249  
tensa ab Inflammatione vel Erysipelate intestinorum  
oriri timor est, & a nonnullis tamen vocatus *Colica*  
*convulsiva*. De *Corter*.

*Art. 693.* In inflammationibus hujusmodi statim mit-  
tendus est sanguis e brachio quacunque hora, dum ne-  
cessitas urget. Præter sanguinis missionem, omnia ex  
nitro hic, uti & in aliis internis inflammationibus  
uvant. Aliquando utor nitro perlato, interdum vero  
antimoniato cum hordei decoctione, vel potius deco-  
ctione rad. vel fol. scabiosæ, cujus potentes sunt vi-  
res in internis viscerum inflammationibus ad præca-  
vendum gangrænismum. Fuge nimiam remediorum co-  
piam. Si tamen ingens fuerit pravorum humorum in  
primis viis apparatus fomentis, & clysteribus minuen-  
dus. Et si hæc non fuerint satis, potio aliqua tama-  
rindata leniens danda, dummodo tamen gravis ardor,  
& extrema inflammationis rabies contrarium non re-  
quirant. Maxima opus est in hisce casibus pruden-  
tia, & cautione. Nam ut sæpe vidi liquidorum cur-  
sus in mesenterio veluti strangulatur a nimium con-  
gestis ibidem humoribus, & veluti de repente pereunt  
ægri. Pulsus tunc est parvus, & infelix, ac lethalis;  
licet reliqua salutem promittant. Nonnulli in hisce ca-  
sibus more solito chinam chinam præscribunt sed in-  
felici successu, nam hoc remedium impuro corpori da-  
re, sæpe in ægroti perniciem vertitur, præcipue in ma-  
ximo apparatu humorum in Mesenterio. *Baglivus*.

## INFLAMMATIO PANCREATIS.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 694.* Inflammatio Pancreatis est affectus per-  
quam occultus; vigilias, lypothymias, aliaque gravia  
symptomata inferens, in *abscessu* plerumque terminans.  
Interdum superveniente salutari *fluxus cruento* curan-  
tur hi morbi.

Inflam-  
matio  
Pancre-  
atis.



## Tozzi sententia.

Morbus Pancreatis ab his Me-  
fenterii distinguere difficile est.

*Art. 695.* Pari modo ac Mesenterium ipsum Pancreas quoque affici multoties compertum est: nam & obstrui, & inflammari, & obdurescere, & abscessus pati observandum est.

Horum viscerum affectiones propriis signis internoscere difficillimum. Suspiciari autem aliquando licebit de inflammatione, aut abscessu in Mesenterio, & Pancreate, postquam ad maturitatem pervenerint, & purulentæ egestionis comparere cœperint, neque jecore neque liene in humorem elato. Affecti autem Paucraetis longe difficilior conjectura erit, etiamsi a positu subter ventriculum, quis non se fallere arbitretur? Cum a diaphragmate id ipsum prodire possit; itemque a musculis lumborum, & spinæ adjacentibus.

Eorum curatio pariter difficilis.

*Art. 696.* Sicut autem ista cognitu perardua sunt, ita & curatu difficillima; nam etiamsi maturuerint, non tamen facile aut per alvum, aut per vias urinæ ibidem congesta repurgantur, quamobrem retentum pus vel corruptionem asferet, vel si alio deferatur, novum, & quidem graviolem morbum pariet, ut Colicam affectionem; Paralyfin, Ischiadem, Dysenteriam. Quin & postquam ab abscessu fuerit mundatus, etiam inductum ulcus vitæ periculum minatur, cum nequeat convenienter abstergi, & consolidari, licet opportuna remedia adhibeantur.

Remedia tamen quæ juvare possunt.

*Art. 697.* Veruntamen naturæ opera in hoc plurimum valet, illamque proinde Medicus promovere debet, exhibendo primum, qua inflammationem, si fortasse prænoscat, impedian, qualia sunt omnis generis Bezoardica, Stibium diaphoreticum, sal. volat. CC. Viperar. succin. sp. sal. armoniac. dulcis redditus, Elix. P. P. tinct. martis, & antimon. item sperm. cet. sang. hirci, mumia, coagulum leporis aut hædi, extractum hyperici, & baccar. juniperi. Potiones vulnerariæ optimæ quoque sunt, præcipuæ disrupto jam apostemate. Terebinthina pariter fructuosa est, ut & balsamum Peruvianum. Toluranum, & ligni Guajacii.

Diuretica.

*Art. 698.* Quodsi necessarium sit, inchoatum naturæ motum per vias urinæ promovere, conducent diu-

reti-

AP. II. *Inflammatio pancreatis.* 251  
 etica, atque thermæ, ocul. cancr. sal. cardui bene- quando  
 fici, & centaurii minoris, verum salis balsamum co- adhi-  
 ore aureum, sapore dulce, & contractu linguæ vola- benda,  
 tile; pulvis, & essentia macis, extractum glycyrrh.  
 Trochisci Gordonii

*Art. 699.* Si demum remaneat ulcus, suffusus ex Mercurii  
 cinnabari cum balsamis miram opem afferre consueve- rii usu  
 runt, atque horum usu quosdam brebi salutis restitu- effica-  
 tos vidi: etenim ab inducto sensim ptyalismo e ducti- cissimus  
 bus salivariis educitur humor ille, qui in pancreate,  
 & mesenterio restagnat ob communionem glandularum  
 inter se, & præcipue illarum, quæ in mesenterio  
 sunt, cum colli glandulis. Neque verendum de inter-  
 no mercurii usu; modo rite præparatus sit, & dia-  
 phoreticus evaserit.

## INFLAMMATIO HEPATIS.

### *Celsi sententia.*

*Art. 700.* Morbus jecoris modo longus modo acu- Hepati-  
 tus esse consuevit. Acuti morbi signa sunt: sub præ- tidis  
 cordiis dextra parte dolor vehemens, idemque ad la- defecti-  
 tus dextrum, & ad jugulum, humerumque partis ejus- ptio.  
 dem pervenit, eoque magis, si in gibba ejusdem parte  
 inflammatio consistat; tunc enim usque adeo dolor ve-  
 hemens est, ut æger convelli videatur, cujus nonnum-  
 quam manus quoque dextra torquetur; horror validus  
 est. Contra si in lima seu concava jecinoris parte sit  
 inflammatio plus fastidii, & nausæ oboritur, unde  
 bilis evomitur, interdum singultus prope strangulat.

Longioris vero morbi ubi suppuratio in jecinore est,  
 signa sunt: dolor modo remittens, modo intendens,  
 cum dextri præcordii duritie, & tumore, & post ci-  
 bum major difficultas est, accedit maxillarum quædam  
 resolutio ubi inveteravit malum, venter & crura pe-  
 desque intumescunt, pectus, atque humeri, circaque  
 jugulum utrumque extenuantur.

*Art. 701.* Initio sanguinem mittere optimum est, cura-  
 tum venter solvendus est: si non potest aliter per ni- rionis  
 grum veratrum, & imponenda extrinsecus cataplasma- ratio.  
 ta, primum quæ reprimant, deinde calida, quæ dedu-  
 cant.

cant, quibus recte iris vel absinthium adjicitur, post hæc malagma. Cibi potusque dandi fere qui pulmonis quoque dolori conveniunt, præterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia in hoc morbo sunt thymum, satureja, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri baccæ, pini flos, herba sanguinalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbæ jecur recens, & crudum, sed parce assumpta. Neque alienum est, absinthium contritum ex melle, & pipere, ejusque catapotium quotidie devorare: abstinendum utique est ab omnibus frigidis: neque enim res ulla magis jecur lædit. Profusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida; si æstas, tepida; item liberalis unctio, & in balneo sudor.

*Art. 702.* Si vero jecur vomica labore eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam ultra id scalpello aperiunt, ipsam vomicam adurunt. Vide Hipp. Aph. sect. VII. aph. 44. 45.

*Ettnulleri sententia .*

*Art. 703.* Inflammatio Hepatis & ejusdem abscessus vocatur alias Hepatitis. In genere percipitur in omni Hepatis inflammatione dolor obscurus & tensivus ac gravitativus in dextrâ hypochondrio & ejus profundo, qui ab suppuratione punctorius plus minus evadere solet, adest febris lenta plus minus vero acuta pro ratione gradus inflammationis; ægri fere supini jacent, præsertim si diaphragma afficiatur, & tussis arida affligit. In genere in *pleuritide* verâ omnia symptomata sunt acerbiora, in *hepatide* remissiora. Periculosum est malum, & quod sæpius ad mortem deducit ægros; aut discutitur, aut successive suppuratur, aut in *scyrrhum* degenerat; *abscessus* nunc per alvum, nunc per urinam, interdum per tussim expurgatur; *singultus* est pessimum signum.

*Caratio.* *Art. 704.* Convenit *venesectio* in pede, profunt *sudorifera*, & *antipleuritica*, *antihæcticum* Poterii, *spermaceti*, *nitrata*, *saturnina*, *camphorata* & circa finem *diuretica*: externe *epithemata penetrantia* & *discutientia*, postremo *suppurantia*, rupto abscessu *vulneraria* & *balzamica* interne.

*Art.*



*Art. 706.* Omnibus inflammationibus internis suppuratis & male curatis supervenire solet *phthisis*. De *hepatitide* præ omnibus consulatur *Boerhaave*. Phthisis sequi solet.

*Inter legendum, & observandum.*

*Art. 706.* Jecinoris inflammatio ex tumore duro, & tensione dextri hypochondrii, quæ ad umbilicum usque non raro extenditur; Æger febricitat nec in dextrum latus decumbere potest; alvi segnitie laborat, urinas reddit rubentes, &c. Signa hujus inflammationis.

*Art. 707.* Hic morbus eadem omnino ratione qua pleuritis curandus est, in primis ab initio usque vena brachii, & pedis tundi debet, atque in potum porrigenda ptisana ægro dulcificans, refrigerans & diuretica. Curandi ratio.

*Art. 708.* Aliquando inflammatio hæc suppuratione definit, unda hepatis abscessus oritur. Hujus generationem cognoscimus ex incremento doloris, tensionis, & duritie partis affectæ, tum etiam a febre, quæ crebris horroribus stipatur, quos ardentes sequuntur calores. Absoluto perfectoque pure jam hæc omnia sympto mata imminuuntur. De abscessu jecoris.

*Art. 709.* Generalibus adhibitis remediis phlebotomia videlicet, & purgatione: jecoris apostema cataplasmatibus emollientibus tractandus est ut sequitur. Remedia ad abscessum.

*℞. Medulla panis albi & recent. unc. x. lactis li-  
br. ij. coq. ad consist. emplastr. tum add. vitell. ovor.  
num. j. croc. pulv. ij. ol. ros. unc. j. m.*

Hoc vero cataplasma ad maturandum tumorem ad-  
movetur, & ubi fluctuationem exoriri digitis explo-  
rantibus percipitur, in loco abscessus perforetur ab-  
domen atque ut pus contentum facilius dimanet juben-  
dus est ægro situs corporis ad hoc obtinendum aptior.  
Deinde vulnus plurima diligentia, & cautione tractetur,  
cavendo quo minus fieri potest, ne detectum remaneat,  
quia aer semper noxius est iis partibus, quæ ab eo naturaliter non tanguntur. Cataplasma.

Si pus ad intestina usque pervenerit, quod ex alvi  
regectionibus cognoscitur, clysteres lenes, & deterfivi  
jubendi ex decoct. fol. malvæ, alth. verben. sæm. &c.  
compositi quorum ana m. j. in aqua coq. & colat. add.  
mellis unc. iij.

Si vero pus ad stomachum vergat vomitum procurato, propinando ol. amyg. dulc. cum jure tepido vel aqua.

In quotidianum potum dabitur ægro ptisana diuretica, vel aqua pura nitro medicata, qua assatim bibendo plurimum levaminis lucrabitur.

## INFLAMMATIO LIENIS.

*Tralliani sententia.*

*Art. 710.* Inflammato liene dolor cum tumore, & Inflammatio lienis. Diagnos. tensione, multaque gravitate vehementer urget, interrim obstructio membri excitatur unde scirrhum ex inflammatione plerumque contrahit, interdum etiam sine dolore augefcit, durusque efficitur, quod tactu subinde cognoscere possumus. (Sed hoc ubi contingat absque prævia inflammatione ad morbos frigidos spectat.)

Ejus signa ex humore bilioso sunt, quod totum corpus calidum est, & sine febre videtur, quæ tamen quovis tertio die exacerbatur, oculi tincti sunt. bilioso. urinæ coloratiores, acresque, aut flavæ, aut rubræ existunt, ægri sitibundi frigidam bibere appetunt, animo sunt abjectio, cito furiunt, os habent amarum, cibum fastidiunt, vigiliis torquentur, & ventrisurbatione, linguam habent flavam, atque alia id genus similia, quæ bilem testatur, sustinent.

Ex humore melancholico. Signa ex humore melancholico sunt; cutis & urina nigrior, gingivæque similes, sitis etiam & si ægri frigidam potionem assumpserint, magis cibum appetunt.

Signa ex humore pituitoso sunt; color pallidus in cute, oculis, & lingua, ægri non sitiunt sed cibos appetunt.

Hoc item scire licet, quod ex bile omni tertio die ægri febriticant, ex melancholia omni quarto, & ex pituita quotidie.

*Art. 711.* Si venæ sectio omnibus visceribus inflammationis præsentissimum est remedium, maxime certe in lienis inflammatione adhibenda est; quare venam brachii sinistri internam secabis, & cum sanguis fluit attendendum est, ne rubens valde sit; & purus, an lividus. Nam si lividus est, aut æquo rubentior, co-

copiosius aufertur debet; si purus, ac sincerus, paucior; verum sic extrahendus est, ne vitalis facultas deficiat.

Post sanguinis missionem levibus medicamentis alvus ducenda est, ut herba mercuriali, polypodio, enico, atque similibus; vel eorum loco clysteres juvant, & si in ventriculum humores influnt etiam vomitoria. Deinsomomenta adhibere convenit ex vino austero si levis affectio est, cui additur ol. omphacinum, & rosaceum, si calor urget. His adjicies, rosas, lentiscum, rubum, & simile quid adstringens, si affectio valida sit, absque calore: Quodsi frigidus sit in liene humor adijunge pulegium, & si hoc satis non proficiat: thymum, origanum, & nardinum oleum impone.

### Ettmülleri sententia.

Art. 712. In inflammatione *Lienis* eadem fere sunt symptomata in sinistro hypochondrio, ac in inflammatione *hepatis* in dextro, ideoque diagnosi, prognosis, & cura fere eadem sunt.

### Jonstoni sententia.

Art. 713. Signa inflammationis lienis sunt: tumor in sinistro hypochondrio versus anteriora quasi protuberans; & hominem quasi medium cingens, sic a renibus sinistri qui dextro elatior dolore, & inflammatione distinguitur: pulsatio & palpitatio illius lateris ob arterias, quibus abundat. Febris continua quartanæ periodum servans: Respiratio ob diaphragmatis compressionem difficilis.

Splenitidis si.

Art. 714. Cl. Van Scvvietten in comment. ad Boerhaav. aph. 958. postquam descripsit historiam cujusdam ex lienis inflammatione suppurati adjungit: Videtur autem, & Hippocrates observasse lienis suppurationem: jussit enim splenem, maximum jam, & sublatum, inuri, ut in hepatis vomica consuluerat, ad pus educendum. Et in alio loco antea ad §. 488. citato de lienosis agens monet, morbum quandoque in hydropem degenerare; & contabescere agros: quibusdam vero lienem suppurari, qui cisti sari fiunt:

Ejus suppurationis.

qui-



quibusdam etiam aurum, & magnum lienem con-  
noscere. Aretæus etiam hoc pulchre monuit dicens:  
Incrementi autem notæ sunt, febris, dolores, & hor-  
rores: multoties enim remittunt, post brevem autem  
calorem rigore, & dolore vacant, hac de causa inter-  
dum in splene abscessus latuit: rursum enim, & sen-  
su carens etiam in sanitate viscus. Exitum autem ta-  
lis morbi notavit Hippocrates: dicens: Qui lienosi dy-  
senteria corripiuntur, iis oborta longa dysenteria hydro-  
ps, aut lienteria succedit ac intereunt. Paulo post ta-  
men dicit: Lienosis dysenteria succedens, bonum: Re-  
rum materia lienem occupans per venam splenicam fa-  
cili via in hepar tendit.

### Farrago sententiarum.

*Art. 715.* Satis frequenter mentio morborum lienis  
Antiquo. apud veteres fit, ita tamen ut merito suspicari liceat,  
rum fe- quod quandoque, & morbos vicinarum partium sub  
racitas titulo lienis male affecti, descripserint. Verum minus  
in mor- frequenter quam alia viscera lienem inflammari nota-  
bis lie- vit Trallianus lib. VIII. cap. 12.  
nis.

Signa.

*Art. 716.* Præcipua signa inflammati lienis sunt,  
febris acuta continua, dolor in loco lienis, quando-  
que ad humerum, mammam & claviculam sinistri la-  
teris protensus, quare non videtur improbable, quan-  
doque sub pleuritidis nomine tractari lienis inflamma-  
tionem, cujusmodi historiam ab Antonio de Haen apud  
Batavos Hagæ comitum Medico acceptam refert Van  
Scvvietten.

Cognoscitur item hic morbus ex calore, & gravita-  
re lateris sinistri, tum etiam ex pulsationis sensu ibi-  
dem loci, difficultatem respirationis cum febre acuta  
continua.

Remedia

*Art. 717.* Eadem omnino ratione huic morbo ac he-  
patis inflammationi medetur. Externo prominenti tu-  
mori applicari debet citutæ emplastr. & si inflammatio  
in abscessum, abeat oportet eundem aperire, ulcusque  
subsequens juxta Chirurgicæ Artis præcepta curare,  
cum omnes interni abscessus a magni momenti semper ha-  
beri debeant. Boudon.

## INFLAMMATIO VESICÆ.

*Arætei sententia .*

*Art. 718.* Inflammatione urinariam vesicam tenente, urina retinetur, abdomen intumescit, dolor acutus totum ventrem occupat, vesica turgescit, decimo die luteus sudor exit; pituita vomitur primo, deinde bilis; universum corpus friget, sed pedes vehementius. Si malum vires majores acquirat, tum febres cum singultu hominem corripiunt: micant arteriæ inordinatis, frequentibus, ac pusillis motibus: rubida facies est, sitiunt, animo ancipites sunt, mens non constant, nervi contrahuntur.

Inflam-  
matio-  
nis ve-  
sicæ  
urina-  
riæ si-  
gna .

*Art. 719.* Hæc omnia faciunt, non tam vesicæ inflammatio, quam grummi sanguinis, calculus in cervicem delapsus, & ea quæ vesicam deurrunt: ut venenosa quædam, & cantharides, aut bupreste; unde tota alvus majorem vim patitur, neque longa mortis mora interponitur.

Causæ .

*Art. 720.* Acuti vesicæ morbi intra quatuordecim dies, aut paulo citius seriussve hominem perimunt; refrigeratio enim, & extinctio caloris ingenti sequitur quæ necrosis-grecis dicitur seu gangræna.

Prognosis .

*Art. 721.* Curatio ex Ægineta elegantior est: Sanguinis detractione quam primum occurrendum est, mitigatoriaque facultate præditis asperginibus, & cataplasmatibus utendum ex ruta, anetho, fœnu græco, aliæque radice. Clysteriis item mollioribus ex oleo, & papavere, & adipe anserina. Opii quoque obolus semis, cum mirrha crocoque, ac oleo sedi immittendus. Mulsa propinanda. Abstinendum a valde lotium cientibus, multaue potione, nisi acris, & biliosus humor excedat, tunc quippe copiosiori potui indulgendum. Sumatur item cucumeris, & peponis semen. Victus ratio quæ febricitantibus expedit.

Curatio .


*Inter observandum, & legendum.*

Signa, *Art. 622.* In vesicæ inflammatione dolor atque ardor in pube percipitur, atque urinæ suppressio tenesmusque tenet, atque ac febris, delirium, & vigilia.

Remedia. *Art. 723.* Hujus inflammationis curatio a phlebotomia inchoanda est, quæ sæpius etiam repeti debet; prout symptomata requirere videntur. Clysteres ex lacte injiciendi sunt, & potus jubendus ex hordei decocto, cum vel sine nitro.

Balneo quoque, vel semicupia adhibere possunt.

Perinæum vero decocto rad. & fol. malvæ, alth. parietar. capit. Papav., & fol. salicis, vel ol. aneth. chamæmell. ros. vel nymph. sæpe fovere præstat. Si urinæ suppressio diutius protrahat miæctus adjuvandus est syringa in vesicam immissa, quam non raro uecesse est aliquandiu introductam relinquere.



## C A P U T III.

*Sive Fasciculus Morborum tertius.*

### DE AFFECTIBUS CAPITIS & Nervorum in genere.

Proœmum. *Art. 724.* Clarissimus noster Sydenhamus à quodam interrogatus, quam ob rem non de morbis Capitis, æque ac de aliis, scripserat? summa modestia ac candore respondisse dicitur, *quoniam illos nondum intelleni.* Et equidem agnoscendum est scientiam nostram in hac ratione valde mancā ac imperfectam esse; utcunque tamen in hunc oceanum propemodum ignotum descendendum est, & a juventium, & lædentium contemplatione, quoquomodo possumus, cursus natura & experientia ducibus dirigendus est.



## Cheynei de natura fibræ epitome:

Art. 725. Diuturnorum morborum origines in genere sunt tres: 1. *Humorum lentor sive tenacitas*: 2. *Eorundem acor & acrimonia*. 3. *Deperdita aut saltem imminuta fibrarum tensio sive elasticitas*. Omnes nervorum morbi ab infimo oscitatione nempe; & pandiculatione ad usque summum; nempe apoplecticam dispositionem; varii tantum videntur gradus unius ejusdemque morbi. *debilitatis scilicet, aut relaxationis defectusque elasticæ facultatis partium solidarum*, quorum causæ sunt, ea quæ comitantur *lentorem & acrimoniam humorum*.

Origo  
morbo-  
rum  
chroni-  
corum

Art. 726. Morhorum Nervinorum tria sunt genera. Primum est eorum; quorum symptomata præcipuum est *facultatis sentiendi debilitas temporaria aut perpetua, vel totali ejusdem cessatio*; quam sequitur motus voluntarii suspensio; hujusmodi morbi ab humorum lentorum, & viscosorum copia nimia; tanquam causa principali oriri videntur. Multi sunt hujus generis morbi ab usque gravi apoplexiâ; qua omnium simul nervorum origo comprimitur, omniumque vibratio, ne ad animæ sentientis sedem propagetur, intercipitur, ad sensuum ingenique habetudinem, & stuporem. Huc etiam aliquatenus referenda sunt *hypochondriacorum & hystericarum deliquia & paroxysmi*. Secundum est eorum; quorum præcipuum symptomata est *motus voluntarius aut impeditus aut abolitus*; tales sunt morbi generis paralytici; a paraly: si universali usque ad segnitiem; & inexpeditum inhabilemque artuum motum, membrorumque frigiditatem; atque hi fibrarum & nervorum & præcipue muscularium debilitati, imbecillitati, aut tono amisso deberi videntur. Tertium denique eorum est, quorum præcipua symptomata sunt *spasmi, contractiones, & convulsiones musculorum*: tales sunt morbi convulsivi dicti ab epilepsia, & convulsione; hypochondriacis & hystericis paroxysmis, usque ad oscitationem, & pandiculationem: & hi in universum acriori stimulo, debentur, quorum origo est falsa quædam & erodens acrimonia fluidorum, acida præterea & sti-

Natura  
morbo-  
rum.

mulans aura, vapor, aut obstrueta perspiratio. Hæc Nervinorum morborum per genera sua distributio maxime naturalis, & latissime patens videtur. Fibrarum infirmitati indivullus comes adhæret, & pro ejus gradu minor majorve est omnium functionum animalium languor & debilitas.

Indica-  
tiones  
curati-  
væ.

Art. 727. Ex prædictis patet tres indicationes sive intentiones curativas oriri; scilicet, prima est *diluz-  
re, attenuare, eorumque lentorem tollere, & cana-  
les obstruētos aperire & mirabiles efficere*. Secunda est *humorum acrimoniam tollere, molecularum nexus dis-  
solvere, & spicula frangere*, Ultima denique & præ-  
cipua intentio est *solidis partibus tonum suum & vim  
elasticam reddere*. Huic enim ultimæ intentioni asse-  
quendæ minime allaborandum est, antequam duabus  
prioribus felicem operam tandiu dederimus quamdiu  
id postulare videtur morbi indoles. Quamdium enim  
humorum lentor aut acrimonia manet, frustra, aut si  
succedat, magno ægri damno fibræ corrugantur, &  
intenduntur, & profecto hoc monitum est maximimo-  
menti. Præmissis universalibus, primæ intentioni sa-  
tisfaciunt quæcunque particularum pondere, agilitate,  
aut quavis proprietate, succis crassis, viscidis, len-  
tis, incidendis, attenuandis & fluidis reddendis ido-  
nea inveniuntur: Talia sunt *calomelas, æthiops mi-  
neralis, cinab. antimonii & nativ. antimonium dia-  
phoreticum bezoardicum minerale & Joviale, sal Jo-  
vis, succi antiscorbutici, vina & cerevesiæ medicat.  
decoct. e lign. &c.* Inter ea primum locum tribuo *cin-  
nab. antimonii*, quæ scilicet ex omnibus una ventri-  
culo minime molesta est, nec ita facile torminibus  
intestina excruiat, aut catharsin ciet, præcipue re-  
cens & artificiose elaborata. Ipse ego maximas ejus  
vires sæpe miratus sum, cum, nullo alio medicamen-  
to simul adhibito, laudum ejus vel minima pars com-  
munis esse posset.

Art. 728. Ad finem secunda intentione propositum  
assequendum, mirabiles profecto sunt vires medica-  
mentorum *sulphureorum*; eidem etiam proposito condu-  
cunt medicamenta *absorbentia & Alcalina dicta, gum-  
mosa & volatilia*: diligenter interim cavendum est,  
ne *volatilia* intempestive nimiave copia ingerantur;  
tunc

tunc enim humoribus haud satis dilutis, eos nimia vi agitant & ardorem febrilem excitant. In gummosis insignis est incidendi, & attenuandis vis, *saponi* æmula; medicamentorum autem smegmaticorum vires in obstructionibus referendis, & itero speciatim domando satis notæ sunt. Sed cum exima calefaciendi vi polleant, nunquam adhibenda sunt antequam humores satis diluti fuerint. Ultimæ denique intentioni, quæ est fibras laxatas constringere, remissas intendere & corrugare, sequentia accomodata sunt, *cortex Peruv. cortex Eleutherii, viscus arboreus, cinnam. calam. cort. aurant. amara quæcunque, catecheu. rhabbarum torrefactum, slyptica, e ferro parata, aque chalybeatæ*; reliquis vero omnibus prestat *cortex Peruvianus*, ut a multiplici experientia per multos annos didici in omnibus laxæ fibræ morbis. *Tinduram Burgandicam* præscribere soleo.

## C E P H A L A L G I A.

## Celsi sententia.

*Art. 729.* In Capite interdum acutus; & pestifer morbus est, quem *Græci* vocant, cuius notæ sunt horto validius, nervorum resolutio; oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sicut vox suppressatur; vel sanguinis ex naribus cursus; si ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis; maxime circa tempora; vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque gravis; neque periculosa; per hominis ætatem est.

Defectio  
ptio  
morbi,

*Art. 730.* In dolore, qui acutus est; & qui supra consuetudinem intenditur; convenit *venæsectio*, sed nisi intolerabilis sit, supervacuum erit venam secare; satiusque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a *potione*; si non potest; *aquam* bibere; si postero die dolor remanet, *alvum* deducere; *sternutamenta* evocare, nihil assumere, nisi *aquam*; sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit.

Curatio



## Willisi sententia.

**Prognosis:** *Art. 731.* Si dolor capitis inveteratus, & ferre continuis fuerit ut iute suspicemur eum a tumore *phlegmonosae, erysipelato, scyrrho, abscessu*, aut *vermibus* oriri, curationis spes exigua, aut nulla superest. Si dolor capitis sit immanis, atque vertiginem, vomitionem, alioque affectus aut convulsivos aut soporosos adjunctos habuerit, frequenter in *apoplexiam lethalem, aut epilepsiam, paralyfin, cæcitatem, surditatem, &c.* Quum caput parte aliqua (inquit *Lonnius*) aut circumcirca dolet, si pus, vel aqua vel sanguis naribus, ore, aut auribus exit, scire licet malum solvi.

**Curatio.** *Art. 732.* Ad curationem hujus morbi detractio sanguinis e venis sedalibus *hirudinum* facta locum habet, item *aquæ minerales catharticae, cremor tartari* in sero lactis solutus, *vesicatoria, opiata, infusum Coffee, fol. salviae, rorismarini, &c.* instar *Theæ* e-potum. *Millepedes* quoque curandis Cephalalgiis pertinacibus opem sæpe egregiam præstant. Dolor capitis post *morbillos* aut *variolas* totidem horis a pastu accedens, præmissis universalibus, *antiscorbuticis & chalybeatis* curatur.

## Etmullerii sententia.

**Cephalgia calida.** *Art. 733.* Cephalalgia est vel calida, prout sanguis magis fervet, tunc sensus caloris præsertim circa frontem percipitur; vel frigida, cum nihil tale occurrit, sed potius frigus sentitur, aut saltem adest gravedo capitis. Ex omni Cephalalgia per consensum frequentissima est illa, quæ fit ex *stomacho*. Cephalalgia *habitualis* inveterata est difficilis curatu, terminare solet in *vertiginem; apoplexiam, epilepsiam, paralyfin, cæcitatem, surditatem, &c.* Ex omnibus dolor capitis *puitosus* est contumacissimus.

**Curatio.** *Art. 734.* Cephalalgia (juxta *Dolæum*) recte dividitur in biliosam & pituitosam; in priori casu dolor est valde acutus cum insigni ardore; particulae biliosæ acres vel salino sulphureæ in sanguine a-

## CAP. III.

## Cephalalgia.

*bundant; ideoque adhibenda est venesection, leniter purgantia, aliaque ad temperiem sanguinis alterandam, temperandamque facientia. In cephalalgia pituitosa materia peccans est crassa ac tenax, indeque dolor gravativus, adest stupor mentis, Jegnities: hæc species cathartica fortiora postulat; proficua sunt decocta lignorum, salia volatilia, cinnabarina, cephalica, potus herbæ Theæ; si malum a stomacho debilitato trahat suum ortum, tunc conviunt corroborantia, stomachica, acidulæ spadeses, &c. Ad Curam Cephalalgie in genere apprimè conducit dosis pil. cathartic. cum mercur. dulc. ℞. ℥. laudan. gr. j. hor. somni & aliquoties repetita, item decoctum e lignis cum roremarin, salia volatilia, cinnabarina nativ. succinata, camphorata, potio Theæ (Coffee.) In contumaci capitis dolore empl. de ranis cum mercurio capiti raso apponi potest.*

*Art. 735. Hemicrania ( cum dolet dimidium caput ) est gravissima species Cephalalgie: permixtis universalibus experimentum est singulare cataplasma factum ex rad. cucumeris asinini vel brion. cum verben. & absynth. &c. Hemicraniis deploratissimis ( inquit Turner ) laborantes Arteriotomia temporum aliis omnibus incassum tentatis, feliciter liberavit, idemque ab aliis præstitum novis. Si dolor capitis sit in modum hemicranie ( inquit Chesneau ) & parvum locum occupet, etiamsi adsit febris continua, nihil applicatione ranunculi præstantius inveni, universalibus præmissis dolorem ad miraculum tollit; ad hunc modum utor, derasis capillis, si sit locus pilosus, parti dolenti imponatur quodvis emplastr. adhæsum cum foramine in medio ad amplitudinem denarii, ut in applicatione Pyrotici solet fieri; deinde supra foramen applicentur folia ranunculi contusa, multo succo madata; in tenero loco, & depilato duarum horarum spatium cutem aperit, in capite vero, ubi pili nascuntur, non facile aperit, sed parte in tumorem elevata dolorem sedat. Hoc unum advertendum, ut circa oculos ponatur parva quantitate propter palpebrarum, & partium circumjacentium inflationes, qua gignit, stupendas, nullius tamen periculi.*

## Baglivi sententia.

Dolor  
capitis  
ob ni-  
mium fi-  
brarum  
sensum.

Art. 736. Sunt qui ob nimium sensum, sive fibrarum ariditatem, capitis dolore laborant; in quo casu quoniam dolor solidi vitio potius quam fluidi oritur, ad *narcotica* libentes veniendum; nam tuto applicari possunt, quoniam non aliud debent efficere, quam obtundere nimium fibrarum sensum: ter aut quater observavi dolore capitis pertinacissimos, & fere ad maniam accedentes, irritis aliis, solo *pulv. de Guttet.* ad ʒj. dato, feliciter cessisse.

## Farrago sententiarum.

Euporisi

Art. 737. *Accerrimi dolores capitis* eruperisto sanari possunt nempe strophiole aqua frigida madido collum circumdante, & cum a nativo calore incalcescit linteum pro novo permutandum, unde dolor quasi excantatus desinit, & rediens eodem stratagemate elusus fugatur; (sed temerarium est experimentum.)

Arterio-  
tomia.

Art. 738. In hoc malo *Parisiis* nihil frequentius, quam sectio arteriæ temporalis; aliquando chirurgus transversim secat, idque felicius quam ubi punctum incidit, si enim magis coeunt divisæ arteriæ partes *Trophimus Serrier. M. Homberg.* memorat exemplum *Cephalalgiae pertinacis* ac inveteratæ per combustionem accidentiam curatæ.

Remedia

Art. 739. Camphora in spiritu quolibet cephalico, & naribus attracta Cephalalgiam sedat, *Greenfield.*

Varia.

Art. 740. Succus *hederæ terrestris* naribus attractus, cephalalgiam penitus aufert; *Raii hist. plant.* videatur locus, pag. 567.

In Ge-  
phala-  
gia ha-  
bituali.

Art. 741. In cephalalgia habituali, & pertinaci pulvis *mari syriaci* est fere specificum; dos. ʒss. ut ab amico medico accepi.

Art. 742. Refert *Ruyfchius* (*Obs. Anotom & Chirurg. obs. 40.*) casum pertinacis Cephalalgiae quæ omnibus remediis incassum tentatis Setaceo Nucæ admoto demum conquievit. Quousque applicatum hoc remedium persistebat nullus dolor ægrum vexabat, sed eodem remoto mox revertebatur, quæ sane alternatio diu



Illi perseverans, evenit demum ut omnino cessaret, ægerque in valetudinis gratiam rediret.

Art. 743. Capitis dolor diversa sibi nomina sumit Nomina  
habita ratione partium capitis quas exercet. Quando quæ ca-  
totum caput tenet dicitur *Cephalalgia*, quando hujus- pitis co-  
modi dolor totum caput tenens diuturnus, & pertinax loritri-  
est *Cephalea* vocatur, si nisi dimidium capitis exercet buun-  
tura sagittali limites ponente *Hemicrania*, si nisi tur.  
pars quædam capitis inter sagittalem, & tempora-  
em futuram posita afficiatur *Ovum*, si demum nisi  
particula quædam ubivis in capite excrucietur *Clavus*  
nuncupatur.

Art. 744. Si dolor a sanguinis densitate exoriri Reme-  
videatur, qui cum per vasa meningum libere circula- dia,  
re nequeat, nec per ea Pericranii, distentis horum vaso-  
rum fibrillis sentum doloris faciat, tunc evidens est,  
quod remedia præcipi debent, quæ densitatem san-  
guinis attenuare, ejusque retardatum motum con-  
citare valeant. Hinc Lexici Medicinalis Auctor sæ-  
pe laudatus tanquam efficacissimum auxilium commen-  
datur.

℞. *Salv. majoran. chamædrios ana ℥j. beton. vel Pulvis.*  
*ejus flor. tum flor. rorismarin. stechad. ana ℥. sem.*  
*exsiccat. f. pulv. cujus quolibet mane ℥j. in cyatho*  
 *vini albi propinetur.*

Dum per dies x. vel xij. hoc remedio utitur  
eger, pro potu ordinario sequentem adhibeat Ptisa-  
nam.

℞. *Rad. chin. anc. j. sassafr. iij. coq. in aq. font. Ptisana.*  
*f. iv. usque ad tertie parti. consumpt. & colat ser-*  
*vetur usui.*

Si dolor a sanguinis effervescentia, & rarefactione  
producatur, ob quam meningum fibræ deducuntur, re-  
media sunt, quæ crasso sulphure abundant, ut inde vo-  
atilioribus sanguinis particulis firmatis nimia agitatio  
impediatur. Huc mirabiliter facit ptisana,

℞. *Rad. nymph. unc. ij. aq. font. lib. iv. bull. per Altera.*  
*poræ quadrantem, & in fine ebullit. adde sol. lactuc.*  
*pan. j. sem. anis. pug. j. opii gr. ij. in nodulo suspens.*  
*al. tartar. ℥j. tum continuata ebull. per alterum bo-*  
*re quadrant. Colet. liquos. & servetur usui.*

De hoc bibat æger ter in die cyathum mane sci-  
licet,

licet, post prandium, & vespere cubitum iturus; & continuare poterit per quinque vel sex dies.

*Art. 745.* Quoad opii, & narcoticorum usum observandum est, generalia prius præmittenda fore, puta phlebotomiam, & purgationem, quibus frustra adhibitis narcotica parva admodum dosi primo porrigentur; deinde vero sensim generosius. Quod ex opio somnus nimis diuturnus forte consequatur, tali casu acetum naribus admoveri debet, atque etiam injici.

*Art. 746.* Dantur etiam capitis dolores a lymphæ inter pericranium diffusæ acredine producti, qui nulli meliori ratione abigi possunt, quam admoto vesicante. Tum etiam quidam alii dantur continui sæpe etiam intolerabiles ab exotico quodam corpore intra cranium genito, aut fluctuante producti, quibus nisi institut cranii terebratione nullatenus subveniri potest.

Observandum est diligenter, an qui capitis dolore laborant, intestina, stomachumque impuritatibus conferta gerant; nam in iis cuncta remedia irritè præscribuntur, ni vomitorio, & purgante primæ viæ evacuentur.

Qui dolores a causâ scorbutica, aut aphrodisiaca generantur, impetendi sunt remediis specificis, & causæ corrigendæ ac subigendæ idoneis, secus enim quælibet alia remedia inutiliter cederent.

Sæpenumero tamen pertinax inveteratusque capitis dolor imminuitur porrectis ad odorandum salibus volatilibus oleosis, elix. propriet. aq. Reginæ Ungariæ, si volat. sal armoniac, aliaque spirituosâ; sed effectus diuturnus quidem non est, nec obtinetur, nisi ubi e densitate sanguinis dolor proficiscatur; nam si ab ejus tenuitate veniat, tunc austa agitatione affectus contrarius obtinetur.

Verbenæ inter specifica ad capitis dolorem celebratur, tan si decoctionis formâ intus assumatur, quam si externe applicetur.

*Art. 747.* Inter Topica sequens Epithema laudabile datur.

*℞. Sem. jusquiâm. unc. j. acet. rosat. unc. v. digestum in phiala vitr. sup. ciner. calid. dein infillitur v. sponsia applicetur fronti.*

Aliis arridet magis locum dolocis vin. spir. camphorato

to sæpe humectare, alii vero fronti applicare hederæ terrestres cum aceto contusa folia. Nonnulli itemstantur ipsius hederæ succum naribus attractum pernacissimas hemicranias sanare,

*Turnerus* affirmat felicissime hemicraniam curasse sena arteria temporali, postquam incassum omnia alia media adhibuerit, atque adjicit ab aliis Chirurgis fidignis accepisse, eosdem arteriotomiam pro tali morbo optimo cum successu celebrasse.

Si capitis dolor similis est hemicraniæ, ait *Chefneau*, ac nisi parvam capitis partem occupet, tunc utut felis urgeat, præstantius non inveniri remedium, quam æmullis generalibus rannunculi folia sequenti ratione movere. Loci affecti cutis navacula depilatur, si pilus locus est, tum adhærens emplastrum extenditur, cujus medio foramen satis latum adsit, quemadmodum in causticorum applicatione usuvenit, quod foramen foliis contusis, & proprio succo imbibitis repletur. Bihorii tempore in loco non piloso, & satis molcutis dehiscit, in capilloso vero cutis integra manet, sed tumor elevatur, quo mediante dolor simul quiescit. Cavendum ne remedium hoc nisi parva admodum dosi locis prope oculos admoveatur; Extraordinariis intumescencias in palpebris locisque propinquoibus excitat, si paulo majori dosi applicatur.

## V I G I L I Æ N I M I Æ.

Seu Pervigilium,

*Inter legendum & ex Observatione.*

*Art. 748.* Interdum est morbus solitarius sine alia Vigilia  
idente ægritudine; ita tamen ut nonnulli istud sine nimia.  
molestia singulari ferant: alii vero mox languorem &  
appetitum prostratum inde percipiunt, ab alio morbo  
are semper pendet.

*Art. 749.* Quod caret alterna requie durabile non est. Progno-

*Art. 750.* Melancholici, maniacy, & simile præ fis.  
iis molestissima patiuntur pervigilia, ita ut quidam Quibus.  
melancholicus per quatuordecim mentes fuerit vigil & potissi.  
asomnis; & tales, utut per longum tempus in conti- mam ac-  
cident, ciant,  
nuis



nuis sint vigiliis, hoc malum tamen sine insigni virium debilitate perferunt.

**Senum vigiliæ.** *Art. 751.* In senum Vigiliis non anodyna sed confortantia & aromatica, analeptica ex vino dulci, & sunt optima.

**Somnus quid & ejus commoda.** *Art. 752.* Somnus naturalis est status corporis, in quo imminutus est spirituum influxus in organa externo, nepe respectu motus eorum in vigiliis, non tamen penitus abolitus est. In somno omnes secretiones, excepto sudore vel insensibili perspiratione, minuuntur. Somnus moderatus ad sanitatem plurimum confert, coctione perficiendo, & vires redintegrando.

**Curatio pervigilii.** *Art. 753.* Si vigiliæ in bona valetudine, aut in morbis chronicis, ab animi angore, a labore, a studiis vel a crapula exoriantur, omnes hujusmodi causæ removendæ sunt, tunc somnus conciliabitur. Quod si a interna quadam dispositione producantur emulsionum ope somnus invitandus est, qui si non accedat, adhibebuntur pilulæ Styracis, quarum dosis a gr. vj. usque ad xvij. vel dictæ de Cynoglossa, quarum dosis a granis viij. ad gr. xx. vel etiam Laudanum liquidum Sydenhami cujus dosi a gutt. x. usque ad xx. vel aliud Laudanum liquidum cujus compositio hujusmodi.

**Laudanum liquidum.** *℞. Caryophyll. cinamom, macis ana ℥ sem. sal. tartar. ℥ij. extr. opii frustulatum incisi unc. vj. vin. hypan. ℔vi. infund. per sex dies in vase probe clauso, & filtrato liquore relinquitur ad subsidendum Eodem demum decantato servetur usui. Dosis est gutt. xx. vel xxx. cum vino, aqua, aut alio liquore propinandum.*

Hujusmodi Laudanum ex facilioribus paratu est, jusque compositio probe comparata atque concinna videtur, ideo hic tradere non dubitavimus. Pluribus quidem in Xenodochiis Angliæ magni usus est. Qui vegetantam eius copiam sibi comparare non amant proportionaliter imminutis componentibus parcius manum peri admovere possunt.

**Epithema.** *Art. 754.* Ad conciliandum somnum hoc habet medium Reulandus.

*℞. Aq. rosar. unc. viij. opii gr. j. croci gr. xl. in quo imbibito strophiole temporibus applicabitur.*

*Art.*

Art. 755. Inter Soporifera clysteres quoque recenseri debent, ex decoctione fol. nenuphar. lactucæ C. &c. in qua opium a gr. iij. usque ad gr. vj. dissolvitur.

Cavendum tamen ne opium aliaque narcotica senis temere præscribantur, ut eosdem in somnum disponamus, nec hisce remediis utendum est, ubi morborum Crises iminent.

Art. 756. Quibusdam ad conciliandum somnum ardent lotiones quædam cujusmodi est quæ sequitur.

℞. Fol. vitis, salicis, nenuphar, chamæmel. ana. van. j. capita pap. alb. num. iv. cum toto, aq. font. s. f. decoctio, qua, facies, tempora, manus, pedesque abluantur atque lintels eadem madefactis ac imbutis obvolvuntur.

Art. 757. Ad somnum incitandum sequentis ptisanæ usum laudat Van der Linden.

℞. Capit. papav. alb. num. ij. hord. integr. man. glycyrrhiz. unc. sem. aq. commun. lib. ij. ebull. ad consumpt. quartæ partis, & colat. sit pro potu ordinario.

Art. 758. Quidam eadem de causa clysteribus utuntur ex cortic. rad, mandragoræ capit. pap. alb. & semin. aneth. lacte coctis. Hujusmodi decoctio congrua quidem videtur ad usum enematis, sed prudenter eadem adhibenda est, quod dictum etiam de narcoticis omnibus generaliter intelligimus.

## M O R B I S O P O R O S I.

*Inter legendum & ex Observatione.*

Art. 759. Coma seu cataphora, lethargus, & carus sunt affectus soporosi secundum magis & minus, potius soporosis quam essentialiter a se invicem discrepantes; in hoc si conveniunt, quod soporem morbificum inducant, fiunt ut plurimum ab una eademque causa, nimirum pituita in cerebeo collecta.

Art. 760. Coma est somnus profundus, a quo tamen æger excitatur, & oculos aperit, & respondet, iterumque mox profunde obdormit.

Art 761. Lethargus comati similis est, sed cum febre &

Denar.  
cotico.  
rum  
usu.  
Lava-  
crum.

Ptisana

Clyste.  
& res.

Morbi

Coma.

Lethar-  
gus.

& delirio conjunctus: lethargici (inquit *Aurelianus*) leviter sunt excitandi suis nominibus exclamati; etenim jugiter titillatu; vel impressione forti ac punctationibus hoc facere, nihil aliud erit, quam stricturam asperare ob inquietudinem vexationis; blande articulorum fricamento utendum est, linguæ asperitatem vel ariditatem *spongia infusa aqua calida* humectemus, &c.

**Carus:** *Art. 762.* Carus est somnus adhuc profuodior sine febre, ex quo æger excitatus oculos vix aperit, & non respondent, attamen vellicatus sentit integra manente respiratione; est proximus ad *apoplexiam* gradus.

**Curatio horum affectus:** *Art. 763.* Ex his affectibus, eorum cura; qui a febre pendent; & sunt ejusdem symptomata, in capite de febribus recensetur; & reliqui, qui febre carent, tanquam leves *apoplexiæ* gradus spectari possunt. Ubi morbi soporosi aliis morbis, febribus; &c. superveniunt, non temere secunda est *vena*, sed *purgatio* instituenda, & quidem in his casibus medicus magni nomini. D. *Radcliff. resin. Jalap.* ꝑj. ausus est exhibere successu mirabili. In caro, lethargo, aliisque soporosis morbis *acetum naribus insufflatum* plus excitat quam spiritus quilibet volatilisissimus Alkalinus.

**Coma vigil.** *Art. 764.* Coma vigil est, quando adest quoad exterioria sensuum organa somnolentia summa, quoad interna perpetuæ vigiliæ; æger clausis oculis permanet, & somnum capere videtur, attamen dormire nequit, variis imaginibus & deliramentis impeditur; raro est morbus *solitarius*, sed potius *symptoma* febricitantium; siquum esse solet imminētis *Phrenitidis*.

## V E R T I G O.

### *Æginetæ sententia.*

**Vertiginis causa.** *Art. 765.* Accidit affectio vertiginosa *primigenia*, seu *essentialis* quando gelidus glutinosusque humor cerebrum occupat: unde ea correpti, etiam levi de causa facile concidunt, ut si quando extrinsecus circumagi aliqua, v. gr. rotas, vortices turbines conspexerint, vel si ipsi quoque in gyrum vertantur: interdum



terdum veto quando capite incalescunt ex copia sanguinis in eo delati commotisq; in eo humoribus, atque etiam spiritu. Nonnumquam vero coarctatis in angustum cerebri cavernis; perforatu cranii rupti, ex quibus sane vehementissimi cruciatus oriuntur.

Præcedit autem primigeniam affectionem capitis dolor violentus, carus, sopores, & sibila aurium. Læduntur nonnulli quidem odoratu, aliqui vero gustu.

Quibus vero per consensum oris ventriculi vertigo accidit, cardiagmus hos, & nausea consequuntur. Hæc autem vertigo ex stomacho *sympatica* dicitur.

*Art. 766. Modum quo fit vertigo ceteris veteribus, & recentioribus quibuscumque primus omnium explicavit Pitcarnius. Cujus verba hæc sunt:*

Ejus  
explicatio.

*Dixi in descriptione morbi hujus, cum esse apparentem rerum prorsus immotarum motum circularem; unde patet, res visas eundem semper locum servare. Igitur cum motus iste circularis verus non sit, atque visus sit, nec in rebus ipsis, vel objectis, nec in spiritibus animalibus; querendus erit in nervo optico, aut oculo, aut in alio quopiam intra oculum condito, sive canali, sive liquore.*

*Et patet, objectum videri debere circulariter motum, si imagines, quæ ab eo veniunt, incidant in diversas retinæ partes successive, v. gr. sinistrorsum progrediendo; dum objectum revera est immotum, & imagines ab eo emanantes eandem semper representant distantiam, illud, inquam, videbitur per dextram a sinistra in gyrum moveri. Hoc autem fieri potest, objecto immoto, oculoque solo moto.*

*Art. 767. Vertiginosi in accessione quidam concinnis odoramentis, frictionibus, ac aliis consimilibus concitandi sunt. In relaxatione vero discutiendæ affectionis grâta, sanguis ante omnia detrahendus, deinde hiera purgandum. Interposito temporis spatii clystere acriori utendum, ex centaurii, aut colocyntides decocto.*

Curatio.

Post hujusmodi inanitiones caput cucurbitulis occipitio adglutinati incisa cute scalpello laniabitur; post hæc apophlegmatismis, & sternutamentis utendum.

Quos

Quos vero calor capitis, & aurium tinnitus molestat; veluti quando vapores calidi per arteria ascendant, etiam arteriarum post aures incisio adhibenda est. *En quousque veterum præcepta monitaque nos cum nostris Theoriis desipimus!*

*Vvilisii sententia.*

Vertigo.

*Art. 768.* Vertigo est affectio, in qua objecta visibilia circumrotari videntur, sentiuntque affecti perturbationem seu confusionem spirituum animalium in cerebro, ut nervos non rite influant; quare facultates visivæ & locomotivæ sæpe aliquatenus vacillant, ut laborantes corruant, & non raro a tenebris obfuscentur.

Prognosis.

*Art. 769.* Quoad morbi hujus sedem notabile discrimen occurrit, frequenter enim *antefius* consita est, & vix omnino *caduca* est, & therapiam admittit; quandoque autem *posterius* orta longe periculosior existit, & non raro in *apoplexiam* vel *paralysin*, aut in morbum *convulsivum* transit,

Curatio singularis.

*Art. 770.* Pro Vertiginoso post alia incassum tentata hunc in modum præscripsi; *℞. pulv. rad. pæon. mar. ℥ij. flor. ejusd. ℥. sterc. pavonis albiss. ꝑ. sacchar. albisc. ℥ij. dos. circiter coch. j. bis in die susperbibendo haust. decoct. salviæ aut rorismarini, Coffee tinctura imprægnati*; vix credibile est quantum ab hoc remedio juvamen recepit, post mensem sanus evasit.

*Ettmulleri sententia.*

Tres gradus hujus morbi.

*Art. 771.* Verigo a vertendo; omnia enim in hoc affectu circumrotari videntur; attamen non semper ad est talis circumgyratio; sufficit enim motus *tremulus* & *undulatorius*. Tres sunt gradus, 1. *vertigo simplex*, quando sit saltim circumgyratio subito evanescent. 2. *Vertigo tenebricosa* seu *scotomia*, quando oculi caligine obscurantur, aut apparent coram oculis varii colores. 3. *Vertigo caduca*, quando æger protinus concidit, atque hæc ad *epilepsiam* quam proxime accedit.

*Art. 772.* Dum res externæ gyrari videntur, hoc fit in

fit in oculo non in cerebro, non enim in cerebro videmus. (de *Ætiologia* hujus morbi ex tunicae retinae dimotione videatur *Bellini*) vertigo gravior & diuturnior ut plurimum in senibus *apoplexiam*, in junioribus *epilepsiam* prænuntiat; modo *anteriorem*, modo *posteriorem* capitis partem affligit, illa est curabilior, hæc periculosior.

*Art. 773.* Vertigo frequenter fit per *consensum* a Curatio vitio stomachi, vel primarum viarum; in hoc casu convenit *vomitorium*; remedia *stomachica specifica*, *antileptica*, &c. Pro cathartico *extractum hellebori nigri* & *mercurius dulcis*; convenit *venesectio* in plethoricis; *sternutatoria* sunt præcipue vitanda. Præmissis ergo præmittendis, ad *stomachica* & *specifica* deveniendum est, *semen synap.* omni mane comestum est egregium, item *aromatico*, *confectio alkerim.* *cinnab.* *antimon.* *radix pæon.* *flores lilior.* *convul.* *salvia*, *rosmarinus*, *stercus pavonis* est specificum nobile; *cinnab. nativ.* *spiritus* & *salia volat.* *succinat.* &c. laudantur.

### *Mayernii sententia.*

*Art. 774.* Methodus medendi in vertigine hoc modo se habet; si adsit plethora, sanguis mittendus est; post *venesectionem*, (si necessaria sit) præsentibus nauſea vel appetitu prostrato, vel aliis affectu ventriculi indiciis *emeticum* propinandum est, deinde *purgatio* per sedem instituenda, & postea *specifica* exhibenda. *Calamus aromaticus* quocunque modo sumptus ad vertiginem valet, imo pro secreto habetur. Medicus quidam *Germanus* multos curavit pil. seque t. per plures dies exhibitis, (si recte conjecturam faciam *vide locum*) *M. Sacchar. saturn. q. v. tereb. Cypr. q. s. f. pil.* dosis una gr. iv. vel v. pendens. *D. Glisson.* Cantabrigienſis medicinæ professor, gravi vertigine per tres septimanas conflictatus, irritis aliis remediis veritici raso apposuit empl. ex *flor. sulph.* & *alb. ovorum*, a quo sanatus est, ut ipse retulit *D. Bate.* *Pyroticum* vel *setaceum* applicetur posteriori collo, *cauterium* bregmati post omnia. *Electuarium epileptic.* *Batean. elect.* *Peruv. epileptic.* *Fulleri.*



*Farrago Sententiarum.*

**Monita** *Art. 775.* Periculosior est vertigo idiopathica ex vi-quædamtio cerebri, quam sympathica; quæ ex alterius corporis partis infra caput positæ lesione oritur.

Magna est hujus affectionis cum Epiplesia cognatio; facilisque in eam transitus; non obscurè tamen ab ea differt cum materia; tum symptomatis; in hac vero convulsio est; in illa neutiquam.

Vomitoria in Vertigine sæpius prodesse constat; cumque Vertiginosi non raro sponte vomant; hinc opinio inolevit Morbi causam fere semper in ventriculo latere, quod secus est: Emetica autem juvant; quia maxima humorum a cerebro fit revulsio; & spiritus in eo tumultuantes quamprimum coercentur.

In incremento mali membra hominis resolvuntur; isque humi reptat; nausea fit, & vomitu aut pituitæ, aut flavæ arræve bilis; Flavæ, bili succedit *insania*; atræ Melancholia; pituitæ Epiplesia.

**Curatio-**  
**nis ratio**  
**in Ver-**  
**tigine.**

*Art. 776.* Vertigo non raro futuram Apoplexiam antevertit; quare nec negligenda est nec usus remedium, quæ tantum malum præcavere possunt. posthabendus. *Vide quæ dicuntur in Titulo Apoplexiæ.* Aliquando cum hypochondriacis conjungitur passionibus, quo casu ad congrua remedia confugiendum est. *Vide Tit. affect. Hypochond.*

Quodsi nulli harum caularum vertiginis origo tribui possit, inter Cephalica remedia, ea quærenda sunt quæ eidem obsistere valeant. Priusquam vero eis manus admoveatur quando Vertigo insignis est, & ægr habitu plethoricus, prætereunda non est sectio venæ in brachio, & pede, vel etiam venæ jugularis, dein Emeticum præscribitur, & post aliquot dies purgans ali-quod pharmacum. His præmissis ad tollendas obstructions sequentia usurpari possunt remedia.

**Pulvis.** *℞. Calyb. limat. subtilis. pulv. omnique cuprø expertes unc. sem. Cass. lign. pulv. unc. j. & sem. sacchar. fin. pulv. unc. ii. misc. de quo ter in die assumantur gr. xxx. cum apto vehiculo; & per quinque vel sex hebdomadas in ejus usu continetur.*

Jejuno stomacho prima dosis mane arripitur, postquam

quam jubetur incessus, vel ad consueta munera ob-  
eunda æger ablegatur, altera dosis tertia hora post  
prandium sumitur; ultimâ vero dosis trihorio post  
cœnam. Deinde curatio hoc altero remedio persol-  
vitur.

4. *Anagallid: flor: rubr: Hyperic: ana man. j. aq.* [Decotio  
comun. lib. ij. sem: ebul. per horæ quadrantem; & co-  
latur. quotidie mane hauriatur per dies x. vel xij. Hoc  
verò remedium in Convulsionibus quoque præstat.

Art. 777. Si vertigo Apoplexiam mihiatur D. Sch-  
mitz semina Carvi vino macerata deinde exsiccata tamquam  
optimum præservativum plurimum com-  
mendat; cujus dimidium cochleare ægro cubitum ite-  
ro quotidie exhibetur, ut eadẽ semina aliquandiu  
masticata deglutiat.

Præser-  
vativum  
ad Apo-  
plexiam

## A P O P L E X I A.

Art. 778. *Apoplexia est repentina suspensio omnis  
sensationis; & privatio motus totius corporis; ex-  
cepto cordis & pectoris; quæ frequentius motu solito  
fortiori ac violentiori aguntur.*

Defini-  
tio.

### Cæli Aureliani sententia.

Art. 779. Apoplexia ita dicitur; quod tanquam ex  
lethali percussu repentinum faciat casum. Signa præ-  
sagientia aliquando nulla; interdum vero gravedo, vel  
dolor capitis, aut vertigo, aut aurium tinnitus, inæ-  
solitos usus difficilis motus; vultus inæstitudo; saltus  
membrorum, præcipue labrorum; tremula locutio;  
oblivio mos dictorum; vultus plenitudo; sed hæc  
symptomata sunt etiam communia in epilepsiam vel  
maniam venturis. Torpores & stupores (inquit  
Hippocrates coac.) præter consuetudinem advenien-  
tes; futuram apoplexiam vel paralyin denun-  
tiant.

Apople-  
xia signa  
inæst  
sagien-  
tia

Art. 780. In paroxysmo ægri voce privantur; men-  
te capiti repente cadunt; immoti; respiratione & pul-  
su tantum supersistibus; color plumbeus; atque involun-  
taria illacrymatio; crescente morbo, vultus addu-  
ctio, ita ut longior nota videatur imago, præcordio-

Paroxy-  
smus.



rum prominentia, & totius corporis frigidus torpor, pectoris stridor, & superiorum partium sudores frigidi.

*Boerhaavii Sententia.*

*Art. 781.* Causæ Apoplexiæ frequentiores sunt, 1. Causæ Polyposæ sanguinis concretiones. 2. Spissitudo inflammatoria cruoris. 3. Crassa, glutinosa, pituitosa, iners totius sanguinis natura. 4. Simplex plethora a quacunque causa. 5. Tumores intra cranium nari ( quibus addi possunt sanguinis vel feri extravasationes ex contusionibus vel concussionibus vi externa impressis, & innumeræ aliæ causæ latentes. )

Divisio  
apople-  
xiæ.

*Art. 782.* Divisio apoplexiæ in sanguineam, & pituitosam est utilis; sed non perfecta divisio quum & serosa, & atrabilaria, & polyposa sit, & alia.

Prognosis.

*Art. 783.* Lenis Apoplexia solvitur superveniente sudore multo, calido, æquabili; urina multa, crassa; hæmorrhoidum, mensium vel alvi fluxu, vel febre magna. Paulo gravior solet mutari in paralyin alicujus partis musculosæ; totius lateris unius, unde emiplegia; vel omnium partium infra caput; unde paraplegia, quæ raro curatur, semperque memoriæ, judicii motuumque lesiones relinquit. Exquisita apoplexia in mortem cito finitur, raro septimum diem excurrens.

Curatio  
varia.

*Art. 784.* Curatio varianda est pro ratione causarum; si a causa frigida, pituitosa oriatur, conandum est statim, ut pressio lentoris glutinosi a capite avertatur per derivationes in alia & opposita loca, & per evacuationes universales; in usu veniunt vesicatoria, caustica, frictiones, ligaturæ, apophlegmatismi, sternutatoria, purgatoria valida, clysmata acria, ut sequens, ʒi. Pul. colocynth. ʒss. fol. tabach. ʒi. coq. in aq. font. q. s. ad x. admisce sal. gem. ʒij. f. enema. In usu tamen horum omnium augeatur sæpe malum, materia magis mota & impacta, viribus tamen mox projiciendis per evacuantia; hinc in concilianda dissolutione semper evacuationi & avulsioni studendum, quantum res peti queat; inde regula ( Hippocratis ). Venesectio, ni juvet, occidit ( &

*Celsi*



*Celsi* occidit vel liberat. ) Si vero à causa calida oritur, & morbus inflammatorius videtur, tum illico mittatur sanguis magna copia ex *venis jugularibus*, & repetatur pro re nata, unde, si morbus sit sanabilis, levamen accipiet: diarrhœa omni arte obtineatur; *diluentia*, *attenuantia*, & *diuretica* ingerantur; detineatur æger, quantum fieri potest, e lecto, saltem a decubitu declivi. De reliquis lector ipse consulat auctorem.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 785.* Signa Apoplexiæ aliquando probabiliter futuræ sunt: dolor capitis, vertigo, tumor carotidum, memoriæ debilitas, spontaneæ oculorum illacrymationes; *scotomiæ*, incubus; vocis tarditas & hæsitantia, oris distortionem; dentium stridores in somno; stupor frequens brachii aut pedis, aut etiam refrigeratio extremarum partium.

Mus  
affectus  
prodromi.

*Art. 786.* In hoc affectu omnes functiones animales subito cessant; homo quasi fulmine percussus, & attonitus in terram jacet, sine motu; ( hinc dicitur morbus *attonitus* & *sideratus* ) respiratione ipsa plus minus imminuta, cum vel sine stertore; pulsu adhuc nonnihil vegeto, & perquam duro, nisi in casu admodum periculoso, ubi deficit: color faciei & oculorum ut plurimum rubet, facies tumida; æger profunde dormit, & nequit suscitari; interdum resolvitur vesicæ, & ani sphincter: supervenit tandem spuma circa os.

Paroxysmus.

*Art. 787.* Hemiplegia seu hemiplexia est quando solummodo dimidium capitis; & reliqui corporis afficitur ( *more Apoplexiæ.* )

Hemiplegia.

*Art. 788.* Apoplexiæ causæ proximæ sunt; vel impeditus spirituum animalium motus in cerebro, vel impeditus sanguinis circulus per cerebrum; venus nimia petissimum in senibus ad Apoplexiam multum disponit; ut & animi affectus graviores, iræ, &c. Contusiones & concussiones capitis, scabies retro-pulsa, vapores mercuriales. gas seu halitus carbonum.

Apoplexiæ causæ.

**Est mor-** *Art. 789.* Apoplexia est morbus admodum hæredi-  
**bus hæ-** tarius; omnes, qui Apoplexia moriuntur, suffocati  
**redita-** intereunt, unde quo *liberior est respiratio*, eo major  
**rius.** est spes salutis, & contra; spuma circa os est fere sem-  
 per signum lethale.

**Curatio,** *Art. 790.* *Barbette* in curanda Apoplexia *inun-*  
*tionem mercurialem* commendat; metus est de *vomi-*  
*tu* excitando, ne suffocatio acceleretur, quod non  
 paucos medicos deterret. In Apoplexia *sanguinea* ve-  
 næsectio est necessaria; in *pituitosa* omittenda, quo-  
 niam nociva est, sed potius exhibendum est *vomito-*  
*rium antimoniale*; æger non debet in lecto decumbe-  
 re, sed erectus sedere; *enemata acriora* sunt inji-  
 cienda parata ex *lavend. rut. majoran. nicotian. rad.*  
*pyreth. irid. nostr. vin. benedict. sal. gem. pulp. colo-*  
*cynth. in petia ligat.* &c. In ipso paroxysmo non  
 neglectis universalibus conducunt *salia volatilia, su-*  
*dorifera*, speciatim *aurum diaphoret. Poterii, cinna-*  
*barina, species diamb. confect. alcherm. sudorifera*  
*ex lignis* declinante paroxysmo aliquandiu continuata  
 sunt maxime proficua.

**Prophy.** *Art. 791.* Pro præservatione, præmissis rite uni-  
 versalibus præ reliquis multum laudatur frequens *sal-*  
*vie* usus quocumque modo; in *cubebis, cardamomo,*  
*sem. sinap. & erucæ* singulares latent vires, maxime  
 pro senibus in forma pulv. vel aliter in vehiculo ap-  
 propriato assumptis. Item fonticuli interscapulares *ho-*  
*dierno usu comprobantur.*

### Colei sententia,

**Causa** *Art. 792.* Auctor putat acerbum frigus, & gelu  
**Apople-** diutinum anno 1683. numerum *apoplecticorum* annis  
**zix sin.** succedentibus adauxisse.  
**gularis.** *Art. 793.* Potio infusionis *rorismarini, salviæ, be-*  
*ton. lilior. convall. &c.* instar *thææ*, item *Coffææ*, &  
*fumifuctio nicotianæ* ad præcavendam Apoplexiam lau-  
 dantur; *balsama odorifera, Apoplectica dicta, & usus*  
**De larga** *ptarmicorum* inordinatus damnantur. Sanguinem de-  
**sangu-** trahit manu maxime liberali ad uncias scilicet, 30.  
**nis mis-** 40. 50. imo 60. hancque praxin non modo ex pro-  
**gione.** pria experientia stabilire satagit, sed etiam auctori-  
 tate

tate celeberrimi D. Gibbons, neque in junioribus tantum, verum etiam in ætate provectioribus injungit; & instantiam profert cujusdam annum 77. agentis, a quo sanguinis inter 20. & 30. uncias detraxit, & tantundem alia vice intra ejusdem septimanæ spatium ob *vertiginem* aliqualem superstitem.

*Catherwoodii sententia.*

*Art. 794.* Auctor pro virili conatur, & nullum non movet lapidem *arteriotomiam* introducere tantumquam *phlebotomia* longe præstantiorem in hoc morbo curando; locum designat in arteria temporali; operationemque neque difficilem esse, neque periculofam asserit; accurate digitis detinenda est arteria, ne subvolutet, & vulnus infligendum est non punctura, sed per incisionem cum dextra mucronis lanceolæ elevatione; detracta sufficiente sanguinis quantitate, pre-mendum est vulneris orificium in os temporale cum digito maximo, quo *thrombus*, si accidat, cito dissipabitur, & fere momento temporis fluxus sistetur.

Arteri-  
otomia

*Art. 795.* Verum enimvero mihi videtur author noster meras umbras consecrari, ut Hecrules stramineus apparet, novam crepat methrodum; sed quomodo stabilitur hæc praxis? Inter paucas, quas adducit hoc affectu laborantium, historias; unicam tantum per arteriotomiam curati affert, sed de his non libet morari. Utcunque vero res se habeat, minime futurum videtur (ut recte admonet D. Freind) ut nostri æquam homines huic medicinæ generi assuescant.

Cui co-  
modo  
adhibe-  
atur  
istâ pra-  
xis du-  
bitatur.

Farrago sententiarum.

*Inter legendum & ex observatione.*

*Art. 796.* In paroxismo Apoplectico intumescunt venæ jugulares, necnon pulmonum, quæ non raro rumpuntur in Apoplexia demortuis. In defunctorum cadaveribus sæpissime repertum est serum viscidum in cerebri ventriculis, aliquando sanguinis ingens copia

Varias  
mortis  
causas  
detexit  
Apato-



ma de-  
functo-  
rum.

in sinibus, aliquando tumores ad pugni magnitudinem juxta conarium inter cerebrum, & cerebellum; talis (observante *Drelincurtio*) semestri spatio primo cæcitatem, dein surditatem, subinde sensuum omnium abolitionem, & postremo necem intulit. In cerebro Apoplexia mortui (inquit *Cheselden*) observavi universa vasa sanguifera plurimum distenta, ventriculo ipsamque cerebri substantiam lymphâ supra modum abundantes, & duram meningem magnopere incrassatam, &c. *Vomitoria* (inquit *Dolæus*) experientia teste, quicquid reclamet *Sylvius*, divinam afferunt opem. Nullum est potentius remedium vino emetico in omni soporoso affectu, dos. zi. vel zij. per os, Zijj. vel iv. in enemate, Si injecta enemata præter rationem mora faciunt, sollicitanda est dejectio acris suppositoriis, speciatim incidetur frustulum saponis Veneret. in formam Glandis. Venæsectionem in omni Apoplexia, & in omni ætate, & in summa quidem senectute admittimus; timidis, loco hujus, hirudines vel cucurbitulas concedimus.

Pulsus  
fortis  
sape  
decipit  
inexper-  
tes.

*Art. 797.* Rhodius observavit, quod in omnibus affectibus comatosis, præcipue lethargo, & Apoplexia, pulsus dum ex parvo fiebat magnus, & sensim in magnitudinem crescebat, ægrotantes brevi moriebantur; pulsus etenim in hoc affectu est ut plurimum fortis & plenus, quod multos decipit.

Nota  
bene.

*Art. 798.* Apoplexia demortui ante triduum non sunt sepeliendi, quia omnes humores intra illud spatium moventur, & nonnulli ante illud tempus revixisse observati sunt. *Barbette*. Linimentum sequens ut specificum in lethargo & Apoplexia habetur; ℞. ol. succin. spic. castor. ana Zij. flor. hiperic. succ. rut. express. ana Zij. m. illinatur cervix, &c. Item summum & fere unicum remedium in Apoplexia sunt cucurbitæ capiti impositæ. *Ryverius*, *Zacutus Lusitanus*, &c. Cum morbi vis maxima est, admoveatur cauterium actuale inter primam, & secundam nuchæ vertebam.

Remedia  
varia.

*Art. 799.* Remedia sequentia interdum pro reinvigilantia in usum adduci possunt; antimonium diaphor. antihellicum Poterii, aurum fulminans, aurum Mosaicum.

*cataplasma suppedale, cataplasma de balecibus, elaterium, elect. antiapoplecticum, emplastr. cephalicum, elixir. pæon. Myncicht. enema acre, enema apoplecticum, ens veneris, flores salis armoniac. martiati, gargarisma ad pituitam, infusum cephalicum, pil. volat. sternutatoria omnia (flores Bezoin. aliis ptarmicis adjecti illa multo efficaciora reddunt) pul. v. ad guttetam, tinctura epileptica, vinum benedictum &c.*

*Art. 800.* Genericæ Apoplexiæ causæ sunt: 1.º Plethora, seu nimia sanguinis copia; 2.º Ejusdem sanguinis, & lymphæ seu serositatis rarefactio: 3.º Hujusmodi liquorum visciditas ac densitas. 4.º Spirituum animalium progressio interrupta. Alia itidem peculiariter hic morbus causas recipere potest: ut capitis ictus vel contusiones a casu, unde sanguis ruptis in cerebro vasis per cranii cavitatem extravasatur; cerebri ipsius anorbofi tumores, polyposæ concretiones in ipso cerebro genitæ &c.

*Art. 801.* Ex hisce causis ea hujus morbi divisio ordinatur, propter quam plurimæ Apoplexiæ species a quibusdam numerantur; sed communior divisio atque simplicior, duas tantum Apoplexias ponit, *Sanguineam* videlicet, & *lymphaticam*, quæ etiam *Pituitosa* vocatur.

*Art. 802.* Peculiarior sanguineæ Apoplexiæ signa, quibus a Pituitosa distinguitur, sunt: vultus color rubentior, & quasi inflammatus, vasa magis solito plena ac tensa: atque hinc pulsus durior, & fortior.

*Art. 803.* Apoplexia vero lymphatica sensus quidem, & vocem ut sanguinea adimit; sed in hac, nec rubor ille cernitur, nec vasa adeo inflata reperiuntur, unde pulsus æque ac respiratio, tametsi debiliores, in statu naturali ferme persistunt.

*Art. 804.* Si vasa cerebri turgescencia non dehiscunt, nec contentum humorem effundunt, sperandum est, ut ictus largisque phlebotomiis vel in brachio vel in pede vel in jugulo institutis circulatio in pristinum libere restituatur; quodsi ex nimia distensione rumpantur, tunc nullus sanationis locus remanet, nisi forte humorum extravasatio a quadam externa causa producta fuerit, quo casu mediante Terebellæ operatione, ut in fracturis Cranii usu venit, exitus humori perforatione ejusdem Cranii conceditur.



Phlebo-  
tomia.

*Art. 805.* In Sanguinea Apoplexia nonnulli ex recentioribus Medicis phlebotomiam in pede institutam ceteris omnibus potiore habent, quia validiorem revulsione præstat; sed oculatissimi Practici jugularium sectionem quoque commendant. Utilissimum credimus, quod ab initio usque, tempore quinque vel sex horarum, ad tres vices usque vena brachii tundatur, atque inde sanguinis emissiones vel a pede vel a jugulo juxta magnitudinem morbi plaris etiam reiterentur.

Curatio  
lymphatica.

*Art. 806.* In lymphatica Apoplexia conservandæ sunt ægro vires ut morbi vehementiæ resistere possit, quare necessaria non videtur phlebotomia, quæ nisi caute admodum ac prudenter juberi debet. Præcipua autem indicatio est, quod æger motus suos temperet, idcirco spirituosæ, & irritantiæ, quæ ejus sanguinem excitare valent, nisi proficua, & utilia valde reputanda sunt. Methodus in hoc casu, quam plurimi commendant, hujusmodi est.

Frictio-  
nes.

*Art. 807.* Frictiones oportet ad caput, ad dorsi spinam, & ad collum cum calidis siccisque lineis mappis instituantur, atque etiam adhibitis liquoribus spirituosis acribusque: ut Aq. meliss., spir. lavend., spir. vin. &c. Convenit etiam Tempora atque nares confricare sequenti Balsamo Apoplectico.

Balsa-  
mum A-  
poplecti-  
cum.

℞. Mosch. ℥j. ambr. gris. ℥ij. sem. sacchar. cand. parum misc. super porphyrit. dein add. ol. nuc. moscat. per express. extract. unc. j. & sem., tum adp. ol. destill. majoran flor. Aurant. ana ℥ij. ol. succin rectif. ℥. sem. ol. destill. basilicon. lign. rhod. ana ℥j. sem. ol. cinamom. ℥j. atque demum add. balsam. peruvian. nigr. unc. j. flor. benzoës ℥ij. Zibeth. gr. viij. f. balsam. f. a.

Servandum est hoc Balsamum in vase vitreato, & probe clauso, ejusque quantitas si minor desideretur eadem proportionem singula ejus ingredientia imminu debent, quemadmodum præscripta formula sistit. Aliud quoque Balsamum ex Pharmacopœa Bateana habetur, quod vices præcedentis exerere potest, & hujusmodi est.

Aliud  
balsa-  
mum.

℞. Ol. destil. cinamom., caryophyll. lavendul. citr. majoran. menth. rut. rorismar. salv. absynt. lign. Rhod. ana gutt. xij. ol. rectif. succin gutt. vj. bitumin. ju-



*Judaic. pulv. ℥ij ol. nuc. mosc. expr. unc. j. balsam. Peruvian. q. s. m. & f. balsam. s. a.*

Si de hoc aliquid per nares immittitur vel alio quovis modo externe applicatur, caput inde roboratur, frigidi humores excutiuntur, spiritusque animales reviviscunt; quod in Apoplexia, in Syncope, & in Paralyfi eque convenit. Interne etiam usurpari potest a gr. iv. usque ad gr. x. una cum Electuario quovis Cephalico, sternutatoria quoque plurimum auxiliantur, ubi de lymphatica Apoplexia agitur; Summatim igitur, ut paucis dicam, omnia ea hoc in casu juberi possunt, quæ nervosum sistema excitare, movere, ac irritare valent vomitoria.

*Art. 808.* Eodem tempore Emeticum porrigendum est.

Est ægro, quare Vinum Emeticum hoc in casu ceteris antecedit, cujus unc. ij. propinantur, & si intra duarum horarum spatium nullum effectum edit dosis reiteratur, quæ si iterum nihil præstat, conclamatum est. loco hujus vini Tartarus Emeticus cum aliquo liquore exhiberi potest, cujus dosi ad normam temperamenti ægri, ex Medicis prudentia concinnanda est, necesse est autem ut dupla saltem ea, quæ ut plurimum adhiberi solet, porrigatur, quare a gr. viij. usque ad gr. xij. jubendus, secus vel nullum, vel levem quidem effectum ederet. Alterum quod laudatur Emeticum est.

*℥4. Rad. Asari pulv. ℥j. Piper. pug. j. detur in Vini calidi cyatho ad vomendum.*

*Art. 809.* Ceterum notandum est quod si Apoplexia Nota a stomachi repletionem, & a crapula veniat, vomitoria bene tunc specificam virtutem obtinent nulli secundam. Ast in sanguineæ Apoplexiæ principio numquam danda; secus inflata vasa, & turgentia rumpendo noxia plurimum confectaria afferrent. Caute igitur, & prudenter jubebuntur, atque tunc maxime tutus eorum usus erit, quando jam alvus ob Ptisanam laxativam ingestam copiose deponere incœperit.

*Art. 810.* Statim post sumptum vomitorium, cordiale aliquod spirituosum ingerendum, cum apto quovis vehiculo dabitur ægro, præ ceteris *Lilium Paracelsi* laudibus celebratur amplissimis, cujus dosi tunc ad L. vel LX. gutt. usque augebitur, cum liquore aliquo pingui propinabitur, & maxime cum jure carniū; alias œsophagum stomachumque accenderet, & excoriaret.

ret. Hac adhibita cautione ad centum guttas usque porrigi potest, dilutum nempe in jure carniū, & cochleatim ingestum.

Nota  
bene,

*Art. 811.* In apoplexia vero sanguinea omnigena etiam cordialia adhibere, neutiquam licet, sed mitiora tantum, & temperatiora, ut confect. hyacint. aquæ cordiales simplices, meliss. scorzon. &c. & ubi cordialia valentiora usurpentur, ut aq. magist. meliss. Reg. Hung. Imperial. &c. necesse erit easdem aqua communi temperare, siquidem cordialia nimium spirituosā nullo modo convēniunt, utpote quæ motum sanguinis concitando, vasa turgescētia rupturæ proxima disrumpērent.

*Art. 812.* In apoplexia lymphatica curandum est, ut æger agitetur, & mortuum edat, incessumque experiatur, quamobrem famulorum opera sustentus pedibus progredi adiget, ejusque manus identidem percutientur, aliisque modi vexabitur, & discrutietur, ne obdormiat.

Clyste-  
res.

Eidem quoque acres clysteres injicientur ex. gr. juxta formulam seq.

*℞. Rad. cyclamin. man. j. sal. origan. centaur. min. rad. pyrrhetr. ana man. sem. pulp. colocyntid. num j. coq. per horæ quadrant. in s. aq. quantit. cola. add. sal. commun. - j. aceti par. f. clyst.*

Si hujusmodi enema aut aliud simile nihil præstet ad Nicotianam confugiendum erit, cujus clyisma efficacissimum quidem est, quodque sic componitur.

*℞. Funis nicot. unc. j. vel pro debilioribus unc. sem. quo frustulatim resecto coq. cum aq. commun. lib. j. sem. usque ad tertium. Filtrato liquori add. hiera picræ unc. j. f. Clyster.*

Cucur-  
bitulæ  
scarifi-  
catæ.

*Art. 813.* Scapulis cucurbitulæ scarificatæ applicentur, ubi etiam emplastrum vescicatorium extendetur, quod retro aures itidem admoventi poterit, vel etiam spiritu vitrioli hoc emplastrum, ut magis irriter, inspergetur.

Merrinx.

*Art. 814.* Si horum auxiliorum ope æger nondum expurgiscatur, sternutatorii pulveres mediante fistula in ejus nares perflabuntur, qui rad. pyrrhetr. helleb. alb. irid. florent. sol. betonic. & flor. lil. convall. componi potuerunt; vel aq. magist. melliss. aut Reg. Hung. &c. per nares subinde injicietur.

Clyster  
præser-  
vativus.

*Art. 815.* Cæterum cavendum ne multitudine remediorum æger obruatur, & ubi expurgatus fuerit, ac

ntem recuperaverit, quotidie injicietur ei per tres  
cessivos dies sequens enema.

24. *Senn. unc. j. aq. commun. lib. j. sem. coq. ad  
onsumpt. tertiæ partis, & colat. add. hier. picr. unc.  
fiat enema.*

Hujus ope non solum ægri intestina evacuantur, sed is  
oque paralyti facile apoplexiam sequente præservabitur

*Art. 816.* Si vero commoditas nulla adsit emeti- Circu  
m apoplectico propinandi, licebit saltem pugillum emeti-  
is in ejus os immittere, posteaque cyathum urinæ cum  
uriendum porrigere, cujus ope facile ad vomitum notan-  
citabitur. dum.

*Art. 817.* Laudabile item est secum habere sequens Specifi-  
medium, quod per se lymphaticam apoplexiam sæ- cum  
lime sanat, vel a quo saltem tempus comparatur, apople-  
alia fortiora remedia celebrentur, medicique auxi. cticum.  
ium obtineatur.

24. *Sp. vin. sulphur. sal. commun. ana ℥i. misc. &  
vase vitreo probe clauso hæc mixtura agitetur.*

De qua mox gutt. vii. cum vini albi cyatho apople- Mixtu.  
to exhibebuntur, cui itidem imperabitur, ut se se ra.  
veat, & incessum experiatur, vel saltem absque vio-  
tia, eundem concutiemus.

*Art. 818.* Ut lymphatica apoplexia avertatur fumus Præser-  
otianæ per fistulam mane, & sero usurpare juvat; vativum.  
edit etiam, ut semel in mense alvus hyeme solva-  
, & æstate bina emetica adhibeantur.

i sanguinea ingruit apoplexia, vel quempiam eadem  
atur, quater in anno instituenda phlebotomia, &  
gula vice die sequenti opus est alvum laxare, ut  
e causa effervescentiam sanguinis producendi apta;  
ue adeo valis turgectis eorum dehiscuntiam, &  
idi contenti effusionem in cerebro efformandi, eva-  
tur.

*Art. 819.* Si demum quis se se stupidus, gravis, &  
omnum immodice proclivis nanciscatur, quæ in-  
a puitosam apoplexiam minantur danda opera e-  
ut excitato vomitu, vel ingesto purgant cor-  
evacuatur, deinde sequenti spirito internæ vires  
entur, qui non solum utiliter in hujusmodi apo-  
ia adhibetur, verum etiam in lethargo, in catar-  
suffocativis &c.



Spiritus 24. Castor. cināmom. succin. ana ʒj. sal. volat. viper.  
 compo- ʒ. sem. aq. theriacal. meliss. spirituos. sp. vin: ana  
 situs. unc. j. diger. super cine. calid. in vase probe clauso  
 per horas xij. deinde per destill. per alembic.

Hujus dosis est cochlearis dimidii ter in die pro iis;  
 qui ab apoplexia tenentur, & singulo biduo semel; pro  
 iis; quos idem morbus minatur.

Obser- Art. 820. Observandum est, quod finitis omnibus  
 vanda circa so. lymphaticæ Apoplexiæ symptomatibus concedendus est.  
 mnum. somnus ægro in trihorium usque protractus; & iden-  
 tidem expergefactus finitur; ut eundem iterum car-  
 piat; etenim operæ pretium est; vires labefactas; &  
 a morbo non minus; ac a remediis imminutas tali pa-  
 cto confirmare ac restituere. Diligenter tamen invigi-  
 labitur attendendo; an ejus somnus naturalis est; at-  
 que mitis; an contra durus; & opprimens; quo casu  
 mox expergefactus agitabitur diu atque ad incessum i-  
 neundum adigetur.

Quoad Art. 821. In eadem serosa apoplexiā morbi recru-  
 recidi- descentiæ spatio 24. horarum sæpe redire solent; atque  
 vam. per priorem hebdomadam sunt timendæ; siquidem u-  
 plurimum funestæ. Quare ut eadem avertantur exa-  
 ctum valde regimen ægro præscribetur; atque eiden-  
 dabuntur subinde purgantia; atque demum aptiori an-  
 ni tempore adventante ad thermas ablegabitur; ut a  
 Borbonianas; ad eas Aquæ sextiæ; & Vichy. &c.

Potus Art. 822. Quousque morbus persistit; adhibeat æge  
 ordina- pro potu communi ptisanam ex rad. scorzon: glycyrrh  
 tius. fol. betonic. meliss. vel similia.

Prognosis. Art. 823. Quando omnia quæ pro apoplectico et  
 gendo usurpantur; nullam evacuationem præstant; se-  
 stertor accedit; & viget; tunc pronunciabis jam rei  
 habendam in desperato.

## L E T H A R G U S.

Inter legendum, & observandum.

Defini- Art. 823. De lethargo alibi meminimus h. e. nui-  
 tio & 761. sed ibi eundem tanquam symptoma ceteris mo-  
 signa bis accedens; & sudorem inducens consideravim  
 lethargi. hunc

nunc vero eundem, ut morbum per se & idiopaticum, habemus.

*Art. 825.* Lethargus igitur somnus est profundus cum febre lenta, in quo si ægri excitantur, innox in eundem somnum relabuntur. Qui hoc tenentur stupidi sunt, & obliuiosi, vix mente valent, atque omnium actionum sunt incapaces. Hinc verissimilimum est, hunc nisi minorem Apoplexiæ gradum fore.

*Art. 826.* Ejus curatio eadem omnino ratione perficitur, ut in apoplexia, sectis videlicet brachii, & Curatio. pedis; nec non jugularibus venis, si indicia adsint a sanguinis copia produci; quodsi a pituita veniat, purgantia adhibenda sunt, vomitoria, sudorifera, sternutamenta &c. Ut verbo dicam, torpentes spiritus excitari debent remediis acidis; volatilibus, acribusque, somnum interrumpentibus; inducentibusque vigiliam. Neque diu hærendum; quin fortioribus purgativis ægri alvus cito laxetur; quæ si per os ingeri nequeunt, clysterum ope saltem immitti poterunt.

Existimarunt nonnulli sanguinis emissionem a jugulari proficua futuram, etiam quando morbus a sero cerebri inundante proficiscitur.

Ad excitandos spiritus commendant, ut subinde aliquæ aceti guttulæ in ægri os instillantur, vel ejus naribus, vel sp. sal. ammoniaci; vel bal. apoplect. subicitur &c.

Veluti specificum ad lethargicos excitandos celebratur succus fœniculi: vel rutæ cum aceto temporibus naribusque admotus.

*Art. 827.* Observavit *Rhodius*, quod in omnibus affectionibus comatosis, præcipue lethargo, & apople- Prognosis. xia, pulsus, dum ex parvo fiebat magnus, & sensim sis. in magnitudinem crescebat, ægrotantes brevi moriebantur.

## HEMIPLEGIA, PARAPLEGIA, seu Paraplexia.

### *Aræti sententia.*

*Art. 828* Apoplexia, paraplegia, paresis, paraly- Paraly-  
omnia genere eadem sunt: aut enim motionis, aut ta- sis spe-  
ctus,

cies seu status, aut utriusque defectus est: interdum & mentis denominatio-  
 nationes variæ. interdum & reliquorum sensuum. Apoplexia enim totius quidem corporis, & sensus, & motus, & menti resolutio est. Paraplegia est tactus motusque remissio sed in membro uno, pura manu crureve. Paralysis autem motus tantum fere est, actionisque defectio. Quod nonnunquam solus tactus deficiat (raro enim id evenit) potius anæsthesia, idest, sensus abolitio, quam paresis idest defectio, nominatur. At si Hippocratis, apoplexion, idest, artonitum crus secundum rectam, dicat illud tanquam mortuo simile, inutile, & insanabile vult significare. Quod enim in toto corpore est vehemens apoplexia, illud in crure paraplegiam vocat; patet ergo ait Cl. Van. Schvvietten, *quod antiqui vocaverint paraplegiam idem illud; quod hodie dicitur paralysis; nam & in illa quandoque una cum motu sensus integritas perit, ut postea dicitur, & partis singularis non vero totius corporis vitium est.* Id ipsum innotescit etiam a descriptione quam Trullianus dat de vitio resolutionis; quod Græci paresin, & paralysisin nominare consueverunt; nam subjungit differt ab apoplexia, quod ipsa quidem totius corporis sensus, & motus abolitio est resolutio autem, quod dimidia pars corporis, vel unum tantum omoritur.

*Art. 829.* Ex istis ergo intelligimus Paresin, & Paralysisin unius ejusdemque morbi synonyma esse, paralysisin, & paraplegiam pro uno eademque morbo vetere habuisse ab apoplexia levitate tantum diverso, quinimo comperimus Galenum paraplegiam non solum, sed etiam hemiplegiam generali paralysis nomine comprehendisse.

*Art. 830.* Hujusmodi vero græcarum vocum significatio juxta neotericos ita se habet. Quando omnes universi corporis partes afficiuntur, ita ut sensum, & motum amittant, morbus est *apoplexia*, quando omnes sub capite, ita afficiuntur, dicitur *peraplegia*, quando omnes in alterutro tantum latere *Hemiplegia*, quando partes quædam ubicumque corporis *Paralysis* nuncupatur. Distinctionem ergo, quam habet *Ettmüllerus* de hemiplegia, & paraplegia a paralysis, quamque Auctor noster prosequutus est, nos cum Boerhaavio ejusque Commentatore eximio C. Van Schvvietten



irritam reputamus. Nam una eademque paralyſis, ſi totum unum latus occupet *hemiplegia* eſt, ſi omnes cervici ſuppoſitas partes *paraplegia*. Vide Boerhaav. aph. 1018. eadẽm enim ubique affectio eſt, pro numero partium corporis, quas detinet, tantum verſa.

*Art. 831.* Obſervat itidem Aræteus, quodſi caput primo in dextera parte patiat, ſiniſtra vultus, & trunci corporis reſolvitur, ſi autem læva, dextra nervorum laborat. Hoc ideo evenit, quod nervorum initia permutata ſunt. Neque enim, inquit, dexteri nervi in dexteras partes ſecundum rectum uſque ad extremum progrediuntur, ſed ab initio enati protinus ad oppoſitos tranſeunt, ſe invicem in figuram hujus litteræ X. quem græci chiaſtrum vocant, permutantes. Utque ſemel dicam, ſive omne ſimul corpus reſolutionem nervorum patiat, ſive aliqua membra, ſive ab alterutra, ſive ab utraque parte, nervi de capite fluentes alia ratione patiuntur.

Permutata a nervorum a capite reſolutio.

### Ettmulleri ſententia.

*Art. 832.* Paraplegia ſeu paraplexia, & apoplexia particularis, in altero tantum latere hemiplegia nominatur. Interdum afficitur totum corpus, excepto capite, ex obſtructione ſpinalis medullæ; frequentius eſt morbus *ſecundarius*, interdum vero *primarius*: ſenſus, vel motus, vel alteruterque totaliter abolentur, vel multum imminuuntur.

Ratio nominum.

*Art. 833.* Paraplegiæ, quæ *apoplexiam*, *epilepſiam*, alioſque morbos immediate ſequuntur, vulgo *paralyſes* vocantur, ſed *paralyſis* eſt longe alius affectus, ut infra manifeſtum erit.

Paraplegia ab apoplexia differt.

*Art. 834.* Vomitus in omni paraplexia convenit, & purgatio ad primatum viarum emundationem, venæſectio convenit in plethoricis; proximo loco ſudorifica valde conducunt, cum ſpecificis interſperſis, decoctum ſaſſafr. cum roremarino & bacc. juniperi; aliquando detur aurum fulminans ad gr. iij. vel iv. de reliquis internis medicamentis vide *apoplexiam* & *paralyſin*; balnea ex formicis revera ſingulare quid obſervant in paraplegiis curandis.

Curatio

## PARALYSIS, &amp; PARESIS.

Ettmulleri sententia.

Paraly-  
sis &  
Paresis

Art. 835. Paralysis est gravior, & paresis levior affectus; paralysis proprie est resolutio, & relaxatio ligamentorum & membranarum motui inferventium, non ab obstructis nervis proveniens, sed a mera membranacearum & nervearum partium resolutione, & sic a paraplegia distinguitur, quæ ab obstructione nervorum exoritur; hæc sequitur apoplexiam, epilepsiam, convulsiones, vertigines, &c. qui affectus in se mutuo sunt permutabiles, & plerumque desinunt in paraplegiam. Illa vero sequitur alios morbos longe diversos; viz. scorbutum, malum hypochondriacum colicam, & frequentior est in regionibus, ubi vino & spiritibus indulgent, aut oritur etiam subinde a causis externis, ex fumis metallicis, &c.

Curatio  
difficilis

Art. 836. Paralysis ceteris paribus facilius curatur quam paraplegia, quæ plerumque omnem medici operam eludit; motus saltem amissus, superstitie sensu restituitur: tremor superveniens est bonum signum recuperandi motum. Atrophia vero aut frigiditas pessime ominatur.

Curatio.

Art. 837. Purgatio lenis tantum institui debet cum mercurio dulci & extracto hellebori, specie diaturæ cum rhabarbaro, pil. fœtid. &c. & postea sudorifica, remedia apoplectica, & epileptica, viperina, succinata, lumbricalia, ex milleped. & formicis parata, antimonialia, martialia, bezoardica, aurum diaphoreticum, antiscorbutica & specifica in sero lactis cocta, quando a dolore colico ortum ducit, & externe pro abdomine illinendo galbanetum Paracelsi. Galbanum Sennerti est præstantius medicamentum. Vid. Pharm. Batean. In genere urticatio morbi resoluti est maximi usus, expertus loquor. Therme naturales, balnea ex formicis parata, unguentum maciatum, nervinum, paralyticum, &c.

*Vvillisi sententia.*

*Art. 838.* Paralysis est partium nervosarum a debita distentione resolutio, sive relaxatio; cujus ratione motus & sensus, nempe: aut alter tantum, aut simul uterque in toto corpore, vel in quibusdam partibus; debito more exerceri nequit.

Definitio multis talibus

*Art. 839.* Mentis hebetudo, oblitio, & stupiditas, frequenter in paralyin mutantur. Paralysis aliis affectibus frequentium supervenit, quales præcipui sunt *carus, apoplexia, scorbutus, convulsio, colica, arthritis, &c.*

Unde provenit.

*Art. 840.* Paralysis ab apoplexia, caro, convulsione, colica, aliisque cerebri, aut systematis nervosi affectibus superveniens, si non brevi tempore in melius alteretur, aut medicamentis cedat; plerumque insanabilis prestat: hominibus provectæ ætatis, cacochymicis, valde scorbuticis, aut intemperatis accidens, etsi affectus haud immanis fuerit, difficile tamen curatur.

Difficile curatur.

*Art. 841.* Phlebotomia passim non omnibus convenit; & si hanc vetamus, non tamen ob eandem cum ceteris rationem, supponendo paralyin esse morbum rigidum; præmissis universalibus, viz. vomitorio & catharsi, cerevisia medicata parari potest ex *salvia benedicta, stæchad. lign. sassafir. cortic. Vvinter. &c.* Quidam paralytici sunt frigidi, alii calidiores ex constitutione, ideoque remedia debent esse diversi generis, ut in ipso scorbuto evenire solet. Remedia in hoc affectu ingnora sunt *viperina, pulv. rad. serpent. virgin. gum. guaiac. tind. succin. sp. C. C. succinat. pulv. ari comp. calybeata, antiscorbutica omnia, præcipue succi antiscorbutici cum aqua raphan. aurantii, &c.* Externe motus, linimenta, cucurbitulæ, vesicatoria, urticationes, item immissio membri resoluti in grand hordei crustam cerevisiam subductam, vel intra ventrem vel thoracem bestiae recens mastate, aut denique balneum artificiale vel naturale. His non succurrentibus providendum erit ad remedia magna, viz. diaphoretica, revivificantia, vomitoria fortiora, &c. sudorifera usitata sunt: decoctum guaiac. spiritus & oleum ejusdem, mistura simplex, flores & spiritus salis armoniac.

Curatio



*niac. aurum diaphoreticum, sal. viper. bezoar. min. tinct. antimon. &c.* Nullum datur præstantius remedium quam *thermæ nostræ Bathonienses*; quosdam tamen deterius reddunt. Pro pauperibus & nimis procul a Bathonia degentibus Thermæ artificiales ad imitationem naturalium ad hunc modum fieri possunt. ℥. calc. viv. ℞iv. coq. paulisper. in aq. commun. cong. xx. vel xxx. pro semicupio.

*Inter legendum & ex observatione.*

**Causa** *Art. 842.* A spirituum inopia fit paralysis, ut in senectute valetudinaria, post immodica sanguinis, liquoris genitalis, &c. dispendia, e sanguine enim effæto pauci spiritus in cerebro procreantur.

**Papillæ cutaneæ tactus organum** *Art. 843.* Credibile est papillas cutaneas esse tactus organum, ideoque hic ratio reddi potest, cur superfluo motu sensus possit aboleri, viz. quia motus per nervos fit, sensus per papillas hæcæ.

**Remedium ex formicis** *Art. 844.* Ad membra paralytica plurimum valent fermentationes quotidianæ ex *formicis* & earum *cubiformicis libus* in aq. font. coct. interdum præsentaneam opem & firmum constansque robur partibus affectis afferunt, eodem tempore usurpetur oleum, sequens, ℥. *sem. sinap. parum contus. q. v. sp. lavend. q. s. ut madescat.* infunde frigide per horas 24. deinde oleum prælo exprimatur; cum quo inunge cervicis vertebrae, & spinam dorsi, & etiam partes affectas. Nihil potentius est in affectibus paralyticis (inquit *Chesneau* experientia teste) ad discutiendum humorem aliquem in vertebrae lumborum, vel in musculis concretam, quam *oleum philosophorum*, & *oleum terebinthinæ*, quod secundo exit post spiritum, aureique est coloris. Si membrum paralyticum extenuetur, vix aut ne vires te- quidem restituitur.

**rebinthi- næ Chio** *Art. 645.* D. Harris in observationibus de morbi gravioribus asserit *therebinthinam e Chio* in hoc affectu vires plane admirandas obtinere: atque hunc in modum præscribit. ℥. *tereb. e Chio* ℥iij. solve in vitel. ov. immiscendo *syr. de stæchad.* ℥j. *aq. lact. alex.* ℥iv. m. f. haust. singulis auroris capiend. ad quartam vicem. Addit præterea se dedisse *tereb. venet.* ℥v. vel ℥j. in haust. similiter dissolut. non modo in pa-  
rallysi

paralyti, verum & in arthritide, & in rheumatism. Cum optimo successu.

Art. 846. Larynx, pharynx, & gula quandoque Paraly. Paralytin patiuntur. Paralysis laryngis prohibet de- sis La- glutationem liquidorum, non vero solidorum, quoniam ringis. epiglottis non perfecte claudit rimulam laryngis. Paralysis pharyngis prohibet deglutationem solidorum, Pharyn- non vero liquidorum. Paralysis gulæ omnimodam de- gis & glutationem tollit. Interdum deglutio læditur ex gulæ. contractura spasmodica gulæ, quod hypochondriacis, & icorbuticis est familiare.

Art. 847. Epispastica sunt applicanda; antispasmo- Curatio- dica & antiparalytica externe & interne usurpanda unt, gargarismata & linctus in loquela amissa con- videntia hic locum habent; speciatim succus salviæ cum noc. moscat. castoreo frequenter & diu in ore de- tentus. Cataplasmate sequent. in praxi nostra quan- tus usus sum, ʒi. pulp. raparum coct. ʒiv. herb. rut. contus. m. ij. sem. sinap. ʒj. pulp. alb. græc. euphob. n. ʒij. sulph. viv. ʒiij. ol. succin. g. 100. ung. ner- in. q. f. m. f. cataplasma gulæ applicandum.

Art. 848. In paralyti linguæ solus succus salviæ Paraly- obtumescencia solvit; sequente gargarismate felici cum sis lin- successu in praxi aliquando usus sum. guæ.

ʒi. Fol. salviæ rorismarin. ana m. j. hyssop. puleg. ana m. j. sem. staphid. agr. sinap. ana ʒj. coq. in q. ad font. ab Itj. Colaturæ add. succ. salviæ depu- rat. ʒij. oxymel. scillit. aq. regin. Hungar. ana ʒj. syr. achad. ʒiij. m. teneat coct. ij. in ore aliquandiu & deinde expuat, idque fiat frequenter in die.

Art. 849. Arbitramur (ait Lancisius) potissimam Cur- causam facilioris solutionis Paralysis in cruribus esse quædam directionem vasorum; tum sanguinis, tum spiritus partes animalis proxime ad perpendicularum positorum; con- ægrius tra vero causam curationis difficilioris in brachiis es- quædam positionem vasorum transversalem, per quam ea- facilius dem constituuntur ad rectos vel rectis proximos an- recupe- talos cum arteria magna, vena Cava, & spinali Medul- rentur, . Liquida enim, quæ per directionem, perpendi- ulari proximam fluunt; expeditius moventur, & impedimenta quæ ipsis obijciuntur, promptius amo- vent, quam eadem liquida si flexuoso, aut angulari

itinere devolvantur. Compertum est venæ sectionem sæpius repetitam malum plerumque exacerbare, illiusque frequentioribus accessionibus viam sternere: in ejus vero locum scarificationes sex vel octo cucurbitulis administrandas commendamus.

Celsi ob- *Art. 850.* Solent, qui per omnia membra resoluti  
servatio- sunt, celeriter rapi; at si correpti non sunt, diutius  
quidem vivunt, sed raro tamen ad sanitatem perve-  
niunt, & plerumque miserum spiritum trahunt, me-  
moriam quoque amissa. *Celsus.*

Curan- *Art. 851.* Cura hujus mali a curatione *luis vene-*  
da est *ree* non abludit multum, adeoque *mercurialia*, *sudo-*  
ut lues *rifera*, *decoct. e lign.* &c. profunt. Externe *inun-*  
venerea. *ctionis*, *spirituosa* & *penetrantia* non in parte affe-  
cta, sed in spina dorsi; ut *unguentum nervinum*,  
*martiatum*, *ol. tereb. sal. volat.* &c. Item maximo cum  
emolumento sequens emplastrum spinæ dorsi admove-  
tur; 4. *Empl. de ranis cum quadruplo mercurio* 3j.  
*camphor.* 5i. malaxetur cum *ol. succin.* & fiat em-  
plast. *Waldschmid.*

Tinctura *Art. 852.* Tinctura antiepileptica *Pitcarnii*, in c. de  
Pitcarni *epilepsia* tradita purgantibus orba ab authore laudatur.

Remedia *Art. 853.* Virtutes & usus remediorum sequentium  
alia va- lector ipse expendat: *Cataplasma de rapis*, *cinna-*  
ria. *baris antimonii*, *emplastrum de pyrethro*, *enema apo-*  
*plectic.* *enema terebinth.* *fotus spirituosus*, *galbanetum*  
*Sennerti*, *guttæ Goddardianæ*, *infusum cephalicum*,  
*linimentum paralyticum*, *oleum lumbricorum* (per  
distillationem mira præstat) *pluvis ad guttetam*, *spi-*  
*ritus sanguinis*, *succi scorbutici*, *tinctura canthari-*  
*dum*, *tinctura epileptica*, *unguentum ad atrophiam*,  
*unguentum salino volatile.*

Alter- *Art. 854.* In simplici Paralyfi seu in ea, quæ ab  
curatio. Apoplexia non dependet sanguiniseductio necessaria  
nis me- omnino non videtur, sed exordium ab Emeticis.  
rhodus. quorum uno alterove propinato acris Clyster jubebi-  
tur, quemadmodum sequens est.

Clyster. 4. *Senn. unc. j. aq. commun. lbj. sem. ebull. ad con-*  
*sumpt. tertiæ part. colat. add. Vini Emet. turbid. unc.*  
*j. Hieræ colocynth. unc. j. sem. f. clyst. loco vini Eme-*  
*tic. & Hieræ prædictæ addi potest ipsius colocynthid.*  
*unc. sem. si viridis est vel 3ij. si sicca.*



Præterea pulveres sternutatorii quoque conveniunt : Sternu-  
tatoria.  
ut qui ex Betonica, Salvia, Lauro, Nigell. Roman.  
& Hellebor. alb. parantur, atque externe Lumbrico-  
rum oleum vel Petroleum &c. fricando artus inungi-  
tur, a nucha vero usque ad lumbos frictiones habeantur  
cum spir. Vini Camphor. Lavendul. circa dorsi  
spinam frictionibus insistendo.

*Art. 855* Hujusmodi externa remedia, cum pluri-Pomata  
mum opitulentur, nullo modo præteriri debent. Qua-  
re alterum hic sistimus plurimi habendum, cujus usus  
diu continuandus.

*℞. Visc. pomor. man. iiij. contundant. in mortario,  
dein coq. cum axungia dulcis suis lib. j. sem. per ho-  
ræ quadrant. expressæ; decoctioni add. Cerae unc. j.  
thuris ℥ij. m. super ignem tempore iiij. vel. iv. mi-  
nutor. semper agitando, & conservetur pomata.*

Pro ejus usu primo coram igni fricatur æger, ma-  
dore partes paralyticæ maxime vero juncturae hac Po-  
mata inunguntur, cujus quantitas fabæ magnitudinem  
exæquans manibus arrepta inter fricandum linquitur ut  
liquefcat; dein mappis calidis confricati artus obvol-  
vuntur. Hujusmodi linctus ter in die repetitur, iisdem  
mappis semper adhibitis, quæ cum priorem adipem fe-  
rant, minus absumunt de eo, qui noviter apponitur.

*Art. 856.* Loco hujus pomatæ sequens etiam usur-Pomata  
altera.  
pari potest ab eodem descripta, qui Auctor est Diction.  
Medicinal. Bruxell. evulgati.

*℞. Butyr. recent. non saliti, Viniana lib. j. salv.  
rorismarin. hyssop. minut. concis. ana man. j. coq. per  
hor. dimid. colat. fortiter express. add. Vin. spir. ciath. i.*

*Art. 857.* Miras habet virtutes ad hunc morbum se-  
quens quoque linimentum.

*℞. Ol. laurin. Terebinth. ana unc. iiij. Ol. Nard.  
Petrolei ana unc. ij. Vini Carini vel Hispaniac. unc.  
iiij. Sp. Vini unc. ij. coq. usque ad Vini consumption.,  
& versus finem add. Piper. pulv. unc. sem. Rad. Py-  
retr. pulv. ℥ij. Castor. pulv. ℥vj.*

*Art. 858.* Quo linimento collum, dorsi spina, &  
lumbi coram insigni perfricantur, inde vero mappis cali-  
dis loca fricata obteguntur. Id vero non expeditur,  
nisi æger antea purgetur. Purgatur enim mediante gu-  
num. Gutt. gr. iv. Mercur. dulc. gr. x. & Extract. Hel.  
leb.

leb. nigr. gr. iv. Hujus autem extracti præparatio ita se habet.

Extra-  
ctum  
Helleb.

℥. Hellebor. nigr. pulverat unc. j. infund. in cyath. sp. vin. & diger. super cineres calidas sæpe miscendo ut vin. sp. tinctur. extrahat. Ubi videris tincturam eductam, eandem decanta, & super remanentiam tantundem sp. vin. noviter affunde simul identidem miscendo, donec rursus aliquantisper tingatur, atque liquore hoc etiam decantato cum priore in vase vitreato ad cinerum calorem inditur, ut ad extracti consistentiam evaporet. Hujus extracti dosis est ad gr. x.

Si spatio duodecim dierum tres hujus extracti doses debitis intervallis assumantur, qui alvi segnitie laborant, id commoditatis sibi vindicant, quod ut cetera purgantia post effectum alvum segniorem relinquant, hoc contra eandem lubricam deinceps facit.

Topicum  
aliud.

Art. 859. Storcherus sequens Topicum ad Paralyfin magnopere commendat.

℥. Urtic. maj. man. iiij. Chamæmel. man. j. sal. commun. unc. iiij. cumini unc. j. contud. in mortario & cum aq. commun. lib. v. coq. ad consumpt. quartæ partis.

Hac vero decoctione membra paralytica abluuntur mane, & vespere quotidie, quæ inde mappa eodem liquore inebriata obvolvuntur, & quatruiduo prætergresso ol. vulpini usque ad perfectam sanationem inunctio continuatur.

Balnea  
artifi-  
cialia.

Art. 860. Artificialia Balnea ad hunc morbum quoque laudantur. Eadem vero sequenti ratione parari possunt.

℥. Bacc. Laur. sulph. viv. ana lib. sem. Rad. gentian. man. iiij. enul. campan. aristoloch. long. ana man. ij. concis. radicibus eadem cum reliquis coq. in aq. cummun. f. q. pro Balneo.

Nota  
bene.

Art. 861. Purgantia fortiora in hujus morbi principio angue pejus sunt vitanda cum non raro mortem intulerint; eadem in primis admodum efficiunt, quando paralysis vel Scorbuto vel Colicæ succedit. Eadem quoque cautio adhibenda est pro Clysmatum usu, quæ principio nisi emollientia juberi debent, progressu vero etiam acria, ut ea sunt, quorum supra meminimus, ( §. 854. ) vel ut sequens se habet.

℥. Salv. origan. centaur. min. ana man. j. pulp. pomi colloquint. f. decoct. pro Clystere.

Art.

*Art. 862.* Plurimum item ad hunc morbum decoctio celebratur Baccar. Juniper., & Lauri, cujus aliquot propinatis cyathis, æger ad sudandum disponitur.

Sudoriferæ.

*Art. 863.* Pro potu communi in Paralyfi Ptisana quædam jubenda est normam sequentis.

℥. Aq. commun. lib. ij. in qua per hor. quadr. ebull. Rad. Irid. flor. unc. j. mell. unc. ii. Durante decoctione Mel despumetur, & colat. sit pro usu.

Potus communis.

*Art. 865.* Si morbus Apoplexiam consequatur, remedia supra titulo Apoplexiæ commendata diutius continuanda, quarum dosis tantum & tempus eadem sumendi, habito respectu circumstantiarum, temperari debebunt. Nam minus equidem frequentes porrigi possunt, sed simul danda opera, ut frictionibus membra affecta in pristinum restituantur.

Curatio Paraly-  
sis ab  
Apople-  
xia.

*Art. 865.* Monendum est, quod si pars affecta extenuari, & contabescere incipiat; aut temperamentum ægri ad biliosum vergat, inter habendas frictiones penetrantia, & subtilia nimis remedia caveantur.

Nota bene.

*Art. 866.* Utilius quod dari potest consilium iis qui Paralyfi correpti fuere est: ut quevis anno ad Aquas Minerales sulphureas se conferant, ut sunt eæ ad aquas Sextias ad *Burbon-Lancy* ad *Vichy* &c. in Gallia, & *Bathonianæ* apud Anglos. Si vero incassum harum aquarum usus cedat, quidam Practicus consulit, ut æger tanquam ad ancoram sacram ad Balnea Montis Auri Alvernia confugiat; maxime vero ad Balnea Neryniana, quæ sæpe optimos præstitisse effectus testatur, modo per plures annos addeantur.

Aqua-  
rum mi-  
nerali-  
um u-  
sus.

## C A T A L E P S I S.

*Art. 867.* Catalepsis seu Catoche, Latinis & Arabibus congelatio dicta, est affectus in quo ægri manent rigidi in eodem statu, quo prehensi fuerunt: interdum tamen nonnihil audiunt, vident, recordantur, & post narrant; si quid ori ingeratur deglutiunt, impulsu incedunt. Milites in obsidione Metensi hastam in manibus tenuerunt, equites turmam sequebantur, non minus quam congelati. Est morbus raro occurrens atque acutus, intra 3. aut 4. ad summum dies jugulans; quandoque sit metastasis in epilepsiam, apoplexiam, rarissimè vel

Catale-  
psis.

Raro  
occur-  
rit, &  
raris-



sime cu- vel *melancholiam*: in genere paucissimi restituuntur;  
ratur. nemo liberatur, cui secundo catochus supervenit.

*Ettmulleri sententia.*

Morbi  
descri-  
ptio.

*Art. 868. Catalepsis seu catoche, est affectus rarif-  
simus, & summe mirabilis; in quo cessat omnis sen-  
sus internus, & externus, & motus, ita ut ægrorum  
membra rigida sint, & instar statuarum in sua positu-  
ra; impulsa tamen moventur, sed tamen denuo in ista,  
per motum acquisita figura, fixe permanent. Vulgo pro  
ecstaticis habentur in hoc affectu ( inquit Dolæus )  
alvi ac urinae fit suppressio; respiratio tamen inte-  
gra, & illæsa manet, & sanguinis circulatio, ægri  
vero immoti manent, instar Marpesiæ cautis.*

Curatio.

*Art. 869. Quoad curam, in genere ab omnibus  
practicis tam veteribus quam neotericis hunc morbum  
ejusdem farinae medicamentis, quibus Apoplexiam  
curari lectori patebit; unde jure merito apoplexia in-  
versa nuncupatur. Remedia omnia prosunt, quæ vis-  
cidum quodcunque incidere vel attenuare, & pro ra-  
tione occasionis evacuare valent; excellunt salia vola-  
tilia; conveniunt vomitoria antimonialia, epispastica,  
antispasmodica, antiparalytica, &c.*

*Boerhaavii sententia.*

Causa  
proxima

*Art. 870. Hujus morbi causa proxima est immobi-  
litas sensorii communis, prout primo momento insul-  
tus se habebat. Ergo sanguinis cerebrosi, glandularum  
cerebri, emissariorum ejus absoluta est quies, ut in  
initio. Omnes quidem in eo morbo functiones cerebri  
læduntur, & illæ, quæ inde pendent; soli muscoli sic  
manent tensi, ut in initio erant; cæterum respiratio &  
pulsus superfluit, at plerumque leves. Diffecta cadave-  
ra demonstraverunt arterias venasque cerebri valde tur-  
gentes, fortiter impacto denso cruore; in morte ple-  
rumque finitur.*

Curatio.

*Art. 871. Solvitur interdum larga narium hæmor-  
rhagia; ideoque curatio tentatur hæmorrhagiæ ex na-  
ribus prolectu, hæmorrhoidalis, menstruivæ fluxus pro-  
lectu; sternutatoriis, vomitivis. vesicatoriis: fonticu-  
lis ( interscapularibus ); setaceis; victu humectante.*

*Inter legendum, & observandum.*

*Art. 872.* Catalepsis universum corpus repente in tali situ, quo illudprehendit, firmissime rigidum detinet, ut gestus oris, oculorum, ac membrorum plane eosdem fervet: rarissimus est affectus. Defectio & signa.

*Art. 873.* Curatio hujus morbi duplex est, vel tempore paroxysmi, vel extra eundem. In paroxysmo a calidioribus stimulantibus abstinendum est, si morbus ab humorum nimio orgasmo, expansione, ac stagnatione oriatur: ut maxime in hystericis. Curatio in paroxysmo.

*Art. 874.* Extra paroxysmum curatio varia esse debet pro diversitate causæ morbi, si oriatur a copia sanguinis vel a consuetis suppressis hæmorrhagiis per idoneas phlebotomias occurritur, aliisque congruis remediis opitulatur. Si a melancholia, evacuationes sanguinis nocerent; sed victus humectans, blanda solventia, & spirituosæ remedia profunt, ut serum lactis, fructus horæi, mel, vini spiritus, & similia. Similiter hæc omnia juvant si catalepsis per diuturna febres exhaustum corpus prehenderit. Si ex validis animi affectibus optimum remedium imo unicum peregrinationes, & suscepta itinera exhibent. Extra paroxysmum.

*Art. 874.* Sternutatoria absque successu in paroxysmo adhibita sunt, vomitoria quidem utilius, ubi mali fomes circa ventriculum sit. Nota bene.

### S T U P O R S E U T O R P O R , & obdormitio membrorum.

*Art. 878.* Stupor vel torpor in genere est sensus tactus vel motus, vel utriusque imbecillitas, quæ quidem plerumque est aliqualis paralysis scorbutica inchoata; saltem istius morbi plerumque est prodromus. Si plura simul occupet membra hemiplegiam aut apoplexiam minatur. Stupor in facie torturam oris portendit. Stupor seu Torpor.

*Art. 877.* Huc quoque pertinet affectus a quibusdam obdormitio membri unius vel plurium vocatus. Hæc obdormitio videtur esse affectus ex torpore, & dolore aliquali simul mixtis, qualis a causa Obdormitio initio.

externa plerumque excitatur, compressione scilicet membri vel nervorum in eo, unde influxus spirituum animalium inhibetur, qui postea laxatis nervis copiose, & subito in illud recurrunt, & subitam alterationem faciunt, quam dolor ille vel molestia sequitur.

Historia  
singula-  
ris.

Art. 878. Novi quemdam fere sexagenarium, colica nervosa diuturna laborantem, nimirum triginta plus minus annos per menses aliquot illum quotannis affligente, in hunc affectum tandem incidisse silente fere colica aut saltem leviter ac impotenter dolente, nempe in stuporem, & torporem, & obdormitionem brachiorum & crurum, precipue quæ manuum, & tarsorum, & musculorum ocularium. Huic imperavi rhabarb. j. vel ℥ss. alternis vel tertiis diebus hora aliqua antemeridiana masticare; opobalsami purissim. gr. xx. vel xxx. in sacchar. crystall. instillat. semel vel bis in die deglutire, cerevisiam, & spiritus ardentis omnimodis prorsus interdixi. Porro bis tantum in die victum capere consului; jentaculum scilicet, & cœnam, idque ad intervallum novem ad minimum horarum omisso prandio; Aquam Spadensem inter cœnandum ad sitim potare loco cerevisiæ tenuis, vel aq. commun. atque ex hac methodo, dum hæc scribo, melius se habere videtur. Vires Pisselæi Indici nondum expertus sum.

## T R E M O R.

Ettmulleri sententia.

Art. 879. Tremor est malum morbis convulsivis affine, in quo cum motu naturali, & voluntario simul aliquid convulsivi concurrit; est affectus seipsum oculis prodens. Tremor supervenit animi passionibus gravioribus speciatim iracundiæ, & crapulæ; sed hic est accidentalis & transitorius; metalli fossiores; & metalli fabri subinde tremunt; nimia Venus ad tremorem disponit; senio confecti fere semper tremore plus minus afficiuntur.

Prognosis.

Art. 880. Tremor interdum periculosus est, quoniam



niam facile degenerat in alios graviores affectus nervinos, in *paralysin*, *apoplexiam*, *lethargum*, *spasnum*, &c. in senibus est incurabilis. Tremor qui supervenit mulieribus post partum ex retentis quibuscunque in utero est periculosus affectus; subinde enim *epilepsias* lethales infert.

*Art. 881.* Tremori succurrunt omnia, ea, quæ in *paralyticis*, *apoplecticis* & *convulsivis* morbis conveniunt, & quæ nervina dicuntur: privatim *cerevisia salviata*, *proximo loco stæchas Arabica*, & *rosmarin. melissa*, *majorana*, *radix*, & *semen pæon. bacc. juniperi*, *rob. ejusdem*, *decoctum e lignis*, *aromata*, *castoreum*; *stercus pavonis*, *cinnabarini*, &c. Quoad externa eadem sunt ac in convulsione tonica, quibus addi potest *usus thermarum* ( *psychrolusia* . )

### Farrago sententiarum.

*Art. 882.* Tremoris curatio inquit Auctor diction. Medicinal. exordienda semper est remediis, quæ ob- Alia  
structiones tollunt, quemadmodum Pulvis est aperiti- quædam  
vus, & correct. universalis Helvetii, cujus præpara- remedia  
tionem in Tractatu suo de frequentioribus morbis præstat Tom. I. pag. 201. Similis huic est quem mox subnectimus.

*℞. Croc. mart. aperitiv. rorepp. unc. ij. St ib. diaph. solar. ℥ij. cinnab. nat. succin. flor. Benz. ana ℥ij. sal. sabin. ℥ij. Cinamom. macis ana ℥j. sem. fæcul. bryon. Ari ana unc. sem. f. pulv. subtil. cui add. essent. caryophyll. fœnicul. ana gutt. xxx. & in phiala probe clausa servetur,*

Hujus pulv. gr. xx. mane stomacho jejuno, cum azymo ingeruntur vini cyathum aqua mixti superbibendo, inde ad incedendum æger pergat, ut facilius medicamentum e stomacho egredi possit. Eadem dosi itidem tribus vel quator horis a prandio ingeritur, similisque iterum vespere vel dum cubitum itur. Sic usque in triduum continuatur; quarto vero die purgans sumitur, vel si stomachum gravatum sit vomitorium. Tum pulveris usus die sequenti renovatur, & sic persistitur usque in quartum, quinto vero purgans sumitur, & eadem methodo reiteratur pulvis per quin-  
que

que dies, & purgans fumitur sexto. Si opus est finita hac Methodo iterum iterumque a principio renovatur, quia credibile non videtur in morbi inveteratis, nec cito, nec facile posse salutem recuperari.

Hujus item pulveris vires non solum in hac affectione juvant, sed etiam Melancholiam Hypochondriacam, Scorbutum, Hæmorrhoides, & pallidos Virginum colores egregie sanant, modo continuetur usus quousque diuturnitas affectionis reposcere videtur.

Ad ma-  
nus tre-  
morem. *Art. 883.* Si manus tremunt, oportet easdem ter in die, præcipue mane, sequenti decoctione abluere, *℥. Urinæ hom. sani lib. iv. aquæ in qua fabri ferrarii candefactum metallum extinguunt tantundem sol. Artemis. man. vj. coq. usque ad tertiæ partis absorptionem.* Nulla colatura hujus decoctionis instituitur, sed arrepta herba incocta, eadem manus confricantur; carpique abluuntur.

Tremor  
a fumo  
metalli.  
co. *Art. 884.* Si ab Hydrarg. tremor veniat, vel a quovis alio metallo Hochsterus pro specifico sequentis potus usum celebrat.

*℥. Rad. cannæ unc. ij. fœnicul. unc. j. cerevis. vel Vini lib. ij. sem. coq. ad tertiæ partis absorptionem, & colat. sit pro usu.* Hujus subinde cyathus propinatur cum regimine calido, & sudor elicitur.

Alia To-  
pica. *Art. 885.* Quoad huc facientia Topica Forestus laudat frictiones cum ipsa ægri urina. Similiter membra tremientia ablui possunt Aq. urtic. Mens. Maji collectæ; item olea Nard. Lumbric. Salv. Majoranæ & Lauri plurimum præstant ut etiam Unguent. martiatum &c.

Prognosis. *Art. 886.* His similibusque auxiliis, qui ætate valde non invalescunt, facile roborantur, firmanturque, senes contra ab habituali inveteratoque tremore nunquam liberari possunt.

## C O N V U L S I O.

Convul.  
sio ejus-  
que di-  
visio. *Art. 887.* Convulsio sive contractura est nervorum musculorumque versus suam originem, involuntaria, & perpetua retractio, & ita distinguitur a motibus convulsivis, qui suas habent interpolationes; Estque vel *universalis, tetanus dicta, qui dividitur in emprost-*  
*thoro-*

CAP. III. Tremor, & Convulsio. 303  
*thotonum*, & *opisthotonum*, vel *particularis*, quæ mem-  
brum quoddam vel articulum privatim respicit, hujus  
speciei est *spasmus cynicus*.

*Hippocratis sententia.*

*Art. 888.* Convulsio dicitur de illis partibus nostri corporis, quæ contrahi possunt; atque in illa contra-  
ctione perillere; & propterea non contrahuntur hu-  
mores, quod fluxites sunt, nec contra ossa, quia omni-  
no stabilia. Contrahuntur igitur illæ partes, quæ me-  
dium tenent locum, veluti quæcunque vel nervi sunt,  
vel de nervis participant.

*Art. 889.* Causæ convulsionis sunt, vel nimia calidi-  
tas cum superflua humiditate, vel nimia frigiditas cum  
adjuncta siccitate, quare convulsio fit a repletionem  
vel ab innanitione; attamen eadem quandoque fit ab  
aliquo conjuncto absque ulla qualitate, vel materia in  
re attracta, quemadmodum si dum ventriculus attrahi-  
tur, viscus insequens attrahatur. Hinc eadem causæ,  
vel sunt intrinsecæ, quemadmodum hæ, quas diximus,  
vel extrinsecæ veluti ex hellebori potione, ex vulne-  
re, ex sanguine multo fluente; ex immodica purgatio-  
ne ex ebrietate, ex aeris constitutione frigida, & hu-  
mida, ex vigilia, ex labore, & violentia atque ex  
æstu vehementi.

*Art. 890.* Tres sunt convulsionis species, quarum  
prima appellatur *Tetanus*, & est quando cervix una  
cum reliquo corpore immobilis manet, & in neutram  
partem inflecti potest. Hanc latini vocant *disensionem*,  
& Celsus *rigorem*. Secunda nuncupatur *Emprostho-*  
*tonus*; & hæc fit quando caput, cervix, reliquumque  
corpus in pectus contrahitur. Tertia nuncupatur *Opi-*  
*sthotonus*; quæ fit quando caput in scapulas convel-  
litur.

*Art. 891.* Subjiciuntur convulsioni caput dolentes,  
exsudantes, & alvum suppressam habentes. In denti-  
tione ubi alvus parum deponit, & febris acuta non  
accedit, sed altiore somno pueri utuntur. Qui post ac-  
ceptos in ulceribus humores ab iisdem præter ratio-  
nem liberantur.

*Art. 892.* Quartanis capti non convelluntur, si ve-  
ro con-



ro convellantur, quartana ſuperveniente immunes ſunt. Si ebrius quidam repente obmutuerit convulſus moritur, niſi febre corripitur, nam qui a convulſione, aut diſtentione nervorum tenentur, febre ſuperveniente liberantur, contra vero ſi convulſio in febre appareat febris eadem die, aut poſtera, aut tertia ſedatur. Quare febrem convulſioni ſupervenire melius eſt quam feбри convulſionem; atque adeo ſi puerperis convulſio fiat, febrem excitato: & cerato multo tepido in veſicam immiſſo ac per clyſterem infuſo colluito. Convulſio ex helleboro, ex vulnere, ex hæmorrhagia, ex vigilia, ex ileo, ab angina abſque tumore in faucibus, ex febre acuta, ex medicamento potione mala eſt, ſæpe vero lethalis; maxime ſi eadem die non deſinat, nam qui convulſionibus corripuntur quatuor diebus pereunt, ſi vero hos effugerint ſani ſiunt.

*Art. 893.* Convulſioni ſic mederi oportet. Ignis ab utraque leſti parte ſuccendatur, & mandragoræ radix in potu præbeatur, minore tamen pondere, quam quod infaniam facit, & ad tendines poſteriores ſacculi imponantur; non articulos induratos, vel ab inflammatione prægreſſa, vel a convulſione operæ pretium eſt ſanare aqua calida in utriculam infuſa ac ſuperimpoſita.

### Schmitzii ſententia.

*Art. 894.* Spasmus cynicus, qui eſt diſtortio utrumque latus oris obſidens ( ſin vero alterutrum tantum latus convellatur, *tortura oris* dicitur, *Etmuller.* ) a rictus canum ira percitorum & ad mordendum ſeſe comparantium ſimilitudine appellatur. Ex ſe turpe eſt malum & difficile curatu, exitium morborum, ut *apoplexiæ*, aut *epiſtleſiæ* non raro eſt prodromus. *Ligatura*, qua, tanquam capiftro, facies ad figuram naturalem reducat. Medicamenta *antiparalytica* & *antipafmodica* ſunt uſurpanda. Pro homine quodam octogenario ſequens linimentum præſcripſi, non neglectis interim appropriatis internis quorum nunc oblitus ſum; & præter ſpem omnem curatus eſt. 24. ſapon. venet. ſij. camph. ſij. ol. mac. per expreſſ. aq. re-

aq. regin. Hungar. ana ℥ss. sp. sal. armoniac. gr. xxx.  
 ol. junip. gr. xl. ol. castor. ℥ss. misce,

*Cæli Aureliani sententia.*

Art. 895. Interdum buccas adducit in posteriorem partem tanquam ridentibus; nunc palpebras, & nares, collum etiam, atque humeros rapit, & ita patientes facit commoveri tanquam onus humeris bajulantes transferendi ponderis causa ( sed hæc species videtur esse *emprosthotonus*. )

Aurelia.  
 ni de.  
 scriptio.

*Aliunde.*

Art. 896. In hujusmodi spasmis particularibus post evacuationes ( si indicentur ) factas, exhibenda sunt remedia antiscorbutica, & antispasmodica: Inter hæc eminent expressiones millepedum, castoreum, elixir pæoniæ & decoctum guaiaci, & ultimo ad topica deveniendum est; pars affecta, in artuum contracturis, si fieri possit, in intima bovis aut vervecis recens cæsi immittantur, & ibi tamdiu detineatur, quamdiu animal calet; commendantur balnea præcipue sulphurea, & balsamum galbani terebinthinat. a Sennerto.

Curatio.

*Ettmulleri sententia.*

Art. 897. Convulsio tonica est convulsio proprie dicta, viz. quando pars convulsa rigida manet, ac metus est, nec omnino contracta permaneat. In India orientali epidemicum malum est varii veneris convulsio, de quo eleganter scribit Bontius.

Convul.  
 sio to.  
 mica.

Art. 898. Inter universalia clysmata sunt valde procu-  
 aqua; remedia interna sunt: carminativa, cephalica, antiepileptica, in pertinaciori malo decoctum e lignis. Externe linimenta spirituosæ & penetrantia, specia-  
 lum lumbrici vivi applicati, ol. & sp. lumbricorum camphorat. ol. succin. cum petrol. galbanetum Para-  
 elsi cum ol. euphorb. ol. terebinth.

Curatio.

## Aliunde.

spasmi sine motu. *Art. 899.* Spasmi sive motus convulsivi sunt contractiones musculorum non constantes, sed cum intertus convulsivi. *jecta aliqua quiete alternatim cessantes & celeriter redeunt* ab involuntario & irregulari spirituum animalium influxu. Tales cernuntur in *epilepsia*, in *passionibus hystericis* & *hypochondriacis*, aliquando in *scorbuto*, in *febris malignis* male judicatis, in *capitis vulneribus* & *contusionibus gravioribus*, &c. sed hi affectus seorsim tractantur. Motus convulsivi sive spasmi ab ataxia spirituum a summitatibus vel originibus nervorum inordinate descendentium oriuntur. *Tensio convulsiva* solidorum partium est una ex primariis causis, quæ *equilibrium* destruunt inter solidas & fluidas. Jour. des Scav.

*Art. 900.* Lethalis evadit convulsio ex eo solum, Unde lethales, quod suffocationem inducat convulsis musculis respiratori dicatis.

## Farrago sententiarum.

*Art. 901.* In acutis morbis, maxime circa finem, Prognosis. convulsiones sunt lethales: ut in phrenitide &c. Ab iis magis periclitantur pueri quam adulti. Si mulier ex abortu convellatur, raro evadit, nisi vapores sint in causa. *Aræteus*. Narcotica convulsiones a doloribus & vigilia productas sedant; sed si convulsio cum somnolentia, & epilepsia conjugatur, periculum augent.

*Art. 902.* In curatione convulsionis generalia remedia, primo tum specifica usurpanda sunt. Et si pul- Remediasus bonus appareat; nihil magis phlebotomia juvat. quædam. In habitu vero corporis pituitoso pulvere cornachino alvum purgato. *Baglivus*.

*Art. 903.* Convulsiones formam sæpe mutant; & diversorum morborum speciem simulant, nam & tussim, & colicam, & asthma, & vomitum, & Ileon & tympanitidem, & cardialgiam, & nephritidem faciunt. In iis omnibus morbis ab hac causa productis *Laudano* feliciter obviam itur.



## S I N G U L T U S.

## Tralliani sententia.

*Art. 904.* Singultus est motus diaphragmatis convulsivus. *Sternuatio* singultui superveniens illum solvit, quoniam est motus spasmodicus ei contrarius. Interdum est malum diuturnum per plures dies, menses, annos, affligens; aliquando penitus incurabilis, in quo casu occultum quoddam conformationis vitium, os ventriculi aut diaphragma; aut nervos afficiens, fere subesse solet.

*Art. 905.* Quoad curam (est morbus *primarius* Curæ vel *secundarius*; si *posterior* habenda est ratio morbi a quo pendet, in genere *antispasmodica* & *stomachica* sunt adhibenda) *Laudanum* cum *cardiacis*; *zinzib. condit.* *stomachica*, *carminativa*, præmisso vomitorio, vel *purgatione cum calomel.* &c. Externe cataplasma ad singultum *Mynsicht*; quod componitur ex *fermento acri cum pulv. ment.* & aliis *aromat. cum ol. castor.* &c. malaxat. Quidam cum spongia aut pane calido applicant ventriculo fotum humidum factum ex *aceto cum castoreo*; *pipere* & *sinapi cocto*. Interne *pelliculæ internæ ventriculi gallinæ* exsiccatae & pulverisatæ. Ubi pertinacior perdurat (in morbo *primario*) ad septimanas aliquot in corpore robusto semper provocandus est vomitus.

*Art. 906.* Virgo hoc morbo laborans per longum *spiritus* tempus post permulta remedia incassum tentata; solo *eruginis* *spiritus eruginis* ab empirico exhibito curata fuit. *Bozetus*.

*Art. 907.* Eruditus medicus usum remediorum sequentium probe calleat, *aurum Mosaicum*; *cataplasma stomach.* *fotus spirituosus*, *fotus stomachicus*. Et præ reliquis *julap. muscatum*, quo nondum hactenus novius præstantius remedium (inquit *Fuller.*) aliquando enim *vinicus* succurrit, & singultum superat. Hanc veritatem testatur *praxis nostra*. *Diascordium* larga dosi ad *Remedia singultus* *ij.* in febribus, *Sydenham.* (imo ad *iiij.* dari potest.) *Art. 908.* Si causæ singultus fuerint viscosæ, & ex viscidissimæ, cum hic affectus sit stomachicus, acetum judicatur.

vat, præcipue, quod vocatur scilliticum, ita oxymel, quod ex eo comparatur; item vomitum ciere. Singultientibus ex hac causa decoctum spicæ nardi, & rutæ auxiliatur, tum etiam mulsa. Usus autem sum, præter hæc etiam extrinsecus in stomacho, castoreo, styrace, & mastiche, oleo ipsa incoquens, & stomachum vehementer ex eo fovens. Porro castoreum, & potum, & olfactum in his probe opitulatur, item nardus gallica, asarum, spica nardi, anisum, cuminum, & ligusticum.

**Ex acredine.** *Art. 909.* Quodsi recrementa rodentia, & corrupta fuerint in causa, temperata aqua utendum est, & pane ea imbuto, ptisanæque copiosa, pisciculo, qui acetum paululum habeat, & pullis columbarum; hujusmodi vero singultientes purgandi non sunt.

**Ex inanitione.** *Art. 910.* Sin autem ob evacuationem aut febrim singultus accedat, talis merito quidem periculosus est, quare utendum aqua creberrima, unctione, & omnibus, quæ evacuatis adhibentur. At in inflammatione, ea quæ actu frigida sunt vitari debent, sed continue tepida usurpanda, paulatim ea sorbendo.

**Nota bene.**

*Art. 911.* At si multis atque multis tentatis æger nihil levetur, festucam, aut lapillum, aut simum ex terra sublatum singultientis capiti, ipso ignorante, imposito ac statim singultus desinet. In Cyrene hoc quoque didici. Singultiens contineat manu sinistra calculos suffragiorum 40. & capiti superimponat, ac statim singultire desinet. Castoreum alligatum cito singultum finit. Cuminum quoque panniculo lineo inditum brachiali sinistrae manus alligato, hoc Æthiopes ad austrum habitantes facere dicunt. Nonnulli vero panis fracti micam auri singultientis tacite imponunt, & fragmentum olfaciunt, liberanturque, alii vero rutam ex vino, aut mulsa coctam potui præbent, alii apium, aut castoreum &c. Eximie facit etiam gargarizatio, & aurium, orisque detentio. Non autem oportet pleraque contemnere &c.

### *Farrago sententiarum.*

**Prognosis.** *Art. 912.* Singultus in dysenteria lethalis, tum etiam in hæmorrhagiis, malus item ex hypercatharsi.

In



In ileo, in hepatis inflammatione, in Colica, tum in omnibus inflammationibus, & gangrenis perniciosus est.

*Art. 919.* Curatur phlebotomia, & purgantibus sæ-  
pe repetitis, maxime vero potu lactis vacini, nec non  
ol. amygdal. dulc. julapiis; emulsionibus, aliisque hu-  
jusmodi. Narcotica quoque conveniunt, & vomitus  
excitari potest, vino emetico cum infusione fol. sen-  
næ propinato. Hæc autem cuncta remedia habita ra-  
tione circumstantiarum, & ex cognitione causæ singul-  
tum facientis cum prudentia, & grano salis adhiberi  
debent.

*Art. 914.* Sternutationem singultorum tollere docuit. Nota  
Hippocrates, quod etiam occurrit in Platonis dialo-  
gis, sed hoc semper semper verum non est, maxime  
si a ventriculi repletionem, aut ab irritante humore af-  
fectio hæc producat.

## S T E R N U T A T I O.

*Art. 915.* Sternutatio est motus convulsivus muscu-  
lorum expirationi inservientium & diaphragmatis; no-  
vis invitis accidit plerumque ex acrimonia humoris e  
glandulis narium sponte erumpente; vel ptalmicis ex-  
citatur; immo aliquando ab ære frigido vel radiis so-  
laribus.

*Art. 916.* Sternutatio nimia est morbus de genere  
convulsivorum; ideoque in genere eandem curam po-  
stulat; lenientia & mucilaginosa naribus attrahenda  
sunt; eandem fere curam admittit, ac singultus.

*Art. 917.* Ad inhibendam sternutationem a lymphæ  
cris defluxu productum commendatur compressio an-  
guli majoris oculorum prope nasum digitis facta, dum  
altera manu simul nares clauduntur, ut lymphæ inde  
effluens non per nasum, sed per oculos egrediatur.  
Hoc enim creditur, sternutationem protinus sistere.  
Uvat etiam si naribus lac calidum, vel ol. amygdal.  
dulc. attrahatur: Si vero magna insistentia, & im-  
portunitate sternutatio perennet corpus hydragogis pur-  
gandum est, vel etiam pyrethr. rad. pip. euphorb.  
aliisque salivatoriis masticando lymphæ copia irritan-  
s alio est divertenda.



## E P I L E P S I A .

Ettmulleri sententia .

**Epilepsia.** *Art. 918.* Paroxyfmi epileptici sunt motus convulsiivi, in quibus universum corpus, aut plura membra diversimode contrahuntur, vibrantur, aut agitantur. **Tres sunt gradus.** Tres sunt gradus hujus affectus; primus parum differt a tertio gradu *vertiginis*. In secundo gradu adfunt agitationes & gesticulationes variæ, sensibus externis ac internis perstantibus, aut in delirium abreptis saltant, canunt, rident, flent, redicula narrant, vociferant, pectora percutiunt, post paroxyfimum interdum omnium recordantur, interdum nihil sciunt. In tertio gradu omnis tam sensus, quam rationis usus perit, ad humum prosternuntur, dentibus strident, corpus insigniter attollunt, spuma per os ejicitur, labia & linguam mordent, &c. quibus remittentibus ægri tanquam sopore oppressi jacent, ad se redeuntēs nihil horum sciunt, tantum de torpore, & gravedine quadam capitis, & artuum lassitudinem conqueruntur; qui secundo gradu laborant, vulgo *pro obsessis a dæmone* habentur.

**Prognosis.** *Art. 919.* Imprimis *lunæ motibus* auscultat epilepsia, maxime ea, quæ est *per essentiam*. Epilepsia *habitualis* interdum sine periculo vitæ ad plures annos durat, utut sæpius recurrens ægros plus minus paralyticos, delirantes, aut stupidos reddat. In junioribus aliquando circa pubertatem terminatur; post 25 annum superveniens fere usque ad mortem durat, teste *Hippocrate*, sed hoc non est omnino verum. In junioribus spes est circa pubertatis tempus.

**Curatio.** *Art. 920.* Cura inchoanda est cum vomitorio, maxime si morbus sit *per consensum*, mercurius dulcis permiscendus est cum purgantibus, quæ etiam debent esse mitiora; laudantur absorbentia, martialia, acida, decoct. e lignis, fonticuli; si *venæsectio* celebretur, fit in talo. Inter specifica *antiepiletica* numerantur sequentia, *Radix pæon. mar. flor. lilior. convall. tiliæ sem. rutæ, viscus quercinus, vel potius coryiinus, lignum*

*gnum buxi, sp. ceras. nigr. aq. epileptic. Langii sp. sang. human. secundin. human. cranium humanum, dens hippopotami, castoreum, stercus pavonis, camphora. sal. & ol. succini.*

*Art. 921.* Ad excitandum ægrum e paroxysmo in- Quid  
fletur *fumus nicotianæ* (vel *avium pennarum*) in fau- agendum  
ces; suffitus *succini* etiam multum confert, conveniunt a paro-  
*ligaturæ* communicationem spasmodicam inhibentes, roxismo  
si, scilicet, *ab extremitatibus convulsiones inchoentur.*

### *Ballonii sententia.*

*Art. 922.* Epilepsiæ in genere tres sunt differentiæ: Prima per propriam cerebri affectionem: secunda per consensum ventriculi; tertia ob partem peculiariter affectam, a qua aliquid manat, convulsionem epilepticam producturum. Magni refert ad morbi curationem, quænam sit species, & quænam idea, & sedes primum affecta, ne quod parti alteri decet, consulatur.

*Art. 923.* Quæcumque affectio comitialis post 25. annumprehendit cum ægris consenescit ex Hipp. Hæreditaria item, & gentilitia incurabilis. Quibus morbi comitiales fiunt, in pubertate mutationem accipiunt Hipp. sed juvenes prehendi Epilepsia non placet Galeno, nisi ex diætæ vitio, quia pravo utuntur cibo, & multa intempestive faciunt. Mulieres vero utero gerentes non ita facile epilepticæ concidunt, ac quum utero non gerunt. Quartana epilepsiam fugat. Quando autem dicimus epilepsiæ vindicem esse quartanam hoc audiendum est, quoniam excrementitium humorem absument diuturnitate temporis, sed suum humorem deteriore facit accusando putredinem.

Epilepsia species.

*Art. 924.* Ingeniosi, ceu quibus ingenii acuties est, Ingeni-  
ob cerebri substantiam subtilem ac delicatam in epile- osi ea  
psiam propendunt. Carolus V. Imperat. Mahumetius, subji-  
& Cæsar iis affectibus obnoxii fuerunt. Et quibus in- ciuntur.  
genii vis acutior delicatiorque, ii si quid contentius agant, præsertim in coitione hominum, & frequentia, ut si quid edisserere velint, paroxysmo epileptico capiuntur, unde quidam putarunt non eo epilepsiam comitalem morbum dici, quod dimitterentur comitia, si quis in iis epilepsia prehenderetur: sed quum alias,

tum maxime paroxysmum epilepticum homines adhoriri, quum in hominum corona, cum contentione aliqua animi agere instituunt.

Nota  
bene.

*Art. 925.* Quamvis Hipp. in Coac. pronunciaverit epilepsiam hydropi supervenientem desperatam esse, vidi tamen piscatorem convalescere. Lib. de Febr. Galenus ait, creari in vesica pueris lapidem, sed eam affectionem non ita esse pueris familiarem ut est epilepsia; nunc vero contra observatur.

*Art. 926.* Epilepsia morbus acutus est, & chronicus. Acutus ratione paroxysmi maxime si æger numquam antea adortus est, unde observat Hipp. senes maxime epilepsia perire, si numquam correpti fuerint; Chronicus vero, quia sæpe redux est.

Epilepsia ut pluri-  
mum est prævari-  
catio corporis habitu.  
do.

*Art. 927.* Princeps Avicennas explicans illud quod scripsit Calenus in arte parva, habitudo corporis est in iis partibus, quæ oculis subjiciuntur, vult quosdam esse proprios ipsius habitus morbos. Quando a pede aut inanitate sub cute dolores implacabiles excitans aura venenata ad caput surgit, id nec a visceribus nec ab interno est corpore. Unde male epileptici curantur habita tantum ratione interni corporis, potius habitui providendum est. Idem in arthritide. Magni equidem interest ad remedia usurpanda, si ab utero, si a præcordiis, si ab habitu ipso & cruribus, tibiis, aut pedibus malum est repetendum.

Curatio.

*Art. 928.* Laxetur alvus, & clysterum frequens usus ineatur. Sanguis vere & autumnus, maxime si sanguis peccet, detrahatur. Item catharsis autumnus blandior sed frequentior sit. Ventriculo robur concilietur, & par studium esto in crebro roborando, sed vitentur quæ sanguinem, & spiritus inflammant. Animi impetus reprimendi, utpote a quibus malum provocatur. Pyrotica tibiis. Ungulæ alcis usus ad insultus epilepticos apprime conferens, gestanda quoque. Aquarum naturalium usus quales Nivernenses, & Spadanæ. Quibusdam sequens remedium placet. Antim. ʒ. sem. accipitur, maceraturque in vinialbi optimi lib. ij. Paroxysmi tempore cochlear unum istius vini in os infunditur.



*Vvilisii sententia.*

*Art. 929.* Insultus epilepticus universalis ac imma- Paroxis-  
 nior tantum *convulsio* esse videtur, cujus accessio ut mi de-  
 plurimum eximproviso aghreditur, ægrosque nihil ta- scriptio.  
 le cogitantes opprimit, atque ictu oculi citius, sensu,  
 & intellectu orbos, in terram præcipitat; quippe non  
 tam cadunt, quam cum impetu quodam prosterne-  
 tur; prostratis supervenit stridor dentium cum spuma  
 oris, sæpe etiam capitis concussio; brachia & crura,  
 necnon cervix & dorsum, aut statim rigida fiunt, aut  
 variis flexionibus distorquentur; plerisque præcordia &  
 hypocondria & venter intumescunt, post aliquod tem-  
 pus ad se redeunt, superflite dolore capitis & hebe-  
 tudine.

*Art. 930.* Est morbus curationis difficillimæ; aliquan- Curatio.  
 do tamen medicamentorum ope profligatur, aliquando  
 sua sponte terminatur, viz. circa pubertatis tempus,  
 aliter in mortem definit, vel in alium morbum com-  
 mutatur, scilicet, *paralysin*, *stupiditatem*, aut *melan-*  
*choliā* (incurabilia.) *Alphonsus Ferrius* plurimos epi-  
 lepticos simplici *guaiac.* decocto bis in die ad ʒvj. vel  
 iij. præscripto, ejusque decocto secundo vice potus  
 ordinarii (prout in *lue venerea* affolet) assumpto se cu-  
 rasse affirmat; si tali decocto *radix peon. aliaque spe-*  
*cifica* addita fuerint, forsan efficacius esset remedium.

*Chesneavii sententia.*

*Art. 931.* Quod palpitatio est cordis, talis omnino Nota  
 est epilepsia cerebro; nam cum in eisdem usus habeat bene.  
 utrumque principium suam *systolem* & *diastolem*, ha-  
 rum ratione, ambo ab iisdem causis, simili symptoma-  
 te affici par est: Ideo epilepsia, sive tanquam morbus  
 sive tanquam symptoma spectetur, dicenda est cerebri,  
 aut alterius cujusque partis alteratio, quæ apta nata  
 sit gignendæ materiæ, ichoris, aut vaporis simili, qua-  
 litatibus cerebro proprietate specifica infensus, cujus oc-  
 cursu totum concutitur motu *palpitationis* simili cum  
 læsione functionum, nervosa in consensum trahens,  
 quæ suo modo etiam *palpitant* (quemadmodum *ar-*  
terie

*teriae palpitante corde* ) quousque, cerebrum noxia excusserit.

**Coercitio membrorum.** Art. 932. Non possum probare, quod omnes fere confulunt, *membra scilicet coercenda esse tempore paroxysmi*, existimantes ex illa convulsivi motus cohibitione levare musculos; sed tantum abest: cum enim cohibitio hæc sit violenta, impediatque musculi contractionem ad terminum suum pervenire; quo longius est ab illo, eo major fit fibrarum musculi contentio.

### Barbetii sententia.

**Ratio habenda est causæ, unde oritur.**

Art. 933. Si epilepsia oriatur ex *cerebri idiopathia*, semper adest gravitas, & atrox dolor capitis, item sensuum debilitas, stupor, faciei pallor, & insomnia turbulenta; ex *sympathia* ventriculi, ii in præcordiis & circa orificium ventriculi dolorem, corrosionem vel distentionem sentiunt, præsertim jejuni, & difficillime inediam tolerant; paroxysmum semper antecedunt nausea, dolor, & palpitatio cordis, animique deliquium; solvitur autem paroxysmus cum vomitu biliosorum, aut pituitosorum, acidorumve humorum: Si ex *utero*, circa lumbos, & pubem dolores, & simul capitis acerbi cruciatus percipiuntur.

**Curatio.**

Art. 934. In hoc morbo curando omnibus fere antecellunt *flores salis armoniaci & ejusdem spiritus*, qui est valde volatilis & penetrantissimus, item prodest *cinnab. nativ.* præmissis universalibus. Hautus sequens bis in die exhibitus puellam ab hoc malo liberavit; *℞. Sapon. Hispan. albiss. ℥ss. eoque ex lact. vaccin. ℥iij. bibatur tepide.*

### Pitcarnii sententia.

**Pitcarnii tinctura.**

Art. 935. In epilepsia vel paralyfi post vomitum repperitum, & *vesicantia* detur tinctura antiepileptica sequens (junioribus vero exhiberi debet *mercurius* & jusculum cum *lumbricis terrestribus*) *℞. Rad. valerian. sylv. dictamn. alb. ana ℥vj. castor. sterc. columb. ana ℥ss. visc. quercin. ℥vj. cinnam. sum. rorismarin. ana ℥ss. sol. sen. ℥ij. jalap. turpeth. ana ℥ss.* Infunde frigide per dies x. in vin. alb. Gallic. lb. viii. colaturæ add. pulv. cran. humani ungu. alcis ana ℥ij. sachar. ℥iv. cui immi-

*immisce rite ol. succin. ℥iv. & spir. castor. ℥ij. dof. ℥iv.*  
 Expedit hanc tincturam purgantibus orbam exhibere in  
*paralytici*; declinante morbo; expedit etiam ægros, post  
 membra affecta ad ignem liberaliter & strenue perfri-  
 cta, aquis frigidis immergere

*Harristi sententia.*

*Art. 936. ℥. Lumbric. terrest. præparat. ℥j. cran. Pulvis*  
*human. præparat. ℥ij. cardamn. min. ℥ij. m. f. pulv. spexificus.*  
 in chart. xij. distribuend. Sumebat epileptica unam bis in  
 die in coch. julap. cephalic. sequent. superbibebatque ejus-  
 dem coch. iij. ℥. *Aq. ceras. nigror. flor. tilie ana lbj. pæon.*  
*comp. ℥ij. tinctur. castor. ℥ij. syr. pæon. comp. ℥ij. m. f.*  
 julap. sed quia tantam pulveris nauseabundi quantitatem  
 ventriculus fastidiebat, paulo post sing. doses *elix. pro-*  
*priet. dulc. gutt. xxx. sacchar. tantillo instillat. insuper*  
 mox deglutiebat: atque hac methodo curata est puella  
 epileptica, postquam plurima alia incassum tentavit.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 937. Spuma circa os, & involuntarius seminis,*  
*urinæ, & excrementorum alvi exitus, non sunt Epi-*  
*lepsiæ signa necessaria, sed tantum vehementis morbi,*  
 propterea dicebat *Rhazes*, quodsi summa superven-  
 niat, & semen, aut urina, aut alvi excrementa ege-  
 rantur, tunc passionem esse graviolem. Saliva enim  
 spumosa etiam in aliis affectibus, ubi nervi pneumo-  
 nici, aut contrahuntur, aut a functione sua obeunda in-  
 hibentur, non raro succedit.

*Signa  
equivoca.*

*Art. 938. Infantes quibus crustæ scabiosæ in capite*  
*superveniunt morbis Epilepticis raro corripiuntur. E-*  
*pilepticos fieri Melancholicos, & vicissim asseruit Hip-*  
*pocrates. Si in hoc morbo mens læsa est, & nervo-*  
*rum facta resolutio, Medicinæ locus nullus adest. U-*  
 tile item est observare num semper, eo tempore quo  
 infans corripitur Epilepsia, matri fluant menses nec-  
 ne: Nam hic morbus cum alias sit difficilis, tum hoc  
 ipso mirabilis prorsus medentibus visus est, quod nova  
 in primis, plenaque Luna soleat recurrere. Regit, in-  
 quit *Galenus*, Luna in Epilepticis periodos.

*prognosis.*



Casus .

*Art. 939.* Vidit *Thom. Bartholinus* puellam Epilepticam habentem in facie Maculas, quæ pro varia Lunæ Phasi tam colore, quam magnitudine variæ erant. Tantum, ait ille, corporibus nostris cum cœlo commercium; sed videnda sunt quæ de Imperio Solis, & Lunæ edidit *Mead*.

Aliz  
Progn.  
seos .

*Art. 940.* A decimo quarto ætatis anno usque ad vigesimum aut vigesimum quintum non nisi duos Epilepticos sanitati restitutos fuisse, ab eo tempore, quo praxim exercuit, observavit *Hildanus*. Epilepsia quæ infantes ultra sextam hebdomadam corripit, lethalis est: alio vero tempore periculosa, quæ Virgines ante pubertatem adhoritur, mensuris erumpentibus ut plurimum desinit. Incurabilis est quæ noctu cum tremoribus adhoritur: ita etiam, quæ subinde in Maniam abit, ait *Avicennas*. In juvenibus eadem sponte sua desinit ex ætatis, loci & regiminis mutatione, ait *Hippocrates*, quare non raro, qui ab ea exercentur septimo mense, septimo anno, & post decimum quartum nullis etiam adhibitis remediis convalescunt. Hic morbus alias longus esse solet, & a vigesimo quinto ætatis anno usque in diem hominis supremum perseverat, neque vitæ periculosus est, tametsi interdum, recens est, crebris, gravioribusque accessionibus hominem tollat, Illud etiam non perperam animadvertendum est, prægnanti sceminæ si morbus accessit, hunc, facto partu, solvi: & si quid inde vitii fœtus traxit, id magna ex parte conquiescere, ubi editus in lucem infans protinus evomuerit, multumque eiecerit aquosi excrementi: sin minus manere morbum.

Indica-  
tiones &  
curatio.

*Art. 941.* In curandis Epilepticis habendus est respectus causæ morbum producentis, & si purgandus est æger, id debito intervallo ac accessionibus faciendum: ne ex irritatione remediorum paroxysmi augeantur. Genericæ tamen indicationes sunt 1. ut corrupta corporis fermenta evacuentur: 2. ut quæ evacuari nequeunt corrigantur. 3. ut contrahantur aut laxentur solida nimis laxa aut tensa, quousque ad naturalem tonum restituantur. Ut vero congrua remedia hiis indicationibus satisfaciencia seligantur, adeundi Scriptores, qui ex professo de hoc morbo egere. Interea irritum non erit observare, quod in coptumacioribus Epi-

Epilepsii Vomitoria etiam repetita non sunt negligenda, sine quibus nullam Epilepsiam curari *Vvedelinus* testatur. Cavendum ne cinnabarinis falia cum primis fixa misceantur, ne mixtura Mercurio sublimato similis hinc emergat, & convulsiones augeat, & quia spirit. sal. armoniac. lac infantum in ventriculo coagulat, in eorum Epilepsia tractanda ab ejus usu caveto.

*Art. 942.* Epilepticus, remediis aliis minus proficientibus, *super mare naviget ad nauseam, & vomitum excitandum*, idque aliquoties reperat: & deinde deambulet, horis tribus, quatuorve quotidie, per integram septimanam, vel diutius, in *sulco immediate post aratum humum, versans in agello annis aliquot feriato*. Dicet aliquis authorem pro certo insomniis ludificari; quanquam hoc credat, experiri licet, nec fortasse facti pœniteat.

*Art. 943.* Ultra omnia, ad morbum caducum curandum, & penitus eradicandum valet *dieta lactea* ab aliis quibuscunque obsoniis, & potulentis omnino abstinendo; ut ex insigni historia *Medici, Noviomagi* non multo pridem degentis, isto modo curati docemur. Vid. *Cheynei* Tractat. de Arthritide, p. 103. &c.

*Art. 944.* Causa proxima omnis Epilepsiae exquisitæ semper est nimia cerebri in nervos motorios, nulla in sentientes actio. *Boerhaave*. *Melancholici* fiunt aliquando Epileptici & contra. Epilepsia (inquit *Hippocrates*) *pituitosis* quidem contigit, minime vero *biliosis*. *Crato cinnabarim nativam* tanquam Epilepsiae magnetem commendat, hoc modo exhibitam; ʒi. *Cinnab. nav. opt. subtilissime trit.* ʒj. *coral. rub. præparat, margar. præpar. ana* ʒj. *croc. opt.* ʒj. *fol. aur.* N. xv. f. pulv. subtilissimus, dos. ʒj. cum julap. cephalic. *Succus rutæ* multum laudatur ad epilepsiam: ideoque ejusdem *extractum* iisdem pollet viribus, & commodius sumi potest. Electuarium *Peruvianum Epilepticum Fulleri* est præstantissimum, & certissimum Antiepilept., uti experientia me docuit (inquit *Fuller*.) Post debitas *evacuationes* adultis dosis sit ʒj. mane, & vespers per 3. vel 4. menses, & postea per triduum vel quatrimum ante *novilunium & plenilunium*, morbos Epilepticos, hystericos, & choream sancti Viti penitus eradicat. In morbis hujusmodi convul-

Nota  
bene.

Reme-  
dia va-  
ria.

Alia  
medica-  
mentum.

vulvisis ægrotis prædictum electuarium frequenter exhibui & (libenter agnosco) raro frustrata fuit spes mea. Eximiæ vires radicis valerianæ sylvestris a Fabio Columna prædicatæ, & a Riverio memoratæ; experientia M. Marchant denuo confirmatæ sunt. Memoir. de l'Acad. Vol. x. p. 430. Cortex Peruvianus (inviscusquit Colebatch. in Dissertatione de Visco) non certius febri intermittenti, quam viscus arboreus Epilepsiæ, choreæ Sancti Viti, & morbis universis convulsivis, etiam asthmaticis convulsivo (& si heic, tussi convulsæ) medetur. Dosis in substantia adultis ad ʒʒ. vel ultra formæ boli sexta quaque hora superbibendo haust. infus. fordis ejusdem plantæ. Si singulis unciis pulveris visci addatur drachma asæ fætidiæ, medicamentum efficacius evadet. Operæ pretium esset procul dubio, vires humoris mucilaginosi baccarum in his affectibus tentare: Valde enim probabile est vim eandem, si non superiorem, eo inesse; & forsitan esset medicamentum minus nauseabundum. Præter jamdicta medicamenta, sequentia etiam quandoque præscribentis intentioni quadrare possunt, viz. aurum fulminans, aurum Mosaic. pulvis ad guttetam, sp. C. C. succi. nat. Elect. cephalic. elect. epileptic. tinctur. epileptic. & infusum cephalic. Fullerii. Elect. epileptic. & emulsio pæon. Batean. &c.

## CHOREA SANCTI VITI.

Chorea s. Viti. Art. 946. Chorea sancti Viti a Germaniæ loco, S. Veit dicto, ubi sacellum sancto Vito dicatum adest, nomen accipit, quo loco verno tempore juvenes utriusque sexus saltandi gratia convenire solebant, & saltare more enthusiastico; atque ibidem interdum hoc morbo correpti erant.

### Sydenhami sententia.

Art. 947. Chorea sancti Viti est convulsionis quædam species; pueros puellasve a decimo ætatis anno ad pubertatem invadens, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pedem alteri.



tori vel aliæ alicui parti applicatam nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm; & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contrahitur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulatione, circulatorum instar, exhibebit; non enim recta lineâ ori admovet; sed deducta a spasmō manū, huc illuc aliquamdiu versat, donec tandem forte fortuna labris propius apponens liquorem de repente in os injicit, & valide haurit; dedita tanquam opera; ut spectantibus risum moveret.

*Art. 947. Ad curam rite instituendam vena est secunda; & postridie exhibe potionem purgativam communem, & vesperi hausi. paregoric. postea sanguis iterum extrahatur, & ad catharsin, uti prius, æger revertatur, & ad tertiam, quartamve vicem; si vires ferant: diebus purgatione vacuis sequentia exhibeantur; ℞. Conserv. absynth. Rom. flaved. aurant. ana ℥j. anthos ℥j. theriac. Androm. vet. nuc. moscat. condit, ana ℥iij. zinzib. Condit. ℥j. syr. e succo citr-q. s. f. elect. de quo capiat quant. N. M. mane & hora 5. pomerid. superbibendo vin. sequent. coch. v. ℞. red. pæon. enul. campan. imperator. angelic. ana ℥j. fol. rut. salv. beton. chamædr. marrhub. alb. sum. mit. centaur. min. anam. j. bacc. junip. ℥vj. cor. aurant. ij. infunde frigide in vin. canarin. ℥vj. coletur usus tempore: ℞. Aq. rut. ℥iv. epileptic. Langii, brion. comp. ana ℥j. syr, pæon. ℥vj. m. f. julap. cap. coch. iv. sing. nocte horâ decubitus instillando spiritus C. C. viij. applicetur plantis pedum emplast. e caranna.*

*Art. 948. Ob recidivæ motum pertundenda est vena & purgandus æger aliquoties ea ipsa anni sequentis tempestate (vel paulo ante) qua morbus invasit.*

Ad recidivam cavendam.

*Art. 949. Ipse vidi puella duas hoc morbo affectas diutius saltitantes, tanquam lyra agitata, cum mentis quadam alienatione pro tempore; has curavi cum expressione millepedum, & cortice Peruviano præmissis, venæsectione, & leni cathartico. Exemplum hujus affectus singulare habet Solenander, consil. med. p. 310. Electuarium Peru. epileptic. Fuller. vim habet egregiam ad hunc morbum*

Curatio singularis.

domandum. Pater prædictarum puellarum, qui clericus erat, filias suas incantamentis, vel veneficarum malis artibus revera affici persuasum habuit, nec ab ista opinione abduci potuit. Rem vero longe aliter se habere ex eventu luculenter patuit; antedicta enim remedia obsessionem istam protinus comminuerunt, quæ precibus & lacrymis respuerat obtemperare.

## F A S C I N A T I O.

**Fascina.** *Art. 950. De Fascinatione in praxi mea nihil experientia didici, quodcunque & quocunque de ea vulgo perhibentur, neque credo ullos morbos a veneficiis suscitari: ideoque de medicamentis, & curatione eorum sollicitum esse non est necessarium. In prodigiosis vero quibusdam morbis, symptomatum irusitatorum cætera stipatis, medicamenta vermifuga, item, illa quæ epilepsiæ vel suffocationi uteri medentur, vel flatus discutientia, utpote etiam quæ naturaliter repugnant dispositionibus illis in corpore, quibus diabolus ad præstigia sua abuti possit, (uti credunt Theologi) semper locum habent.*

## A N I M I M O R B I.

**Animæ morbi.** *Art. 951. Qui laborant animi pathemate corripit potissimum solent morbis ventriculi, ut inter cæteros observare licet in mœrentibus, qui conqueruntur: primo de languore ventriculi, mox vero de inappetentia, oritur amaritie, & siti circa horas matutinas, cruditatibus acidis & nidorosis, flatibus & tensionibus hypochondriorum, aliisque læsæ chyloseos malis.*

**Morbus durante passione.** *Art. 952. Si quis morbus durante animi passione ægrum corripuerit solet interdum tamdiu durare quamdiu ipsa animi passio, & potius in alienæ speciei morbum mutabitur, quam ægrotantem liberum relinquit.*

**Quomodo tractandi.** *Art. 953. Morbi ab animi pathemate pendentes blandæ ac leniter tractandi sunt, a nimia remediorum copia, & vehementia quam maxime abstinendum.*

**sympto.** *Art. 954. Quando morbus aliquis remediis debite præscriptis cedere inolit, infolitisque quibusdam modis*

que a sui natura valde remotis progreditur, suspicandum erit de *occultis animi passionibus*. Inter solatia ægrotorum animo laborantium magnam vim obtinet *musica* ( inquit *Baglivius*. )

mi pas-  
sioni-  
bus.

## MANIA &amp; MELANCHOLIA.

*Art. 956. Mania cum melancholia talem habet affinitatem, ut non raro mania in melancholiam transeat, & initia melancholiæ frequenter maniacum quid habent, ut observavit Dodonæus; ideoque in eodem capitem tractandi sunt hi duo affectus.*

Mania  
& me-  
lancho-  
lia.

*Cæli Aureliani sententia.*

*Art. 956. In melancholia adest animi anxietas atque difficultas, mœstitia cum silentio, & odio conviventium, nunc vivendi, nunc moriendi cupido cum suspicionibus velut insidiarum sibi paratarum; item inanes fletus, atque murmura vacua, & rursus hilaritas magis post cibum cum inflatione præcordiorum, capitis gravedo, color luridus cum nigrore; aut sublividus; corporis tenuitas, virium debilitas, indigestio cum ructationibus odoris tetri, intestinorum tormina, vomitus humorum diversiculorum, & similium per podicem egestio. Qui gravius laborant, sese vel pecudes esse vel testaceos, vel etiam vita defunctos credunt, quare alii galliacei cantum voce imitantur, alii occurrentibus cedunt, veriti ne (testacei cum sint) diffringantur, alii cibum pertinacissime recusant, amisam esse vitam rati.*

Melan-  
colia  
descri-  
ptio ac-  
curata.

*Riverii sententia.*

*Art. 957. Melancholia est delirium sine Febre, cum timore & mœstitia, & sic distinguitur a mania, quæ est cum furore & audacia. Ex varia melancholici humoris dispositione maxima deliriorum varietas emergit; unde alii putant se esse reges, vates, alii granatritici, allegavit os, ceram, alii se esse canes, feles, gallos, &c. existimant, ideoque voces horum animalium imitantur, &c.*

Mania  
& me-  
lancho-  
lia quo-  
modo  
disting-  
guun-  
tur.



Varia  
sunt de.  
liria pro  
varietate  
constitu-  
tio.  
num.

*Art. 958.* Varia sunt deliria in variis ægrotantibus pro majori vel minori causæ vehementia, alii enim feroci iracundia rapiuntur; & obvios quosque invadunt; & proprias vestes dilacerant, sibi que ipsis interdum violentas manus inferunt. Alii vero mitiores, & paciores sunt, nullamque astantibus noxam inferunt, sed tantum varios sermones, & ridiculos proferunt; interdum canunt, & rident, & symptomata patiuntur, quæ in melancholia; & stultitia solent contingere. Melancholia errabunda *menſe Februario* homines potissimum infestat; ægri ne horam in uno loco manere possunt, sed continuo vagantur, quo vadant nescientes.

Lycan.  
thropla.

*Art. 959.* Admirandam melancholiæ, vel manie speciem apud Oribasium, descriptam legimus, quam *λύκανοθροπία* vocat. Hujusmodi delirio affecti foras noctu vagantur, lupos quodammodo æmulantes, aspectu pallidi, luridi; os oculosque valde sicci, crura contusionum ac vulnorum plena; circa defunctorum monumenta ad instar Dæmoniæ Evangelici, plerumque versantur. Vide Freind, *Histor. Medic.* p. 18.

Difficile  
curatu.

Quibus  
remediis  
tentan-  
da est.

*Art. 960.* Humor melancholicus *flagellum*, *crux* aut *opprobrium* medicorum appellatur, quoniam vir remedium eludit, solvitur interdum melancholia per fluxum hæmorrhoidum vel per scabiem; aliove morbos cutaneos. Remedia in affectus hypochondriaci curatione proposita hic locum habent; ʒi. *Aq. nymph.* ℞. ij. *sal. prunel.* ʒj. *camphor*, ʒj. misce, & cum lintei complicatis admoveatur tepide siccipiti in maniacis: utilissimum quoque est *epithema ex sacchar. Saturn.* & *aq. spermat. ranarum*.

### Vvilisi sententia.

Melan-  
cholici  
cogita-  
bundi.

*Art. 961.* Melancholici in cogitando fere continuo occupantur, & inter cogitandum res pauciores quam antea solebant, animo comprehendunt, ita quidem ut sæpe dies & noctes idem objectum animo volutent, de rebus aliis, quæ interdum sunt longe majoris momenti, nihil solliciti; & etiam objecta fere omnia iis deformia, & velut sub larva apparent.

*Art. 962.* Hæc tria fere omnibus maniacis accidunt,

dunt, viz. 1. eorum *phantasæ*, sive *immaginationes* cogitationum impetuofarum æstu perpetuo occupantur, ita ut varia sibi obmurmurent, aut clamando & ejulando proferant. 2. *Notiones* sive *conceptus*, aut incongrui sunt; aut sub specie falsa sive erronea repræsentatur. Illorum delirio *audacia* & *furor* adiunguntur, contra ac in *melancholicis*.

*Art. 963.* Helleborus ab *Hippocrate* in crebro præscribitur, quoniam tunc temporis alia *cathartica*, saltem in frequenti usu, vix innotuere; jam vero longe præstat *lenioribus* & *mitioribus* humores subducere. *Emetica* sequentia sunt maxime; *+*. *Sulph. antimon. a gr. viij. ad x. crem. tart. ss. m. +. Mercur. vitæ g. vj. vel vij. tartar. vitriolat. ss. m. +. Extract. helleb. nigr. calomel. ana Dj. f. pil. cathapot.*

Curatio

### Ettmulleri sententia.

*Art. 964.* Affectus Melancholicus seu Melancholia differt a delirio Melancholico; prior est quando homo est nonnihil mœstus & morosus, facile subinde irascitur, ipsi nihil arridit; cogitabundus est; ubi vero taliter affectis supervenit *phantasma*, constituit *delirium Melancholicum*, in quo ægri sunt timidi; anxiosi, & quasi in angustiis constituti videntur; adeoque quæcunque vident vel audiunt; sibi pejora & periculosiora persuadent, & licet interdum rident, & læti videntur, quando putant se esse divites; &c. nihilominus non est revera hilaritas; non verum gaudium, sed potius apparens, & cum risu *Sardonico* conjunctum, transitorium, & facile succedit novus mœror; & præcordiorum anxietas, sine causa iterum rident, & parum aut nihil omnino dormiunt; sed cum terrore evigilant.

Diffe-  
rentia  
melan-  
choliæ  
delitio  
melan-  
cholicæ.

*Art. 965.* Mores animi sequuntur temperamentum corporis. Fundamentum Melancholiæ semper circa hypochondria consistet, utut remotior causa interna subinde aliunde oriatur: in quo puncto lien; & uterus incusari solent.

Fundam-  
entum  
melan-  
choliæ.

*Art. 966.* In Melancholicis imprimis *acidum vitiosum* in primis viis abundat, hinc frequenter sunt voraces

Origo ces. Expiscanda est mali origo, an ex tristitia, est mali ex. animi affectibus, vel ex sanguine Melancholico, in plican- priori casu *pulsus* est valde obscurus; inæqualis & pe- da est. ne deficiens & vermicularis.

Curatio  
melan-  
choliæ.

Art. 967. In vomitoriis consistit radix curæ Melancholiæ, & *antimonialia vomitoria* exhibenda sunt in larga dosi. Melancholici & Maniaci odio suum habent medicum, etiam curati licet. Alvus servanda est lubrica cum *extracto hellebori & mercurio dulci*, quod est *alterativum* æque ac *laxativum*, ut etiam est *lapis lazuli*; in usum revocanda sunt remedia *antiscorbutica*, *martiata*, *acidulæ*, *saccharum Saturni* specificum habetur; *tinctura coral. confect. alkerm. ambra*, *fumaria*, *anagallis*, *hypericum*, *crocus*; *camphora*, *vinum generosum*, &c. laudantur. Emplast. ex *tacamach.* capiti raso applicetur. In delirio Melancholico *opium* nullum fortitur effectum; licet dupla aut tripla dosi propinetur, ægri *agrypni* manent, & ferociores fere evadunt.

Mania  
definitio  
&c.

Art. 968. Mania sive insania est delirium sine febre cum insigni furore & audacia, exuta quasi omni ratione; ægri pertinacissime vigilant, interdum per aliquot menses. Tres circumstantiæ sunt maxime notandæ, nempe, *furor insignis*, *robur stupendum*, & *frigoris tolerantia* plane mirabilis.

Curatio  
manicæ.

Art. 969. Radix curationis consistit in validis vomitoriis sæpe repetitis, convenit etiam *venæsectio*, præ reliquis *radix hellebori albi* est vomitorium maxime proficuum, sequenti modo præparata tuto propinari potest; ʒi. rad. hellebor. alb. a ʒss. ad ʒj. coque in vino donec mollescat; tunc abjiciatur vinum istud, & radix in vinum aliud injiciatur, & ita per noctem relinquatur in loco calido sine coctione tamen, postea coletur expressione levi vel forti, prout magis vel minus validum postuletur, vires sunt optimæ, nec unquam satis laudatæ; *nitrum crudum* & omnia *nitrata* summe conveniunt, remedia pro cura *melancholiæ* hic quoque locum habent. Immersio subitanea in *aqua frigida* quandoque prodest.



## Meadii sententia.

*Art. 970.* Quoad curam insanix seu Melancholici **Obfer-**  
 vel Maniaci delirii illud ante omnia Medicum **vanda** confi-  
 derare oportet, quas exinanitiones fere possit æger: **pro cu-**  
 siquidem omnibus fere modis demenda est materia, **ratione**  
 modo vires id sinant; sin illæ sint imbecilles, cibis i-  
 doneis, & medicamentis primum confirmandæ erunt,  
 usque dum pati medicinam tuto possint. Nam haud  
 raro evenit, ut nimium exhaustis humoribus, furori  
 succedat insanabilis animi dejectio, & melancholia; qua  
 oppressus æger in perpetui anxietatibus, & mæstitia  
 viam transigit; heu! nimis ut plurimum longam Diu-  
 tissime enim magna ex parte vivunt. Modi autem præ-  
 cipui, qui demendæ hujus morbi materiæ conveniunt,  
 sunt sanguinis missio, vomitus, alvi purgationes, & u-  
 rinæ fluxus. De hisce igitur singulis aliquid proponam.

*Art. 971.* Sanguis commodissime detrahitur, aut ex **Phlebot-**  
 brachio, aut ex vena jugulari, interdum etiam per **omia**  
 cucurbitulas occipitio inciso admotas, nimirum si quan-  
 do capitis dolor urgeat, aut ultra exhaustiri per venas  
 sanguinem vires minime patiantur.

*Art. 972.* Vomitus optime excitatur vino Ipecacua- **Vomito-**  
 hnx in infirmioribus; in robustioribus vero tinctura **ria**  
 veratri, aut vino antimoniali.

*Art. 973.* Alvi dejectiones moliri, commodissimum **Cathar-**  
 est helleboro nigro; aut infuso sennæ adjuncta tinctura Ja- **sis**  
 lapii, aut denique aloë si forte mensium vel hæmorrhoi-  
 dum suppressio præcesserit. Has omnes inanitiones per  
 vomitum, & per alvum frequenter repetere ægrum  
 oportet; ita ut per vices aliæ aliis interponantur. Ne-  
 que illud addere alienum est, valentiora plerumque  
 remedia requirere hunc morbum, cum nervi haud fa-  
 cile hic irritentur.

*Art. 975.* Majoris autem momenti est, quam vul- **Diure-**  
 go existimatur, per renes depletio, præsertim cum sy- **tica**  
 ror conjunctum habet febrilem ardorem. Melancholli-  
 cis enim parum prodest, quos ut plurimum nimis lar-  
 gum urinæ profluvium sollicitat. Diuretica autem hic  
 aptissima sunt salia ex lixivilis herbarum crematarum

parata, & sal diureticus dictus; quorum alterutrum per vices exhibere licebit, idque portione satis larga.

*Vesicatoria.* *Art. 975.* Cum illis, quæ morbum minuunt; adnumeranda forsitan videbantur Emplastra vesicatoria capiti admota; quæ tamen nimia irritatione nocere potius, quam juvare sæpe deprehendi. Magis conveniet veterum more caput ad cutem tondere; deinde aceto, in quo rosar. Flores, aut hederæ terrest. folia infusa sint, frequenter fovere, ac madefacere; item setaceum, quod barbara voce chirurgi appellant, sub occipite ponere. Illud autem hoc modo efficitur.

*Setaceam.* *Art. 976.* Funiculus ex filis sat multis sericeis acus foramini inditur; dein, facta perforatione subter cutem transversus conjicitur, sic ut spatium duorum fere digitorum comprehendat; tum per aliud, cuspide acus factum vulnusculum educitur. Illinendus autem est unguento aliquo digestivo, & quotidie movendus, quo ex ulcere pus exeat. Nihilominus tamen in longo morbo vesicatoria interdum proficiunt.

*Dietæ.* *Art. 977.* Dum hisce modis noxii humores expellantur, iis etiam remediis pugnandum est, quæ corpus immutant, Dietæ tenuis esse debet, ex jusculis maxime farinæ avenæ, aut hordei; & cibis ex media materia. Alendum enim corpus est, ne vires deficient, & detractionibus necessariis ferendis impares evadant.

*Resina & gum. mata de obstruentia.* *Art. 978.* Medicamenta plurima apud auctores, tum veteres tum recentiores, commendantur; quorum alia maniacis, alia melancholicis conveniunt; utraque autem eo collimant, ut bilem corrigant; quæ acris primum, deinde viscida, & picis instar atra fit. Quin & sanguinis ipsius habitus in hoc morbo crassus est, & tenax, nigroque colore; unde incisa cadavera cerebrum siccum, & tantum non friabile, sanguinisque canales atro, ac lento curore distentos ostendunt. Illud autem animadvertere & usu erit, pleraque quæ ad humorum vitium emendandum apta sunt medicamina, vi aliqua exilissimos glandularum meatus aperiendi, & subtilissimos liquores e corpore propellendi pollere. Hujus generis sunt gummi graveolentia, in primis asa foetida myrrha, castoreum Russicum, & camphora; qua vi etiam anodyna pollere, & certius tutiusque quam la-

psium opium, somnum arcessere, nonnulli auctores experti affirmant. Melancholicis etiam convenientissima sunt quæcunque ex ferro parata. Plurimum denique juvat, in furoribus præsertim, ægrum balneo frigido frequenter immergere. Capiti enim, ut monet *Celsus*, nihil æque prodest, atque aqua frigida.

*Art. 979.* Alia ratione maniacy alia melancholiciRegimen continendi sunt; illorum enim reprimi audacia debet, horum spes excitanda, erigendusque animus. Neque tamen illos, qui violentius se gerunt, asperioribus onerare coercionibus, & verberibus multare, necesse est, cum satis sit vincere, meticulosi enim sunt, ut jam dixi, omnes, & cum per tempus aliquod superatos se senserint, manus facile dant in posterum, neque vel sibi, vel aliis vim inferre audent.

Difficilior res est cum iis, qui aut cum nimia tristitia, aut nimia hilaritate desipiunt, quorum animis, pro cuiusque natura medicum se accommodare necesse est. Aliorum igitur risus intempestivus objurgatione, & minis prohibendus est; aliorum tristes cogitationes discutiendæ, ad quod symphonix, & ludi, quibus olim delectabantur, multum sæpe valent. Et musica quidem, quomodo corpus pariter ac animum afficiendo juvet, jam olim explicui. *Mechanical account of poissons Essay: sive Tractat. Mechan. de venenis.*

*Art. 980.* Illud autem perpetuo servandum est, ut imaginibus, quæ diu occuparunt, aliæ contrariæ menti adferantur, quo novis cogitationibus paulatim se assuescant; Ut enim in corpore, morbo, aut exercitiis fracto, imperanda est quies, & laboris intermissio, sic animum a vanis, quas accepit, speciebus omnibus modis abducere oportet. Id autem consequemur, si ad ea, quæ diversis motionibus exercent, convertamus. Idcirco in falsis timoribus, qui longum inhæserunt, veris periculis terrefacere, & pavorem incutere, nonnumquam prodest. Hi autem veri terrores falsorum istorum natura dissimiles esse debent, ut mentem diverso modo exagitant. Mens enim quiescere nescit, curis vero, & sollicitudine vacua esse potest, & mutatio idearum pro oblectamento, & studiorum intermissione est habenda;

Imaginationes corrigendæ.



pariter ac membrorum musculi, uno aliquo labore fatigati, ad alias actiones conversi refocillantur.

Exerci-  
tationes  
jubendæ. *Art. 981.* Corporis exercitationes nunquam negligendæ sunt. Ambulare, equo vehi, pila, globis, ludisve similibus uti, natare, quin & terra marique peregrinari, multum juvat, hisce enim tum fabricæ universæ robur confirmatur, tum assidua rerum objectarium permutatione mens ad se rediens sapere discit.

Anodina. *Art. 982.* Anodyna medicamenta ad somnum arcescendum rarissime in hoc morbo juvant; in magnis tamen animi terroribus, aut ubi per longam sollicitudinem, vel tristitiam, pervigillo fatigatus est æger, illa experiri non alienum est. Neque tamen diu in his persistendum; non raro enim etiam, cum somnum inducant, expurgiscitur laborans terrificis imaginibus gravius, quam antea tentatus.

Prognosis. *Art. 983.* Nullo in morbo major de iterato in ægritudinem lapsu est metus, quocirca, quæcumque posuimus auxilia, sive ad medicinam, sive ad diætam, & vivendi morem pertinent; ea omnia etiam, cum jam convaluerit æger, ad satis longum tempus per intervalla in usum revocari debent.

### Farrago sententiarum.

Infantiæ  
species. *Art. 984.* Infantiæ duo genera describunt Auctores, quorum utrumque est constans error mentis sine magna febre; alterum cum furore, & audacia; alterum cum tristitia & metu; quorum illud *Maniam*, hoc *melancholiam* appellant. Hæc autem gradu tantum, ut plurimum, differunt. Melancholia enim nunc citius, nunc tardius in maniam sæpissime transit; & remittente furore, gravior fere reddit tristitia: hinc furibundi omnes sunt timidi, & pusillanimes. Id quod in curationibus observasse, permagni usus est.

Quædam  
causæ. Hæmorrhoidum, aut catameniorum fluxus cohibiti, aut ulcera cacoethea suppressa, versus hunc morbum signa disponunt.

quædam. *Art. 985.* De Maniacis observare est: hæc triba illis fere omnibus esse communia. i. Eorum phantasias, five

sive imaginationes cogitationum impetuosarum æstu perpetuo occupari, ut dies & noctes varia sibi obmurmurent: 2. Notiones sive conceptus incongruos esse, & sub specie falsa, sive erronea eis repræsentari: 3. Illorum delirio audaciam, & furorem adjungi secus ac in Melancholicis, in quibus timor, & tristitia vigent.

Admirabile est in Maniacis universi corporis robur, quo fit, ut nulla vi cohiberi aliquando possint, aliquando validioribus vinculis illigati ea proscindant. Afferit *Fernelius* se Maniacos vidisse, qui per solidos quatuordecim menses nunquam dormiverint. De hac re dubitat *Bellini* sed *Boerhaavius* se hoc in Maniaco vidisse testatur. Raro item conqueruntur Maniaci de frigore, & una ex præcipuis Maniæ circumstantiis est frigoris tolerantia incredibilis.

Melancholici non una tantum insanix specie laborant; sed aut venenum, ne sibi detur, suspicantur; aut hominum consuetudinem perosi in solitudinem aufugiunt; aut ad supersticiosam religionem convertuntur; aut lucem hanc, vitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio voluptasque plurimis advenit, qui exinde in Maniam seu furorem præcipitant. Furoris item species infinitæ sunt, inter quas ea datur, qua laborantes propria membra dilacerant, pia cogitatione, Diis suis tanquam id postulantis, gratificantes. *Areæus*.

*Art. 986.* Insania quæ cum risu est tutior, quæ cum studio, pejor. Mania licet affectus sit periculosus, & sanatu molestissimus, per se lethalis non est; & lætitia plus justo Melancholicis superveniens, Maniam portendit. Boni ominis sunt utroque morbo evacuationes quælibet, dummodo copiosæ fuerint, per sudorem, urinam, alvum, hæmorrhoides, uterum, nares &c. Salutares etiam sunt febres Tertianæ, vel Quartanæ, nec non scabiei, aliorumque cutaneorum affectuum eruptiones. Viri sane furore, & Melancholia corripiuntur; rarius autem sed deterius mulieres furiis agitantur, inquit *Areæus*.

*Art. 987.* Quantum ad violentas contorsiones inquit *D. Doudon* in additionibus ad hunc Auctorem Cap. 3.

§. 22. & elevationes corporis per aerem a terra, quæ de *Energumenis* atque *Exstacticis* narrantur, nos easdem explicare possumus, animadvertendo in omnibus ferme corporis partibus fibras motrices ita contrahi posse, ut innumeras motuum compositiones secundum quamcumque directionem membra ducendi aptas, edant, quibus solidarum partium conatibus si diversas alterationes addas, quas humores recipere possunt, facile intelliges, totum corporis volumen tantis agitatum elateribus atque etiam ob humorum rarefactionem, a quibus penetratur, multum de propria gravitate amittere posse, atque hinc aliquandiu crassiori aere levius evadere, per quem ascendere, inde observabitur. Nos vero paucis explicationem hanc refellimus observando differentiam gravitatis specificæ corporis gravioris in liquidum longe levius demeri nullis artuum vibrationibus, & contorsionibus imminui posse, atque adeo cum plus quam mille vicibus gravius sit hominis corpus aere, in quo demergitur, oportere, ut sponte sua per eundem aerem ascendat, volumen plus quam mille vicibus majus obtineat, absque prioris massæ augmento. Hujusmodi enim imminutiones gravitatis absque congruo incremento voluminis naturæ legibus repugnant.

### Farrago sententiarum.

sectio  
Cadav.

*Art. 988. De horum affectuum origine, incremento & ætiologia videatur Boerhaave. In sectis cadaveribus Mania demortuis (inquit D. Sharr.) nihil alienum a sanorum corporibus invenitur, nisi forsan induratio meningis cerebri exterioris, quæ probabiliter ejusdem oscillationes liberas plurimum immutat, & interturbat unde spirituum animalium distributio valde enormis ad perturbata evadit.*

*Art. 989. Succus hederæ terrestris intus sumptus ad Remedia ij. vel iij. singulis diebus valde commendatur ad varia. hunc morbum vincendum, item linimentum ex eodem succo confectum quo caput rasum inungitur, curam promovere creditur. Specifica duo simplicia adeo de prædicata sunt hypericon (Fuga Demonum dictum) & anagallis. Angelus Sala pro arcano habuit tinctu-  
ram*



AP. III. *Maria & Melancholia.* 331  
m *hyperici*, & aliquando cum careret tinctura, de-  
xit *summitates* ejusdem in vino Rhenano & cere-  
ia tenui, atque utiliter propinavit. Decoctum *ana-*  
*lidis flore purpureo* (dos. ℥iv. ter in die) præmissio  
ns semel vomitorio tanquam specificum commendatur  
Ettmullero, Hartmanno, Vvillifio, Senerto, Quer-  
tano, &c.

Art. 990. Sequens emeticum, quod fortissimum est, Alia.  
hospitio mente captorum frequenter propinatur ℥.  
cc. fol. *asari* vj. vel ℥j. aq. card. ben. ℥ij. oxymel,  
illitic. ℥b. m. f. potio. Pharm. pauper.

### *Cerevisia melanagoga.*

℥. Rad. hellebor. nigr. ℔ss. jalap. ℥vij. hermodact,  
ss. coq. in cerevis. nov. cong. xxiv. ad cong. xvij.  
dendo sub finem coction. sen. alexandr. ℔ij. rad. rha-  
rb. ℥vj. tart. alb. ℥iv. sem. coriandr. ℥vj. rad. liqui-  
c. limatur. chalyb. ℥iv. fol. cochlear. hortens. M. iv.  
blaturæ add. fermentum.

### *Cerevisia ad Melancoliam.*

℥. Fol. marrhub. alb. m. iv. coq. in cerevis. nov.  
cong. vj. ad cong. iv. cola & in doliolo suspendatur  
cul. seq. ℥. Rad. chin. nodos. pæon. mar. ana ℥ij.  
polypod. ℥j. lapath. acut. ℥iiij. raphan. sylv. ℥. x. fol.  
ng. cervin. m. iiij. summit. hyperic. p. vj. cort. fra-  
in. ℥iv. bacc. junip. sem. dauc. ana ℥j. rasur. stamni  
in nodul. ℥iv. ferri rubiginos. ℔j. includ. omnia in  
accul. &c. *Pil. de lapide laxuli, flores salis armo-*  
*iaci martiati*, &c. sunt remedia proficua. Nescio an  
ires camphoræ, Regiæ societati a D. Kenier sesquian-  
to abhinc communicatæ, ad hos contumacissimos af-  
fectus expurgandos ulterius tentatæ fuerint, necne.  
Dosis in his casibus est semidrachmam omni nocte, præmis-  
is universalibus, & aliis remediis cephalicis & alte-  
rantibus non penitus neglectis. Philosoph. Transact.  
N. 400.

# HYPOCHONDRIACA & HYSTERICA affectio.

*Quæ secundus gradus Melancholice est.*

Hujus  
morbi  
natura  
& dia-  
gnosis.

*Art. 991.* Quando humor atrabilarius: qui perinde est ac pars illa sanguinis, quæ dissipatis mobilioribus crassa, pinguis, atra & terrestris relinquitur ab encephali vasibus ubi in Melancholia, aut Mania accumulabatur, ad viscera abdominalia transfertur ibique hæret, tunc alio nomine morbus Hypochondriacus vocari solet, quia atra bilis magis densa atque tenax reddita eam in primis abdominis regionem occupat, ubi hepar, lien, ventriculus, pancreas &c. locantur. Quare ponderis gravantis sensum, & anxietatem ægri circa hæc loca sentiunt, maxime assumptis cibo potuque, & anxietas adeo molesta est ut ipso dolore intolerabilior quandoque adigit miserum, ut ærumnosæ vitæ pertæsi, violentas sibi manus inferant. Tum ex læsa digestionem, acida acrimonia, ex cibis male concoctis genita, famelicos facit ægros, qui tamen ab assumptis cibis quam maxime gravantur; Hoc cum eo Hippocratis congruit. Neque sine cibo esse, neque copiosum cibum devoratum ferre potest. Verum cum jejunos fuerit, viscera missitant, & saliva acescunt, quum vero quidquam aderit, pondus in visceribus &c. Idem simul pallidum, flavitum, immo & fuscum faciei colores referunt, observante Aretæo: corporis quoque habitus in pejus labitur; colore sædo ex atro viridique commixto tinguntur, nisi inferius bilis descendat atque exeat, sed quoquoversum, per corpus cum sanguine diffunditur.

*Sydenhami sententia.*

Hypo-  
condria-  
ca, &  
hysteri-  
ca affe-  
ctio.

*Art. 992.* Hypochondriaca & hysterica affectio est morbus frequentissimus, paucissimæ quidem fœminæ vel viri sedentarii ab illo penitus immunes sunt symptomata, aliorum pæne omnium morborum æmulatur, quamcumque enim corporis partem infederit

sym-

ſymptomata qualia ei parti competunt, ſtatim pro-  
 ducit. In capite *Apoplexiam* facit, quæ ſimiliter  
 plegia ſolvitur; Spasmos horrendos gignit *epile-*  
*ptici* ſimiles, paroxyſmum hyſtericum proprie dictum  
 ciens, vulgo *uteri ſtrangulatum Cephalalgiam* in-  
 tolerabilem excitat, *clavus hyſtericus* nominatur, ut  
 ſtorem tranſverſo pollice poſſis contegere: *Palpita-*  
*tionem cordis* præcipue *chloroſi* laborantibus concitat.  
 Aliquando ( ſed rarius ) pulmones obſidet, & *tuffim*  
 citata fere continuam ſive expectoratione *Dolores*  
*colicos* & *iliacam paſſionem* nonnunquam æmulatur,  
 interdum *ictero* paroxyſmus ſolvitur; hoc genus in  
 ſeminis laxiori corporis habitu præditis locum habet;  
 ſalute plerumque deſperant. Paroxyſmum *nephry-*  
*um* aliquando mentitur. In ventriculo *vomitum*,  
 in inteſtinis *diarrhæam* efficit, ſine dolore tamen.  
 Partes externas non raro occupat dolore: præcipue in  
 dorſo, aliquando tumore maxime cruribus & tibiis:  
 Dolores ab *Hydropicis* diſcriminantur, eo quod majores  
 ſint tempore matutino, & veſtigium digiti impreſ-  
 ſum non retineant. *Dentes* etiam interdum afficit. Do-  
 lorem in dorſo certo certius perſentiſcunt, quotquot  
 affectu tanguntur. Externarum partium *refrigera-*  
 tionis omnibus quaſi viam ſternit, & plerumque non  
 finito paroxyſmo diſpellitur. Adhuc in fere omnibus  
 ſpirituum dejectiones & ſubſidentia, riſus & la-  
 queæ ſine ulla *anæſtheſi*. Et poſtremo ( quod triſtiſ-  
 ſimum eſt ) magis *animo* ægrotant quam *corpore* hoc  
 modo afflicti. Urina limpida & magna quantitate ex-  
 mitur; quod ſignum eſt *pathognomonicum*. Ptya-  
 ſmos nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut  
 mercurio delibutos facile credere. *Flatus nidoroſos*,  
 ac *acidus* eructant, atrociffima *animi pathemata* in  
 ſe ſovent.

Art. 993. Cauſæ *procacardiæ* ſunt vel vehemen- Cauſa.  
 tes corporis motus, vel etiam multo ſæpius vio-  
 lentæ quædam *animi commotiones* a repentino aliquo  
 modo iræ, ſive doloris, & ſimilium paſſionum inſultu.  
 Cauſa efficiens eſt *anæſtheſis* ſpirituum animalium. Se-  
 cundum mentem quorundam *pathemata*, vapores  
 ſcilicet dicta, alterutro; tanquam cauſa immediata,  
 fundamento niti, viz. nimis ſtitillante, vel mole-  
 ſtione-



fiore quadam ineffabili sensatione *præter modum partes illinc irritante, vel hinc vellicante; unde secretiores evadunt valde impares & male comparatæ.*

*Art. 994.* Præcipua indicatio curativa sanguinis corroborationem indigitat; ideoque post debitas evacuationes (ubi indicantur) *chalybeatis, amaris, corroborantibus & volatilibus* cura perficienda est. Chalybeatis foeminis quandoque magnas tum animi tum corpori perturbationes inducunt; in hoc casu exhibe *laudanum liquidum*. guttas aliquot sing. nocte in *aq. aliqua hysterica*. *Aquæ minerales* omnes chalybis præparatione longe superant. *Limaturæ ferri crudæ* in robustis corporibus cum majori fructu exhibentur, quam quævis præparatio. Aqua communis imprægnata *ferreis clavibus & calceis equinis, &c.* medicamentosa evadit æque a *aquæ minerales*. Inter bibendum *aquas ferreas*, aliquod symptoma gravius acciderit, quod potatione aquarum referri potest, tunc ab iis abstinendum, donec symptoma istud evanuerit: in earum usu ad septimanas ad minimum perseverandum est; *zingiber conditum, & semina carvi saccharata* ad ventriculum calefaciendum sunt subinde sumenda, dum *aquas* bibunt. *Theriaca Andromach. & vinum Hispanicum* multum laudantur. *Cortex Peruvianus* in hoc morbo eximias vires obtinet, præsertim foeminis, quæ spatim afficiuntur, ut & *dieta lactea* in *colica hysterica*. *Evacuatio* usus est eximii. In paroxysmo ad foetida confugiendum est, quæ spiritus in ordinem compellunt quæcunque foetent huic intentioni inserviunt. In doloribus vehementioribus, vomitionibus, & diarrhœis ad laudanum tanquam ad sacram anchoram confugiendum est.

### Villisi sententia.

*Art. 995.* Hystericæ affectionis signa sunt motus in imo ventre, ibidemque velut globi cujusdam ascensus, dein rugitus, aut vomendi nixus, hypochondriacum distensio & murmur cum flatuum eructatione respiratio inæqualis ac ut plurimum impedita, præfectio in gutture, vertigo, oculorum inversio aut re-

atio, sæpe risus aut fletus, fabulatio absurda, quandoque *azani* & *azani* cum pulsu obscuro aut nullo aspectu cadaveroso, interdum motus convulsivi in facie & artubus, & nonnunquam in toto corpore.

Art. 996. Symptomata hujus morbi in viris sunt, Sympto.  
quæ sequuntur: cardialgia, flatuum ingens proventus, <sup>mata</sup>  
rugitus ac crebra vomitio, in sinistro hypochondrio in viris.  
distensio, ec subtus *ventriculū* pulsatio immanis sentitur, borborygmi & murmura. In *thorace* constriction  
& angustia, respiratio difficilis, cordis tremor in palpitatio, spirituum deliquia. In *capite* dolores atrocissimi, scotomiæ, vertigines, vigiliæ pertinaces, cogitationum æstus & fluctuatio, animi incertitudo, phantasia perturbata, rei cujusque formido & suspicio, morborum, quibus immunes sunt, possessio imaginaria, melancholia & mania, dolores vagi, spasmi, stupores, sudores nocturni, febres erraticæ, &c. sputatio fere continua. *Higlmorus* supponit præcipuam hujus morbi causam esse in vitiosa ventriculi constitutione.

Art. 997. Ad therapeiam quod attinet, quoniam Curatio.  
quamplurima symptomata sunt *convulsiva*, ideo constat remedia *antispasmodica* potissimum indicari. In paroxysmo *fætida* interne atque externe valde profunt; nonnullis convenit in medio paroxysmo *aq. frigida* haustum, in qua *camphora* deflagravit, propinare. Extra paroxysmum *evacuationibus* necessariis factis, medicamenta vulgo *digestiva*, quæ ad ventriculi tonum ac fermentum spectant, locum habent: talia sunt *tinctura sacra*, *elixir proprietat. pulv. ari. comp. sal. absynth. cremor. tartar. vitriolat. vitriolum Martis* &c. Inter *digestiva* & *chalybeata* pro certo eminent virtute entis Veneri; utcunque tamen, ansit vera anodynum, ut a quibusdam perhibetur, dubius hæreo; nondum enim satis compertum habui. Externe *fotus stomachici*; postremo ex medicamentis *chalybeatis* maximum juvamen sperandum est. Potus assiduus *coffee* aut *thee* paratus nonnullis emolumento fuit; *acidule* fere semper cum fructu sumuntur. *Pil. nostr. hyster.* in paroxysmo & extra; *℞. Fæcul. brion. asæ fætid. castor. an j. sal. coral. succin. Jovis ana ss. galban. in aq. bryon. comp. solut. q. s. f. massa.*

Pur-



## Purcelli sententia .

Hic affe-  
ctus est  
morbo.  
rum le-  
gio .

*Art. 998.* Hysterica passio ( inquit *Galenus* ) unum quidem est nomen , varia tamen & innumera accidentia sub se comprehendit . Inter alia symptomata hoc morbo occurrentia perquam notabilis est sensus frigoris , quem percipiunt ægræ per dorsum assurguntem & mox per universum corpus diffusum ; sequitur cephalalgia & nonnunquam cordis palpitatio & animi deliquium , & deinde brevi sensim ad se redeunt : in aliis præterlapso frigore succedit insignis calor , cui pleraque symptomata antedicta cum aliquot novis accersit ; interdum in initio paroxysmi frigus est vix perceptibile , & tunc symptomata graviora non nisi post accessum caloris tragœdiam agunt . Propter diaphragmatis & musculorum respirationi interservientium violentum ac perpetuum spasmus fœminæ hystericæ quandoque diutissime procumbunt instar mortuorum sine ( sensibili ) respiratione ; immo interdum per integrum diem & diutius . Probe animavertendum est hunc morbum ire & redire , & suos habere paroxysmos , etiam si non certis ac statis periodis recurrentes , sicut febrium intermittentium .

Causæ .

*Art. 999.* Causa primaria hujus affectus sunt *cruditates & coctiones vitiosæ* , quæ plerumque ante adventum paroxysmi in ventriculo gravedinem ac perturbationem , in intestinis murmura ac borborygmos pariunt , unde producitur spirituum *αταξία* , quæ est *causa proxima* reliquorum symptomatum ; *causæ remotiores* ex errore aliquo circa sex res non naturales suboriuntur .

Metho-  
dus the-  
rapenti-  
ca .

*Art. 1000.* Ad therapiam rite instituendam accurate distinguendum est medico de constitutione patientis , an sit sanguinea & biliosa , vel pituitosa ac melancholica , & etiam de cruditatis peculiari genio , utrum sanguinis crasim nimis viscidam & glutinosam reddit , aut nimis laxam & ebullitionibus proclivem . Affectionum Hystericarum cura huic fundamento maxime innititur : ex his etenim inter se plane discrepantibus oriuntur indicationes longe a se invicem diversæ . Sensatio frigoris in dorso , item pulsus debilis , & tar-



& tardus, & sanguinis lentorem arguunt: pulsus celerior, calor ingens frigus excipiens, odor moschi, zibethi, ambræ, paroxysmum accersens, statum sanguinis esse laxiorem, & fermentiscibilem incidant.

*Art. 1001.* E paroxysmo excitandæ sunt, naribus *Curatio.*  
*volatilia* & *fætida* admovendo, *plantas pedum titilando* (experimentum est *Dolæi*) & in graviore casu *apoplectico* scilicet, *punctionibus*, *scarificationibus*, *vesificantibus*, *ustionibus*, *sartagine calefacta*, &c. sunt suscitandæ. Iis, quarum sanguis est viscosus & nimis tenax, convenit *venæsectio*, & postmodum vel die sequenti *emeticum*, vel, si minus congruum judicatur, *catharticum*; his ita præmissis, ad *attenuantia* & *aperitiva* accidendum est; & hic apprime conducunt *juscula ovin.* vel *gallin.* cum *radicibus* & *herbis aperitivis*, & *rubiginis ferræ* (in nodul. ligat.) incoct. (vel, si ob ferrum incoctum ventriculus nauseat, forsan non erit minus efficax, si singulis auroris post medicamentum aliquod *chalybeatum* assumptum superhauriatur cratillus istiusmodi jusculi.) Potus quotidianus sit *vinum Gallicum* aqua dilutum cum gut. xx. vel xxx. sp. sequent.: *℥. Sal. volat. oleos. ʒiij. sp. lavand. ʒj. m.* In hoc affectu nullum remedium efficacius datur quam *radix hellebori* vel ejus *extractum*. Constat ex solo *elect. chalybeat. seq.* (*℥. Cort. Peruvian. pulveris. ʒ. coral. rub. ocul. cancer. præp. ana ʒj. ferr. rubiginos. ʒiij. sal. absynth. ʒij. cum q. s. syr. absynth. f. electuarium*) Feminas quamplurimas Hystericas curatas esse. In altera crasi, ubi sanguis est nimis laxus & ebulliens, indicantur remedia calorem temperantia; *venæsectio*, *emulsiones*, *cortex Peruvianus*, *aq. Tubrigenses*, *Barthonienses*, *jusculum cancerorum fluviatilium*, &c. Accuratam sane horum affectuum historicam symptomatum ætiologiam nobis dedit laudatus auctor in tractatu suo eleganti *de hysteria*, idiomata vernaculo cun-

## Ettmulleri sententia.

Mali hy-  
pochon-  
driaci  
sympto-  
mata  
præci-  
pua.

*Art. 1002.* Malum Hypochondriacum est affectus ex multis symptomatibus diversimode complicatus, a cruditate acida plus minus viscida in primis viis natus; cujus eminentior gradus vocari solet *scorbutus*. Inter signa primaria sequentia sunt eminentiora; viz. adsunt pathemata stomachi non rite digerentis cum symptomatibus circa abdomen; cum torminibus & flatibus intestinorum, alvi obstructione, corporis perturbatione &c. Sed non omnia in omnibus; ordinario motiones, & plus minus dolores, murmuraciones, distentiones, & aliæ abdominis affectiones, cum præcordiorum angustia, & respirationis difficultate, flatibus & scotomatibus, vel vertiginosa affectione rationem formalem constituunt. Est affectus quidem complicatissimus; tres fere gradus paroxysmi statuuntur, viz. primo dum *respiratio est libera*. 2. Quando *hæc impedita*, & *pulsus* fere cessat. 3. Quando etiam *convulsiones* superveniunt.

*Art. 1003.* Emplastrum e galbano cum aliquot gra-  
Curatio- nis *zibethi* umbilico apponi debet; *zibethum* enim umbilico illitum suffocationes Hystericas insigniter alleviat, modo non nares nimium feriat. *Enemata* conducunt ex *carminantibus cum ol. succini* & *salibus volatilibus*, item ex *urina sani*; ut & *clysmata terebinthinata*. Misturæ ex *salibus volat.* cum *castor.* & *opiatibus* optime paroxysmum sedant; conducunt etiam *trochisci de myrrh.* *stercus equi maris* est remedium nulli cedens, *succus ejus cum vino*, vel *decoctum* propinatum expectando sudorem est incomparabile in vel extra paroxysmum; *fuligo furni splendens* est medicamentum pro pauperibus; item *flores sulph. cum N. M.* & *theriaca* in vino solut. cum additione *castor.* In graviore malo exhibere soleo potionem seq. tererimi quidem saporis, sed præsentanei effectus; ʒ. *Ab. menthe sambuc. matricar. anã* ʒj. *essent. castoris* ʒij. *ad* ʒiij. *sal. volat. C. C. gr. xij. succin. gr. viij. laudan. hyst. ʒss. syr. e cort. aurant. m.* ʒss. capiatur expectando sudorem. In specie *sclæra* (horminum hortense)

se ( vel ejus decoctum est experimentum singulare paucis notum in suffocatiene .

*Louveri sententia .*

*Art. 1004.* Melancholia Hypochondriaca affecti hu- Bouli-  
more salino in ventriculo deposito magna *boulimia* mia .  
sæpissime tentantur ; & quamdiu appetitus iste durat ,  
ab omni dolore corporis immunes sunt , humore vero  
isto acri & ferino , metastasi quasi facti , in alias cor-  
poris partes deposito , cruciatur & ibi moriuntur , in-  
terea etiam ut ventriculi appetitus non sit .  
propter defectum ejus penitus hanc morbi causam ,  
hypochondriacis fere omnibus solenne est , atque maxime  
guinis diethesi , potius quam lienis vitio , proxime im-  
putari debet . De corde p. 147.

*Scardonæ sententia .*

*Art. 1005.* Si res mihi sit cum ægro laxioris ha- In ha-  
bitus , temperamenti , ut ajunt , frigidi , innappetentia bitu  
insigni laborante sine febre ; atque hypochondriorum corpo-  
æstu , contentus sum salibus lixiviosis : absynth. cen- ris laxo.  
taur. min. agrimon. vel tart. solub. terra fol. tar-  
tar. vitriol. a ℥ij. ad ℥j. ex juscule junioris pulli pro-  
pinandis ad multos dies .

*Art. 1006.* Si præpollentis acidi indicia se prodant Ubi in-  
( sunt autem acuta fames , ventriculi morsus , rerum in- dicia  
suetarum & incongruarum appetitus , ructus acidum spi- acidi  
rantes ) pulv. VVedelii absorbente , dempto eidem vi- adsunt  
triolo ad ʒ. sem. uti expedit .

*Art. 1007.* Alterutrum horum adhibeam , levem in- Rhabar-  
fusionem rhabarbari quolibet tertio , vel quarto die ex- barum .  
hibeo in hunc fere modum paratant . ʒj. Rhab. elect.  
in taleol. incis. ℥ij. tart. vitriol. vel solub. j. m. in-  
fund. per 24. hor super ciner. calid. in aq. font. unc.  
vj. colatur. postea , & liquor leniter exprimatur . Co-  
laturæ addatur syrup. flor. persicor. unc. j. pro una vi-  
ce , & sic pro aliis .

Primo vere succis optime depuratis Fumar. sonch. a-  
grimon. taraxaci ad unc. iij. ex juscule junioris pulli  
ti prestat . Hisce martialia succedant . Si acidum mu-  
cosis



cosis quifquiliis prævaleat, limatura martis super lapid. porphyrit. levig. a gr. ad xv. ex succo concreto absynth. aut ejusdem conserva per viginti circiter dies adhibenda.

Si mucus iners *Art. 1008.* Si mucus iners prædominetur, tinctura martis aceto aut succo alio acido extracta a ℥. sem. ad ʒj. ex decoct. theiformi absynth. uti expedit. Sicuti salium digestivorum, ita succorum, & martialium usui rhabarbari usus intermiscendus. Prævalente mucositate inerti pillulæ tartareæ *Bontii* a. j. Ad ʒ. sem. vel tartareæ *Schroederi*, *Quercetani*, & aliæ similes ante cœnam, visæ sunt convenire, dummodo ad immodicum hæmorrhoidum fluxum proclives non sint ægri. Celebres enim sunt apud Hollandos pillulæ illæ *Bontii*, quarum hæc fere descriptio est. *℥. aloes succotr. ʒiij. gumm. ammoniac. ʒj. sem. tart. vitriol. ʒ. sem. m. f. a massa pillul.*

Acidulæ *Art. 1009.* Opportuno tempore ad aquas acidulas, juvant. tandem ad lac primum asininum, mox vaccinum deveniendum. Cibi simplices sint, ab acidis, a vino æger abstineat. A pastu tinctur. absynth. ex decoct. Caffæ, aut ejusdem conservam ante cibum assumat.

In habitu corporis sicco. *Art. 1010.* Si æger siccioris, & calidioris sit habitus cum hypochondriorum æstu, tensione, pulsus durtie, febre, solo oleo amygdal. dulc. & clysteribus ex aqua hordei, cum saccharo contentus sum. Primo vere succi optime depurati portulac. cichor. endiv. fumar. vel serum lactis, cum iisdem plantis destilatum visæ sunt convenire. Æstuosa tempestate ad balnea aquæ dulcis, aquas Villenses, Nucelianas, vel acidulas deveniendum, tandem ad lac.

### Farrago sententiarum.

*Art. 1011.* Morbi longi, teste Platone in *Timæo*, blandissime tractari expetunt, non vehementioribus irritari. Mens ipsa ægroti frequentissimè adeo insigniter afficitur in hoc morbo, ut sæpius cogatur medicus aliquid admittere, quod jubent consuetudo, opinio vulgi, superstitio præjudicaria, quod tamen sanæ ratio e contra vetat.

*Art. 1012.* Mulieres hysterice sensum quemdam frigoris

goris in vertice capitis pati solent, estque hoc præcipuum hysteriæ diagnosticon. *Baglivus*.

*Art. 1013.* *Bezoardicum joviale* est præstantissimum *Bezoar-*  
remedium & infallibile in affectibus hystericis, ut plu- *dicum*  
ries mirati sumus. *Idem*. *joviale*.

*Art. 1014.* In affectionibus hypochondriacis vomitus est ante omnia provocandus; sic enim fomes sub- *Emeti-*  
trahitur morbo, & revera est basis curæ. *Pitcarn. in* *corum*  
*MS.* In hoc consentientem habemus doctissimum D. *efficacia*  
*Vwoodvard*, mihi amicissimum.

*Art. 1015.* Remedia sequentia quamplurimis indi- *Reme-*  
cationibus satisfaciunt, si quis cognoverit uti. *Aurum* *dia va-*  
*Mosaicum*, *cerevis. hysteric. Fulleri. Calybs sive acid.* *ria*,  
*Batean. Decoctum nigrum* ( *Art. 48.* ) *elect. hysteric.*  
*elect. Peruv. epileptic. & enem. hysteric. Fulleri. Ens*  
*Vener. flor. sal. armoniac. martiat. Infusum amarum*  
*sequens ℥l. cort. Peruv. crasse pulv. ℥ij. tart. alb.*  
*℥ij. Rad. serpent. virgin. ifs. infund. frigide in vin. rub.*  
*℥ij. coletur usus tempore infus. chalybeat. amar.*  
( *Art. 132.* ) *Mistura ephrastica, julap. camphorat.*  
*mistura hysteric. spirituos. & pill hysteric. Fulleri.*  
*Pulvis ad guttetam, pulv. hysteric. Bat. sal. Jovis,*  
*tinctur. epileptic. Fuller. sp. C. C. succinat. tartarum*  
*vitriolatum, vitriolum Martis &c.*

*Art. 1016.* Quando homo hystericus, vel hypo-  
chondriacus ira excandescit, vel quavis de causa ve- *Præci-*  
hementer contristatur, mox ejus organorum motrices *pua*  
fibræ turbantur, plurimaque pars naturalium munerum *morbi*  
pervertitur, ægri hinc pessima sibi ominantur, & re- *sympto-*  
cuperandæ salutis spem protinus abjiciunt, urinam lym- *mata*.  
pidissimam reddunt, in gravidis abortus sequitur, at-  
que inde raptus ad cerebrum; unde apoplexia in pa-  
ralysim desinens, in aliis convulsiones epilepticæ ac-  
cedunt, quæ vulgo *strangulatus*; vel *matricis suffo-*  
*cationes* dicuntur. Aliquando morbus externa capitis  
occupat, ubi in parvo spatio vix pollicem excedente  
acutissimus dolor exoritur, *Clavus hystericus* dictus,  
& si forte ad pulmones vergat tussim facit molestissi-  
mam: que propriæ *tussis hystericæ* dici debet. Tran-  
seunte morbo ad ventrem colica hystericæ prodit, &  
ubi habitum externum corporis occupat dolores cum  
vel sine tumore in mandibulis, brachiis, manibus,

femoribus, & cruribus exsurgunt, sed in cruribus sæpiissime tumores ferme hydropici apparent, qui tamen ab eis distinguuntur, quia mane crescant, & unum tantum crus tenent altero immuni relicto. Ceterum ex doloribus nullus frequentior, & pertinacior est, quam qui dorsum exercet, aut omnes hujusmodi dolores id commune habent, quod vestium levissimos quosque contactus dedignentur a quibus perinde irritantur, ac si caro verberibus mulctata fuisset.

*Art. 1017.* Quoad genericam hujus morbi curationem, si satis temporis divexarit, ut merito suspicari liceat, humores corpori corrupisse, jubenda erit phlebotomia, atque inde purgatio, priusquam animus intendatur organicis partibus robur, & fluidis aptam mobilitatem conciliandi, quibus secunda valetudo restituetur. Si vero dolores, vomitus, & diarrhœæ vehementer excruciantes dilationem hanc non perferant, incipiendum erit ab anodyno, quemadmodum Laudanum liquidum est, sequenti ratione concinnatum.

*Laudanum li-* *24. Vin. Hispan. lib. j. opii unc. ij. croc. unc. j. cin-*  
*quidum.* *namon. caryophyl. ana j. infund. in M. B. per duos*  
*tresve dies quousque liquor congruam consistent. ad-*  
*piscatur. Postea filtrat. servetur usui;* hujus quædam  
 gutt. cum aquæ cinnamomi cochleare propinantur.

Post venam in brachio sectam postridie dabitur purgans elapsis duobus, vel tribus diebus reiterandum, nec hujus molestiæ priora mala gravantes, ægrum deterrere debent, cum id a purgantibus, ea ipsa die quamuntur præstari soleat, utilitate levaminis diebus subsequenter emergente. Post catharsin remedia martialia usurpanda veniunt, triginta fere diebus continuanda, quo tempore nullum aliud purgans, adhibetur, quod omnes calybis effectus infringeret, atque demum ad hysterica spiritus confortantia deveniendum est.

*Hysteri-* *Art. 1018.* Ast methodus qua mulier hysterica cu-  
*carum* *rari debet, ex. gr. hujusmodi est. Octo circiter san-*  
*curatio.* *guinis unciis extractis, ejus umbilico emplastrum ap-*  
*plicatur ex galban. unc. iij. tinct. castorei dissolut-*  
*cui add. gumm. tacamach. 3. Postridie mane quatuor-*  
*sumat pillul. ejusmodi.*

*24. Pillul. cochlear. maj. 3ij. castor. pulv. gr. ij. ba-*  
*lam-*



*Sam. peruv. gutt. iiij. reform. pupill. xij. quarum*  
*iv. singulo biduo capi debent, eisdem superdor-*  
*miendo.*

Si animi deliqua, aut languores accesserint, qua-  
 tuor, vel quinque cochlearia sequentis julapii propi- Pilulæ  
 nabuntur. ℞. *Aq. rutæ unc. iv. bryon. compos. unc. purgan-*  
*ij. castor. in nodulo suspens. ℥. sem. sacchar. fin. q. f. tes.*  
*f. julap. in cujus priori dosi si occasio urgeat effundi-*  
*mus sp. C. C. gutt. xx.*

Post descriptas purgantes pillulas, capiat de sequen-  
 tibus quotidie mane duas; totidemque quinque horis Julapi-  
 a prandio, per triginta dies, vini absynthiti cya- um.  
 tum superbibendo. Modo dictæ pillulæ parantur ex  
*Limat. calyb. gr. viij. extract. absynt. q. f.* Si vero  
 easdem lubeat forma bolli comparare; ℞. *Conserv.*  
*absynth. roman. cortic. aurant. ana unc. j. rad. an-* Pilulæ  
*gel. condit. nuc. moscat. condit. theriac. andromac. aliæ.*  
*ana unc. sem. gingiber. condit. ℥. syrop. limon. vel*  
*aurantior. q. f. f. Electuarium. ℞. de hoc electuar.*  
*℥ij. limat. calyb. gr. viij. syrup. aurant. q. f. reform.*  
 bollus mane, & vespere ingerendus, superbibendo vini  
 absynth. cyathum vel vj. cochlearia sequentis infusio- Infusio  
 nis. ℞. *rad. angelic. enul. campan. imperator. ana*  
*unc. j. fol. absynth. vulg. centaur. min. marrhub. alb.*  
*chamædr. ana man. j. cortic. 2. aurant. infus. in vin.*  
*hispan. ad duorum digit. supereminentiam; colatura*  
*servetur usui.*

Art. 1019. Pro delicatulis autem sequenti ratione Pulvis  
 calybs præparari poterit. ℞. *Limat. ferr. subtiliss.*  
*pulv. unc. j. pulv. aron. compos. ℥vj. semin. co-*  
*riand. anis. fœnicul. ana unc. sem. cinnamom. opt. co-*  
*wall. rub. pp. ana ℥ij. nucis myrristr. 2ij. f. pulv.*  
*tenuiss. cui add. sacchar. fin. ad pondus omnium.*  
 hujus pulveris ægra sumat ℥. sem. bis in die per  
 quatrimum, deinde ℥j. per 40. dies superbiben-  
 do vini absynth. cochlearia vj. vel de sequenti Julia-  
 pio.

℞. *Aq. lact. alexiter. lib. j. aq. gentian. compos. Julia-*  
*unc. iv. absynth. compos. unc. ij. sacchar. alb. f. f. pium.*  
*Julap.*

Aliud ℞. *Vin. rhenan. absynthiti lib. sem. aq.*

*gentian. compos. unc. ij. syrup. oxallidis unc. j. f. julap. ut prius adhibendum.*

*Pilulæ.* Quousque hæc curatio perennat, utatur ægra pilulis sequentibus: *℥. Myrrh. elect. galban. as. foetid. ana j. castor. ʒ. sem. bals. peruv. q. s. m. & de singula drachma reformentur pillul. xij. singula nocte ad desin. iij. ingerendæ; superbibendo cochlearia tria, vel quatuor aq. bryoniæ compos. Quodsi eadem ob commixta gummata alvum moverint, sequentes pro eis adhiberi poterunt.*

*Pilulæ aliz.* *℥. Castor. ʒj. sal. volat. succin. ʒ. sem. extract. rutæ q. s. f. pil. xxiv. quarum tres singula nocte devoret ægra superbibendo tria, vel quatuor cochlearia julapii cujusdam hysterici, vel de supra descriptis.*

*Art. 1020.* In hac affectione convenit etiam spirit. C. C. gutt. xvj. vel xvij. una cum aq. quadam convenienti subinde propinare, quæ si hujusmodi remediis non cedat, ad alia transeundum est.

*Pilulæ aliz.* *℥. Trochisc. myrrh. pulv. ʒj. balsam. sulphur. ter. rebinth. gutt. iv. gumm. ammoniac. solut. q. s. m. f. pillul. iv. mane & vespere sumendæ, superbibendo quatuor, vel quinque cochlearia julapii cujusvis hysterici add. spir. C. C. gut. ij.*

*Art. 1021.* In hujusmodi morbis antiscorbutica etiam optime faciunt, idcirco sequens addimus electuarium.

*Electuarium.* *℥. Conf. cochleariæ unc. ij. jujub. unc. j. pulv. ariz. compos. ʒvj. syrup. aurant. q. s. f. elect. ad avellan. magnit. mane 5. hor. a prand. & vespere devorandum, superbibendo aq. raphan. compos. cochl. vj. vel tantumidem de sequenti. ℥. Rad. raphan. sylv. concis. lib. ij. rad. art. lib. j. fol. cochl. hortens. man. viij. fol. menth. salv. nastrut. aq. beccabung. ana man. j. sem. cochl. hortens. contus. lib. sem. nuc. moscat. unc. sem. vin. alb. lib. xij. destil. omnia cum educatione lib. vj. & servetur usui. Vel destill. fol. cochlear. hortens. recent. aqua inde comparata servetur usu.*

*Aqua compo-  
sita.*

*Mixtura.* *Art. 1022.* In potu ordinario tria, vel quatuor cochlearia sequentis mixturæ addere licebit. *Rad. raphan. sylv. sem. cochl. hort. ana unc. sem. fol. cochlear. ejusdem man. ij. pulv. mali aurant. misc. in mortario sensim affundendo vini albi lib. sem. deinde tra-*



*trajecta cum levi expressione mixtura, eadem fervetur usui.*

*Art. 1023.* Non obstante tantorum remediorum usu, si affectio adhuc permaneat, aquæ minerales sulphureæ, vel calybeatæ consulendæ sunt, ex quibus si triste aliquod symptoma exsurgat, quod merito ejusdem tribui possit, eousque inhibebuntur, donec idem conquiescat. Ceterum harum aquarum usus sex saltem hebdomadis continuandus commendabitur, atque interea stomachum corroborandi gratia, dabitur, ægræ subinde ingerendum vel Zinzib. conditum; vel Carvi semina saccharo obducta. Decem prioribus diebus juvabit ei tres pillulas hystericas sub noctis ingressum quotidie devorandas exhibere, superbibendo quatuor, vel quinque cochlearia Julapii cujusdam hysterici. Quantum ad aquas sulphureas necesse erit easdem singulo biduo sub forma balnei usurpare, continuando hujusmodi praxin, vel per duos menses. vel per sex saltem hebdomadas.

*Art. 1024.* Si ex calybis usu corpus nimium incalcescat, post singulum quatrimum mane dabuntur lib. iv. aquæ cujuslibet Mineralis purgativæ, cujus ope minori molestia alvus laxabitur, ac remediis ex Pharmacopea mutuatis præstari solet. Si vero graviora incommoda calybs afferat, eadem Laudano liquido cum hysterica quavis aqua propinato compescenda erunt.

*Art. 1025.* Viribus a morbi diuturnitate exinanitis curatio a phlebotomia, aut alvi purgatione nequaquam exordietur; sed ab ipso calybe: & ubi symptomata mitiora occurrant, satis erit post institutam phlebotomiam ventrem in triduum, vel quatrimum laxare, ut inde mane, & vespere pillulæ hystericæ per decem dies utilius usurpari possint.

*Art. 1026.* Vehementi dolore quovis excruciante, in Vomitibus & diarrhœis enormioribus Laudanum primo jubebitur, deinde opera dabitur, ut spiritus confirmetur; & si vires permittent vena pertusa, laxativum aliquod ante Laudanum propinabitur, iis in primis sæminis, quæ robusto temperamento sanguineoque pollent. In debilioribus autem satis erit paululum a paroxysmo leviori aliquo Emetico stomachum levare, inde largam Theriacæ vel Orvietani dosin jubere,



bere, cui superbibendus erit liquor aliquis spirituosus; una cum pauco Laudano liquido mixtus; sed si vomitus diu perserveraverit omisso emetico statim ad Laudanum confugietur.

Symptomatibus jam superatis per aliquot dies mane. & vespere Laudani usus continuabitur hæc duo maxima diligentia observando: 1. nempe, quod semel adhibito ab evacuationibus laudano, eodem remedio, eademque ejus dosi continuandum erit usque ad omnimodam symptomatum evanescentiam; 2. quod laudani usus motuum perturbatorum compositionem præstans nulla evacuantia, ne quidem simpliciores Clysteres perfert, a quibus cavendum erit.

*Quædam  
alia re-  
media.* Art. 1027. Ceterum frequens Theriacæ Andromaci usus diu continuatus in hujusmodi affectionibus eximie quidem est virtutis æque ac ceteris in morbis omnibus, qui a nativi caloris debilitate ac concoctionis infirmitate proficiuntur.

Vinum etiam Hispanicum in quo infunditur Gentiana, Angelica, Absynthium, Centaurium, Cortic. Aurant. similiaque corroborantia plurimum in hujusmodi morbis prodest, quando ejus nonnulla cochlearia ter in die sumuntur, dummodo ægræ temperamentum, nec debile, nec biliosum videatur.

Art. 1028. In Convulsionibus hysteris, quæ periodice invadunt, Cortex Peruvianus ad quantitatem ℥j. mane, & vespere sumptus per aliquot hebdomadas mirifice convenit.

Art. 1029. Debiliores vero, & delicatulæ diætæ lactea uti possunt, maxime si a Colica hysterica sæpe exerceantur, modo ea omnia incommoda perferre possint, quæ primis hujusce diætæ diebus superveniunt: cum sæpe lac in stomacho coaguletur, aut alimentum vaide tenue vires, ut par est, haud refocillans minifret.

Art. 1030. Ceterum nihil magis sanguinem depurat, & solidis, spiritibusque nihil magis roboris tribuit, quam equo vehi, & hujusmodi exercitium per aerem salubrem diutius protrahere; pro quo in curru commode substitui possunt.

Art. 1031. Quodsi hysterica, vel hypochondriaca passio nimis evacuationibus, vel menstruorum aut hæ-

hæmorrhoidorum fluxui immodico superveniat, talica-  
su, vitæ regimine paulo incrassante instituto, propi-  
nanda est libra dimidia ter in die sequenti Potus. 4.

*Aq. plant. Vini rubr. ana q. v. & Sacchar. fini q. s.* Potio.  
*ebull. ad consumpt. tertiæ partis* atque utile si mul est  
si ægra subinde julapio quodam hysterico minori & par-  
va dosi utatur. Ad erigendos spiritus satis est galba-  
num, assamque fœtidam ana .ij. cum castor. .j. &  
sem. sal. volat. succin. 5 sem. m. naribus admove-  
re, vel sp. sal. Armoniac. .ij. tantum.

*Art. 1032.* Quando de inhibendo agitur fluxu men-  
struo, eductis octo sang. unc. a brachio, atque po-  
stridie exhibito pro ægræ viribus cathartico, ejus lum-  
bis applicabitur Emplastrum. 24. Empl. Diapalm. pro  
Herniis ana q. s., indeque sequens electuarium inter  
utiliora habebitur.

*Cons. ros. exsicc. unc. ij. trochisc. terr. lemn. 3j.* Electua-  
*f. cortic. Granat. corall. rubr. ana 3ij. Lapid. Hæ-* rium.  
*matit. sang. dracon. bol. armen. ana 3j. Syrup. co-*  
*ral. simpl. q. s. m. f. Electuarium*, de quo capiat  
ægra, magnitud. nucis moscatæ mane, at quinta ho-  
ra post prandium, superbibendo sex cochlearia sequen-  
tis julapii.

*Aq. centinod. Plantag. ana unc. ij. Aq. cinamom.*  
*hordeis, syrup. ros. sicc. ana unc. j. sp. vin. q. s. ad*  
*gratam aciditatem. M.*

Utiliter etiam ter, vel quater in die ad vj. unc. do-  
Jalapium  
sin propinari potest succus expressi fœnicul. plantag. vel  
urticæ, indeque clarificatus.

Ceterum quoad usum purgantium, eadem quovis e-  
lapsio biduo, vel triduo utiliter reiterantur usque ad  
tertiam vicem, interposito subinde Paregorico ex Sy-  
rup. Diacodii ad unc. j.

*Art. 1033.* Si Hysterica passio abuteri prolapsu fue-  
rit post difficiliorem partum, tunc sequens remedium  
ususurpabitur. 4. *Cortic. querc. un. ij. aq. font. lib.*  
*3ij. coq. ad tertiæ partis absumptionem; dein. add.* Totas.  
*cortic. granat. ana man. ij. Vini rubri lib. sem. cola-*  
*tura partes affectæ pannis laneis foventur; mane bi-*  
*torio antequam electio ægra surgat, & vespere post-*  
*quam decubit; sicque continuatur usque ad integram*  
*symptomatum cessationem.*

Remedia  
pro hy-  
pochon-  
driacis.

*Art. 1034.* Præter remedia huc usque recensita nonnulli pro hypochondriacis Gallum celebrant longævum, & radicibus aperitivis infarctum; ut Cort. Cappar. Tamarisc. fol. fumar. Bugloss. scolopend. cum herbis capillaribus, addendo Uvas & semin. Anis. & coriand. & post coctionem jus exprimitur, trifariam dividendum, cujus priori parti infunduntur Sennæ mundat. ℥ij. sem. salis Vegetabil. ℥j., reliquis duabus adduntur tantum Salis Crystall. Tartar. ℥j. vel ij. prior dosis mane stomacho jejuno propinatur, post trihorium altera, vespere demum tertia.

*Art. 1035.* Si causa morbifica difficulter, valde, fusape- bigi potest, aperitiva purgantibus mixta egregie opiturnitativum. lantur, & pro vitiosis aciditatibus edomandis alkalina sunt invehenda ex gr. ʒ. Syrup. mart. aperitiv. unc. i. sem. cass. mundat. unc. j. rhab. pul. ℥ij. sal Polychr. -j. Dissolvantur omnia in cyatho Decoct. ex rad. aperitiv. Vel ʒ. sennæ, Rhabarb. tart. solub. mariat. ana j. resin. Jalap. gr. iv. f. pulv. & cum conserv. flor Bugloss. f. Vel hæc eadem pulvis cum Ptisana rad. aperitiv. propinetur.

*Art. 1036.* In Colica aliisque internis convulsionibus ol. amygdal. dulcium, unctuosique ac pingues clysteres plurimum conferunt, tum etiam juvat, si mox post clysteres purgantia leniora jubeantur, quæ efficaciora reddi poterunt addito Tart. solub. Emetico. Sæpe vero promptius levamen a China China obtinetur eadem dosi adhibita, quæ in intermittentibus febribus usuvenit. Vel ʒ. Rhabarb. ℥ij. Pulv. Hieræ amar. unc. sem. Semin. Anis. ʒ. sem. Vin. alba unc. xiv. Inf. in loco calid. per hor. 24. & filtratus liquor quadrifaria dividatur, totidem diebus mane ingerendus.

*Art. 1037.* Ut autem humorum corruptio vitetur, quam morbi diuturnitas in corpus invehit, nihil efficacius habetur præparationibus ex Myrrha, & Aloe, quarum duo hic exemplaria subnectimus.

ʒ. Aloes Hepatic. Myrrh. ana unc. j. Croc. orient. unc. sem. confus. & mixtis suprafund. spir. Vin. spir. sulph. ana. unc. j. digerant. in fumo per octo dies vase probe clauso, quo deinde aperto suprafund. spir. antehy- se probe clauso, quo deinde aperto suprafund. sp. stericum vin. suffic. quantitas, donec per sex transversos digi-



tos pulveribus supereminet oblecto iterum vase continuentur infusio in loco calido per duos menses. Filtrata tinctur. tertia pars sp. vin. destillando ab ea extrahatur, tum residuo addatur. sp. sulph. tertium de toto, nec adhibendus liquor nisi post ultimam hanc additionem ocliduo elapso.

℥. Aloes Myrrh. ana unc. j. croc. unc. sem. contus. & commixt. cum aq. Cinamom. injectis in retortam digerant. per. 15. dies in fimo, postea aptato recipiente ad ignem arenæ tertii gradu; fiat distillatio. Tum cohobato liquore per tres vices, obtinebitur demum Aqua instar seri lactis albicans, simulque spirituosissima.

Horum elixirium dosis est a gutt. vj. usque ad gutt. xij. ex meri cochleare vel cujusvis alius Cardiaci liquoris.

Aliud  
elixir

## MEMORIA LÆSA.

Art. 1038. Inter omnes animæ humanæ facultates, ne una quidem tanta difficultate, & molestia philosophorum animos exercuit ac *Memoriæ ætiologia*. Non pauci sunt, qui opinantur istam facultatem constitui ex repositorio variarum idearum sensibilibum oblata occasione primitus collectarum, & in cerebro cum signaturis quibusdam ordinate depositarum, unde ad usus futuros tanquam ex promptuario ad libitum evocantur: sed duæ admodum graves obtrudunt difficultates, nimirum, in tanta rerum accumulatione, quomodo fieri potest, ut illæ minus oblitterentur; & confundantur; & quo artificio mens ipsa ex adeo grandi idearum multitudine illas præcipue expergefaceret, & compellere potest cæteris silentibus, quas singularis usque usus pro varia rerum exigentia exquisitè postulat. Exclamandum sit necesse est *Plasmatio nostra mira est, & mirabile opusculum corporis nostri!* Prodigiosæ fuerunt in omni ævo quorundam hominum *memoriæ*, v. g. *Senecæ*. *Portii Catronis*, *Cyri Regis*; nostratum quoque *Reynoldi Episcopi*, *Vvallisi* &c.

Memo-  
riæ eti-  
ologia.

## Sennerti sententia.

Memo-  
ria læsa. *Art. 1039.* Memoriz læsæ exempla notabilia apud  
authores passim occurrunt. *Christophorus a Vega* re-  
fert *Franciscanum* quemdam ex acuta febre ita memo-  
riam emisisse, ut, etsi prius penitus esset *theologus*,  
postea nec *litteras* agnosceret, & neque *nomina re-*  
*rum*, quæ sibi assidue in usu erant, memoria te-  
neret.

Intem-  
peries  
cerebri. *Art. 1040.* Si intemperies cerebri sit frigida; & hu-  
mida, somnus est longus, & profundus; si humida tan-  
tum, est longus sed non profundus; si frigida tantum,  
moderate somnolenti sunt; si frigida & sicca: non sunt  
somnia. Si absque causa externa memoria subito  
lædatur; imminens *apoplexia*, *epilepsia*, aut *para-*  
*lyseos* est indicium, si homini alias sano id accidat.  
Difficulus curatur, quæ a *malignis morbis*, *venenis*,  
aut *philtris* ortum habet.

Curatio. *Art. 1041.* Anacardium tanquam specificum decan-  
tatur, & revera interdum egregios edit effectus, sed  
ejus usus periculo haud vacat. (vid. locum; in *Raii*  
*hist. plant.*) Abstinentum est a carne porcina, ana-  
trina, anserina, & piscibus, præsertim mollioribus,  
lacte, caseo, leguminibus, brassica, lactuca, papave-  
re, fructibus horæis, & quæ vaporosa sunt, crassæ  
substantiæ, & coctu difficilia; vinum moderate sumat-  
ur, aer sit tenuis, cerevisia pura, corpus exerceatur  
moderatis laboribus, somnus non mox a cibis ineat-  
ur, vitetur diurnus, nocturnus sit moderatus, fugiat  
mæstitiam & animi solitudinem, & ad lætitiā di-  
sponatur, a venere abstineat. Hoc in casu in usum  
revocantur hæc & similia: *Rad. pæon. mar. zedoar*  
*valerian. maj. flores tiliz, lilior. convul. primul. ve-*  
*ris, rad. calam. aromat. sem. sinap. sp. diamb. sine*  
*odoratis, sp. lavendul. castor. ambra grisea, ol. cin-*  
*namomi*; &c.

## Ettmulleri sententia.

Tantum  
scimus. *Art. 1042.* Tantum saltem scimus, quantum me-  
moriam comprehendimus, & cum judicio ponderamus,  
& ap-

& applicamus. Certum eſt cerebrum eſſe memoriæ ſub-quantum  
 jectum radicale, quomodo autem fiat nescio. Venus memoria  
 nimia memoriam debilitat, maxime in ſenibus. teneamus.

Art. 1043. *Tubeba* N. iij. mane jeſuno ſtomacho  
 comestæ inſigniter acūunt ingēnium; & memoriā; Curatio.  
*ambra* eſt omnium optima medicina in firmandis viri-  
 bus animalibus, & roboranda memoria, omnibuſque  
 mentis actionibus, adeo ut nihil æque fulciat ſenes la-  
 beſcentes; elegantiffima eſt tinctura cephalica ex gra-  
 nis *thermes*, & *ambra cum ſpiritu lilior. conval.* &c.  
 Sed notandum eſt, quod ex crebriori uſu; *ambra* plus  
 nocet, quam prodeſt, præmaturam *ſtupiditatem* infe-  
 rens; proſunt *maſticatoria*, & *capitis lotiones*, *thee*,  
*ſalvia*, *roſmarinus*, &c.

Art. 1044. In praxi noſtra *tabella ſequentes*, præ- Vires  
 miſſis rite univerſalibus, hoc affectu laboranti cum radicis  
 ſuſceptu maximo, multis abhinc annis exhibuimus; ʒi. caſum-  
 Rad. caſſummuniar. ſubtiliffime pulveriſat. ʒj. ſpec. maniar.  
 diambri. ſine odoratis .iij. ſacchar. albiſſ. duplo pondere  
 f. *tabelle frequenter in die maxime veſperi*, & ma-  
 gne comedend.

### Farrago ſententiarum.

Art. 1045. Incurabilis omnis eſt Oblivio quæ a pa-  
 rentibus proficiſcitur, vel ætatis ratione fit. A nimia Quibus  
 item venere lædi poſſet memoriā obſervat *Salmu-* de cau-  
*thius*: Vir doctus ( inquit ) ut conjugii placeret, uſus ſis me-  
 fuit ſtimulantibus Venerem; unde ſine memoria, red- moria  
 ditus eſt fatuus: & a nimia caliditate. *Galenus* caſum conci-  
 memorat cujuſdam, qui cum in colendis vitibus diu- dit.  
 tius ſub ſole conſtitiffet, & inedia uſus eſſet, in hunc  
 affectum inciderat.

Art. 1046. In confirmanda memoria hoc ſingulare Quomo-  
 obſervetur, quæ ante ſomnum poſt cœnam veſperi do ea-  
 concipiuntur, vel repetuntur, matutino tempore me- dem ro-  
 ius impreſſa manere. boretur.

Art. 1047. Hiſtoriam narrat *Tulpius* Oblivioniſ a Caſus  
 æſo occipitio. Famulus Nicolai Lonii, iturus fere memo-  
 veſpera præpropere ad Tabellarium Antuerpianum, rabilis.  
 per declivem buſſæ fornicem, ob glaciem id temporis  
 amme lubricam, procidit ſupinus in occipitium, un-  
 de



de orta omnium rerum oblivione, non meminit deinceps nominis sui, nedum domus e qua venisset, aut quo contenderet delaturus, quas manu etiamnum contineret litteras. Quem mentis stuporem brevi eatenus quidem emendavit ars, ut iterum recordaretur longe præterita, at quæ calum hunc immediate præcesserant, illorum memoria plane exciderat.

Non semper ca. per excalefacientibus utendum esse in curanda memoria  
lida ju- aut abolita aut diminuta monet, & duobus casibus il-  
vant. lustrat *Septalius*: quorum alter est cujusdam, qui ex for-  
naxis immenso calore memoriam amiserat: in quo cum  
Medici calidis uterentur, & morbus indeterius rueret,  
embrochiis frigidis capiti applicitis, & cibo spiritibus  
instauratis, sanitas reversa est; alter quempiam sistit ex  
metu in memoriæ deperditionem illapsam, cujus con-  
firmato tantummodo animo, & spiritibus vino cibisque  
optimis instauratis convaluit.

*Art. 1049.* Memoriæ jactura vel ætatis invalescentis  
effectus est, tuncque nullam admittit curationem, vel  
sequela est aut symptoma aliorum morborum; ut Apo-  
plexiæ, Paralysis, Lethargi vel alterius soporosi morbi,  
atque hisce in circumstantiis præcipuo morbo sanato  
symptoma quoque evanescit.

*Art. 1050.* Ad recuperandam Memoriam plurimum  
commendatur, ut subinde Olibani. cum Ros. Confer-  
va devoretur vel unus vel alter Myrobalanus conditus  
sumatur. Divinum quod vocat Remedium *Hildosheimus*  
huc spectans Oleum est Mirrhæ per deliq. quo tempora.  
& occiput inunguntur. Eiusdem Actoris est etiam quod  
sequitur.

24. Fol. Betonic. Salv. Lavendul. Rosimar. ana man.  
ij. Nuc. Mosc. Piper. long. Galang. cyperi ana jiv.  
Liquor Castor. Zij. Myrrh. Thur. ana jij. croc. Zij. m. & in-  
externe fund. in sp. vin. q. s. & fiat digestio in M. B. Hoc  
adhiben. liquore ægri tempora, & totum caput inunguntur.  
dus.

# DELIRIUM RABIOSUM. sive Hydrophobia.

## Cælii Aureliani sententia.

*Art. 1051.* Ex morfu animalis rabidi homines in delirium rabiosum sive hydrophobiam incipiunt, quidam celerius, quidam tardius, post annum vel eo amplius, sed frequentius, post dies quadraginta.

Hydro-  
phobia.

*Art. 1052.* Signa præsagientia sunt anxietas quædam iracundia, somnus suspensus & turbatus, stomachi gravado, oscitatio, & extensio frequens membrorum insueta querela da aere quamvis sereno, parva bibendi voluntas. Signum præsentis mali ad apicem provecti est omnium potulentorum timor, & abhorrentia.

Signa  
hydro-  
phobia  
præsa-  
gentia,  
& præ-  
sentis.

## Meadii sententia.

*Art. 1053.* Morfus canis rabidi hoc habet in se singulare, & stupendum, quod interdum malum non prius detegatur, quam memoria illius causæ penitus oblitterata sit; *vulnus* enim est *æquæ medicinales* ac communes morfus sanorum animalium: Sed quandoque longe post dira symptomata exsurgunt, post duos vel sex menses, interdum post annum integrum, vel diutius, vel frequentius post 40. dies sentiuntur dolores vagi per universum corpus, maxime circa partem læsam; æger evadit anxius ac tristis, & ad iracundiam proclivis; pulsus intermittit cum tremore aliquali, & tendinum ac nervorum spasmis; adest insignis calor internus, & sitis, & postremo aquæ timor & abhorrentia (quod *essentiam* morbi constituit) adeo ut ne quidem conspectum potulentorum sine maxima consternatione ferre possit, multo minus unam guttulam deglutire valeat, atque hoc est signum *pathognomicum* morbi consumati, quod tamen non accidit nisi sub ejus finem, & ultimam *catastrophem*, nempe diebus duobus vel tribus ante, obitum, cum morbus sit prorsus insanabilis.

Morbi  
progres-  
sus.

*Art. 1054.* Sicut in aliis morfibz venenatis, ita speciatim hoc in casu *Galenus* prudenter admonuit vulnus amplificare per *incisionem circularem*, *cauterio* inurere, & *ulcus apertum* servare per dies 40. ad minimum: sin vero hæc methodus nimis dura & inhumana videatur, sufficere *cucurbitula* applicata virus extrahere, prægressa prius profunda scarificatione. Sola applicatione *unguenti Aegyptiaci* quam calidissimi recens vulneratum feliciter servatum novi.

Cura interna.

*Art. 1055.* Si quando remedia externa omnino omitantur, vel saltem haud recte vel tempestive adhibeantur; cura internis magna ex parte tentanda est: *alexipharmaca* sunt propinanda, inter quæ præ reliquis omnibus *cineres cancrorum fluviatilium* veteres medici uno ore magnopere extollunt; *Galenus* ait neminem periisse, cui hoc remedium propinavit; sumendi sunt cineres ad quantitatem coch. j. vel ij. singulis diebus ad dies quadraginta, vel soli vel potius cum pulv. rad. gentian. & thur. in vino.

Immersio in aquam marinam.

*Art. 1056.* Frequens immersio demorfi in *aquam salsam marinam* optimum & certissimum omnium prophylacticorum merito perhibetur ad hydrophobiam præcavendam.

### *Ettmulleri sententia.*

Delirium rabiosum.

*Art. 1057.* Delirium rabiosum a morfu rabidorum animalium, in specie canis oritur, unde hydrophobia; demorfi plane rabiosi redduntur, & omnino in mores brutales transmutari videntur, nihil fere humani apud se retinentes. Præter canes, etiam *feles*; *galli gallinacei*, *equi*, *muli*, *lepi*, *boves* & similia animalia fiunt rabida, & morsus eorum sunt venenati, ut & hominis irati. Notandum est, quod etiam morsus levissimus, immo tantillus salivæ contactus in homine ab animali rabido receptus; suo tempore rabiem inferre possit, adeo penetrans & malignum est illud seminum. In decursu morbi, hydrophobia est symptoma semper conjunctum. Extant exempla quædam, licet rariora, hydrophobiæ; nullo morfu animalis rabiosi prægresso; sed dubium est, an in talibus præcesserit aliqualis infectio, nec ne; contagium etc.



etenim subinde ad biennium, immo ad plures annos absconditum latet, antequam in actum erumpat.

Art. 1058. Signa rabiei incipientis in demorso sunt Signa rabiei incipientis. anxietas præcordiorum, iracundia sine causa, querelæ de molestia aeris ambientis, de corporis gravitate, & ineptitudine ad motum; æger melancholicus evadit, lucem fugit, a potu abstinet, in parte olim vulnerata morficationem & titillationem; interdum dolorem sentit.

Art. 1059. In morbo perfecto ægri sunt anxii, spumant circa os, oculos horridos habent, quidam latrant instar canum, collum, & fauces ringunt, litriduum quida omnia abhorrent, insomnes permanent; in his vel quatrimum extremis raro curantur, sed ut plurimum moriuntur quatrimum inter triduum, vel quatrimum post incœptam hydrophobiam.

Art. 1060. Ex vulnere facto, quantocyus fieri potest, *malignum virus* extrahendum est, ideoque sanatio non cito perficienda est, sed vulnus potius ampliandum. Interne conducunt *cardiaca* & *alexipharmaca*, *tinctura bezoardica*, *spiritus theriacalis camphoratus*, &c. sed omnia dupla dosi danda sunt, & diutissime insistendum est his remediis, super locum morsum, allium, ruta, & sal contusa & mista apponenda sunt more cataplasmati. Præ ceteris optima cura fit per improvisam in *aquam frigidam* immersionem; convenit *purgatio cum helleboro* & *mercurio dulci*; *diuretica* prosunt; vis *cantharidum* est quasi specifica. Post scarificationem vulneris applicetur *cepa* sub cineribus assata vel sequens; . . . *Cepam acrem* N. 1. *alliorum capita*. N. 5. *theriac.* .vj. *ferment.* 3j. . cataplasma: sunt qui addunt, *herb. rut. sem. sinap. ol. scorpion.* &c. verum promptissimum remedium est *ustio* loci affecti cum *fero candente*. hæc omnem malignitatem destruit: Si sero advocatus sit medicus, applicanda est *cucurbitula* cum multa flamma; conducit etiam *fonticulus* prope locum affectum.

## Listeri sententia.

Dolor in loco de- *Art. 1061.* Præter signa ab aliis commemorata fu-  
morso fallibile appellat, animadvertisse ait omnibus igno-  
diu post tum, viz. *dolor quidam in loco commorso*, licet ulcus  
vulnus sanatum antea per dies & menses integre fuerit sanatum, acce-  
signum dens, qui intensus esse non consuevit, nisi morsus  
futurae partem nervosam pecierit: hic dolor a loco jam com-  
hydro- morso incipiens leviterque patientem affligens, per  
phobiae partem post partem spatio 3. aut 4. dierum plus mi-  
nus ascendit ad cerebrum, ubi quasi *vertiginem* cau-  
sat, & *confusionem*, indeque statim homo in *rabiem*  
deducitur.

Omnes *Art. 1062.* Hinc prognostico (nempe *neminem aque*  
hydro- *metu oppressum servatum esse*) consentiunt fere omnes  
phobici moriun- antiqui.

aur. *Art. 1063.* Ex nostra observatione ipsam *salivam*  
Virus in præcipue vitiari, atque in ea uni esse virus, experi-  
saliva mentis credo: etenim hæc ferre vulnere inficere solet,  
maxime & etiam sine vulnere communicari potest malum.  
consistit. *Huic conjecturæ adstipulatur historia duorum ho-*  
*minum hoc malo affectorum solum salivæ tactu si-*  
*ne recepto vulnere, itemque duorum puerorum in*  
*Hibernia sola tractatione vulneris in capite canis*  
*ab altero rabioso demorsi pariter infectorum; histo-*  
*riæ prostant in Actis philosophicis. Plures canibus*  
*rabiosis demersi citræ meæ commissi fuerunt, sed ne*  
*unum quidem Hydrophobia laborantem mihi unquam*  
*contigit videre; suppeditantur exempla ex Gallic.*  
*Hist. Acad. Scient. quorundam curatorum, etiam*  
*ubi aquarum pavores aderant, maxime phlebotomiis*  
*usque ad deliquia iteratis vicibus celebratis; immer-*  
*sionibus in aquam salinam tantum non mortem in-*  
*ferentibus, & perfusionibus ejusdem usque ad ex-*  
*trema vite oras proeductis. Quidam medicus hy-*  
*drophobici cujusdam oculis mappam crassam superin-*  
*jecit, manibus ligatis, potionem bibere invitum ali-*  
*quoties cogebat; at prorsus sinistro eventu; nam sta-*  
*tim vehementer convulsus obiit. Qui plura velit*  
*adeat authorem Listerum, qui elegantissimum tra-*  
*cta-*

*datum de hoc affectu conscripsit. Admiranda profecto est historia Jacobi Corton apud illum ab omnibus lectu dignissima.*

*Levvithotp. Philos. Transact.*

*Vol. III. pag. 283.*

*Art. 1064. ℥. Rad. serpent. virgin. flor. hyperic. ana. p. e. f. pulv. dos. ℥ss. vel. ℥ij. in iulap. cephalic. ℥. Fol. rut. ℥vj. theriac. Ven. allii, rament. Jovis ana ℥iv. infund. in vin. Canariens. vel alb. digere in balneo per horas 4. coletur cum expressione forti, dosis ℥ij. vel iij. singulis auroris ad dies novem maneatque æger jejunos per tres horas; manens residuum parti vulneratæ circumligetur, & singulis diebus renovetur. Remedium hoc me nunquam fefellit. Majerne.*

*Art. 1065. Loco vulnerato quamplurimum applicetur anus galli veteris plumis prius divulsis; & si canis rabiosus esset, gallus statim intumescit, & mox morietur, & demorsus sanabitur; si vulnus sit exiguum, ampliari debet.*

*Art. 1066. Aliter, homo morsus in mare quamprimum novies immergatur, & locus vulneratus cum lixivio e cineribus quercinis & urina eluatur, & applicetur cataplasma ex theriaca Londinensi, alliaria, ruta, & sale.*

*Art. 1067. ℥. Fol. rut. sicc. scord. ana ℥ij. rad. serpent. virgin. ℥iss. flor. hyperici ℥iij. theriac. Lond. ℥j. syr. e cort. limon. q. s. m. f. elect. pro dos. ix. una singulis auroris sumenda.*

*Art. 1068. Lichen cinereus terrestris ( Raii p. 117. ) cum æquali quantitate piperis est remedium infallibile ad rabiem præcavendam in homine ac jumento.*

*Art. 1069. Aliquando expertum vidimus decoctum ad morsum canis rabidi pharm. Bat. cum successu. Postremo quoniam hoc malum a morsu animalis ( & ut plurimum canis ) rabiosi omnino pendet, operæ pretium esse videtur, ut accurate animadvertamus, quænam sint signa diagnostica canis vere rabidi, ut futurum morbum, si fieri possit,*



Signa  
diagno.  
stica ca.  
nis ra.  
biofi.

*fit, præcaveamus.* Sequentia itaque habemus apud *Lomnium*; carnis rabiosus esurit, sitit, nihil tamen cibi vel potionis sumit, oculos flammeos trucesque habet, auriculas demittit, linguam exurit, multum ore spumat, umbræ suæ oblatrat, sæpe sine omni latratu tristis atque anxius discurret, crebro tanquam cursu fatigatus spirat; caudam gestat intortam, nullo discrimine in quosque obvios animantes impetu ac morflu fertur, præcipi atque incerto oberrans cursu. Integri canes & conspectum & latratum ejus, qui furit, exhorrescunt, ac fugiunt. *Primum symptoma rabiei in canibus est inusitatus tremor seu trepidatio.*

### *Farrago sententiarum.*

*Art. 1070.* Vera hydrophobia est canina rabies a morflu canis rabidi communicata; interdum etiam ab animalis quovis rabido, & ira furente, quæ in delirio consistit, in quod nonnulli celerius, alii tardius post susceptum morflu, quidam post annum, vel amplius, sed frequentius post dies 40. incidunt. Neque vero tam perpetuum delirium est, quin imo frequenter dentur rabidi, qui sibi mente constant, & morbi invasionem sentiunt, & rogant, jubentque, ut sibi vincula injiciantur, ne ipsis in amicos, & adstantes irruant. Hinc patet quam nihil habeat morbus hic cum mania affinitatis.

Ejus si-  
gna.

*Art. 1071.* Si in vulnere, vel consolidatio, vellicationis cujusdam, rosionis ac doloris sensum æger percipiat, qui caput versus tendat, & inde vertigo excitetur, vigiliis, somniis turbulentis, anxietate quadam, & iracundia, vel timore præter rationem, ventriculi gravitate, & vellicatione, sensu quodam velut aeris, aeris inclementioris, insolita a cibo, potuque abstinentia afficiatur, judica talem ab animali rabido demorflu fuisse. *Scardona.*

Remedia  
utilia.

*Art. 1072.* Alexipharmaca sunt propinanda, inter quæ præ reliquis omnibus cineres cancrorum fluvialium, veteres medici uno ore magnopere extollunt. Galenus ait neminem periisse, qui hoc remedium propinavit. Sumendi sunt cineres ad quantitatem cochli.

chl. j. vel ij. singulis diebus ad dies 40. Frequens item adventante hydrophobia in aquam salſam marina immerſio aliquando valet. Ubi vero de ægrorum ſalute conclamatum iam ſit, nihil experiundum reſtat præter liberalem, ac repetitam venæ ſectiōnem, ſit emperamentum, vires, ægrique conſtitutio permittunt, præter immerſiones per vim, & metum in aqua, & peruſiones per univerſum corpus tandiu celebrandas, quādiu aquam vix paveant ægri.

Art. 1073. Cantharides quaſi ſpecificas in hoc morbo habitas ab Ettmullero, & Bacchio: ut etiam pulverem illum ſamofum ex cantharidum, & piperis longi ana gr. iv. cum mica panis ab initio ſtatim adhibendum, quouſque ſanguis cum urina exire incipiat, omnino damnamus, & pernicioſiſſimum credimus. Et quia urina ſanguinea prodeunte ad lactis uſum mox devenitur; ſatiſ habemus nullo permiſſo huiuſmodi noxia pulvere ad lac confugere, eodemque per 40. dies ægros ſaginare.

Noxia

Art. 1074. Ad præcavendam rabiem in homine ac jumento Lichen cinereus terreſtris; cum æquali quantitate piperi, eſt laudatum remedium. *Sequentes vero Remedium R. Schombergus, ait, Indis Orientalibus feliciter uſitatum mihi maxime commendavit Vir ſide digniſſimus. ꝯ. Cinnab. Antimon. ſaſſic. ana gr. xv. Moſch. gr. xij. ſit pulvis mane, & vesp. peri e cyatho vini generoſiſſimi ſumendus per quamplures dies, vel pro re nata. Sed nihil magis præſtat, quam vulnus ſtatim etiam conſolidatum denuo aperire, & late ſcarificare cucurbitula fortiter attrahente deſuper applicata, vel partem affectam ferro ignito inurere, & ſotu frictio- neque ex muria ſalis, & aceto aſſidue tractare. Atque hæc quidem primis a morſu diebus conferre viſa ſunt. Si progreſſu adhibeantur, oleum, & operam perdimus.*

Præſervativa.

Art. 1075. Jam ubi hydrophobia invaſerit niſi Cataſtro- phæ inter initia efficacius ol. amygdal. dulc. ſem. li- per ſu- bi, vel ol. roſat. ad unc. v. propinatur, quo ad dorſo- ibendum æger diſponitur, cui ſudorifera, cum regi-

regimine calido ad sudandum insuper jubentur; ut Pulv. Palmarii. Julapium Cephal. Mayerne, Acet, Aromar. Hannemani, &c.

**Signum imminuentem hydrophobiam indicans.** *Art. 1076. Petrus Salius Diversus* in lib. de affect. Particularib. observat biduo ante hydrophobiæ accessum ægrum de vehementi in cicatrice vulneris vellicatione & punctura conqueri; quod ab aliis quoque confirmatum est. *D. Boudon* ipsuper addit trigesimo nono die a morfu hujusmodi puncturam. & vellicationem in cicatrice vulneris notasse atque biduo post ægrum hydrophobum evasisse.

**Prognosis.**

*Art. 1077.* Hydrophobi ut plurimum quinta die aquæ timore, liquorumque omnium horrore moriuntur, non obtante etiam quod crebræ immersiones adhibeantur. Certissimum est enim Boerhaavium, Osterdyk Schanchtium, aliosque demersiones in aquam sæpe incassum cadere conperiisse.

**Alteranda curandi methodus.**

*Art. 1078.* Post canis rabidi morsum vulnus apertum detinendum est, quod statim aqua salsa abluatur, inde scarificatur, eidemque, vel cucurbita, vel vescicatorium imponitur. Unguento aliquo mercuriali illiniri debet, & vel unguento eodem, vel etiam Mercurio dulcificato intus sumpto, ut in luis Aphrodisiacæ curatione usu venit, salivatio promoveatur. Finita salivatione per mensem, si opus, continuata, restitutisque congruo alimento ægris viribus, & nutritione a timore subsequenti hydrophobiæ immunis vivere poterit; si vero ex cicatricis vellicatione, & punctura hydrophobiam instare cognoscatur, aut eadem jam facta sit, tunc nulla interjecta mora ad Turbith Minerale confugiendum erit. *Vid. Transf. Philosoph. ann. 1736. D. BOUDON Abrege de la Med. de M. J. Allen. Ch. III. §. xxiiij. de la Rage. D. James in epist. ad D. Hans Sloane ibid.*



## T A R A N T I S M U S .

*Art. 1079.* Tarantismus est rabies eorum, qui a *Tarantunculis* sunt morfi . In *Apulia Italiae regione* frequenter occurrit; apud nos nusquam invenitur . Spiritus animales primario afficiuntur . Cura per *muscam* peragitur . *Clarissimus Baglivus* de hoc affectu tractatum emisit: & de eodem etiam scripsit *celeberrimus noster D. Mead*, quibus remittendus est lector eruditus . Vide etiam *Hist. de l' Acad.* Vol. IV. p. 20. tum etiam *Häfenreffer de Cutis Affectibus*, circa finem: ubi etiam Cantilenas quasdam adfert Italicò vernaculo conscriptas, quæ una cum Instrumento Musico luduntur, quemadmodum habuit *P. Kirkernus* in sua *Musurgia*. Item consulantur *Obs. Anatom. Med. Chirug. Stalparzii Van der Vviel.* Cent. I. obs. 100.

*Art. 1080.* Nec tantum Musices præstantia, & curativa virtus ad Tarantisinum subigendum, sed ad alios etiam compescendos morbos extenditur. In historia *Acad. Regiæ Scient. Parisiens.* Anno 1707. pag. 7. hæc narrantur. Musicus quidam febre continua remittente correptus circa finem septimi, cum ejulatibus; vociferationibus, terroribus & agryphia, vehementi delirio corripitur. Tertio ejusdem delirii die, cum nonnullis frueretur rectæ mentis intervallis, exoravit ut plurium musicalium instrumentorum Symphonia in suomet cubiculo concederetur. Id vero ægrè Medicus patiebatur. Tamen nonnullis *D. Bernier* cantilenis lusus, ab ipso usque musices ingressu vultus lætiam ostensus est, oculique ejus lacrimis præ voluptate maduere, & usque ad finem Musicæ omni febre immunis deprehensus est. Symphonia remota iterum febris, ut prius revertebatur, & per aliquot dies hujus remedi usu continuato eosdem semper miros produxit effectus. Decimo tandem die ab usu Musices nullis antea auxiliis adhibitis; quam sanguinis emissionem a pede, omnino convaluit. Similis quoque casus in ead. *Hist. Academ.* occurrit ad annum 1708. de Saltatore delirio occupato. qui instrumento musicali audito postquam diu brachiis notas musicales persequutus

quutus est, profundo demum somno correptus, salubri crisi oborta, convaluit.

## INCUBUS SIVE EPHIALTES.

*Vvillisi sententia.*

*Art. 1081.* Incubi paroxysmus fere tantum inter dormiendum ingruit, & plerumque post stomachum cibis dyspeptis aggravatum, & decubitus in lecto supinum excitari solet; eo laborantes potissimum in pectore, & circa præcordia noxam sentire videntur, nam respiratione plurimum impedita, se a pondere, thoraci graviter incumbente, opprimi putant, quod pondus nunc hac nunc illa *spectri* aut *larvæ* specie ipsorum imaginationes illudit, nec excutere possunt, nec corpus dimovere: verum post diutinam, ac interdum fere ad vitæ deliquium, in præcordiis luctam tandem evigilant, & moles imaginaria evanescit; superstitie vero ut plurimum cordis tremore, & non raro diaphragmatis vibratione celerrima & violenta. Hic affectus raro ex se periculosus est.

*Curatio.* se periculosus est.  
*Art. 1082.* Præmissis universalibus *cephalicis* & *antispasmodicis* curatur.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1083.* Raro hoc malo afficiuntur, qui laudabili utuntur diæta; aut qui *sobriam* amant *cenam*; si dormiatur in latere elevato capite, præcaventur incubus. Ab Arabibus appellatur *epilepsia nocturna*, quia incubus habitualis, & diuturnus in *epilepsiam* tantum degenerare solet, & est ejusdem prodromus in junioribus, uti in senibus *apoplexiæ*.

*Art. 1084.* Incubus habitualis, curandus est, præmissis præmittendis, *antiepilepticis*, *martialibus* &c. cum sobrietate conjuncta. *Lapis Lazuli* laudatur.

*Inter legendum.*

*Art. 1085. Antonius Menjotus* hunc affectum eleganter describit, quod sit nocturna spirandi difficultas absurda superinjectæ molis opinione scmniantem eludens. Pueros frequenter exercet; quia voraces plus comedunt, quam digerunt. Cum vehementior impres-  
 ferit præfocatio, quosdam interfici, testatur *Aurelia-*  
*nus*; additque ex *Silimacho* contagiosum quoddam *Quando-*  
*epidemicum Incubum Roma* grassantem multos pe-  
 stis instar jugulasse. *que le-*  
*thalis*  
*est.*

*Finis Primæ Partis.*











# LIGHT GUTTERS

- TEXT RUNS OFF PAGES
- MISSING PAGES XLIV - XI

TEXT FALLS INTO GUTTER